

RENE BRAQUE

LA FORÊT ET SES PROBLÈMES DANS LE SUD DU BASSIN PARISIEN

(Berry-Nivernais)

Étude de Géographie physique

TOME III


THESE PRESENTEE DEVANT L'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND II

— LE 2 JUIN 1978 —

ATELIER NATIONAL
REPRODUCTION DES THESES
UNIVERSITE LILLE III
LILLE

- 1982 -

DIFFUSION
P.U.V.
UNIVERSITE PARIS VIII
VINCENNES - SAINT DENIS



Digitized by the Internet Archive
in 2026

https://archive.org/details/IA41548618_0005

RENE BRAQUE

LA FORÊT ET SES PROBLÈMES DANS LE SUD DU BASSIN PARISIEN

(Berry-Nivernais)

Étude de Géographie physique

TOME III

THESE PRESENTEE DEVANT L'UNIVERSITE DE CLERMONT-FERRAND II

— LE 2 JUIN 1978 —

ATELIER NATIONAL
REPRODUCTION DES THESES
UNIVERSITE LILLE III
LILLE

DIFFUSION
P.U.V.
UNIVERSITE PARIS VIII
VINCENNES - SAINT DENIS

- 1982 -

LA COULEUR ET L'ESPACE

Étude de Géométrie Moderne

de l'art

© René BRAQUE

I.S.B.N. : 2 - 7295 - 0003 - 0

FIGURES ET TABLEAUX




Fig. 1 - Croquis de localisation du champ de l'étude

1-2-3-5-8 - limite du domaine atlantique

1 - selon Braun-Blanquet, 1923;

2 - selon Braun-Blanquet, 1928;

3 - selon Walter, 1927;

5 - selon Walter, 1954;

8 - selon Dupont, 1962.

4 - limite du sous - secteur ligérien du secteur franco-atlantique ($1 A_2 b$), selon Gaussen, 1938 a.

6 - sous - domaine ligérien du domaine des forêts à chêne dominant du Nord de la France, selon Rubner et Reinhold, 1953.

7 - limite entre les sous - secteurs armoricain et aquitanien et le sous - secteur du Massif Central et du Bassin Parisien, selon Dupont, 1962.

9-10 - selon Coujon, 1932:

9 - zone où sont cantonnées la plupart des limites des espèces atlantiques.

10 - zone où sont cantonnées la plupart des limites des médio - européennes.

11 - dition (= champ de l'étude).

TABLEAU 1

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

DES ARGILES A CHAILLES

Granulométrie de 3 échantillons en provenance de la Forêt domaniale de Bellary (Vaulurins).			
	Profondeur du prélèvement		
	5m	6m	7m
argile	12%	13%	20%
limon	36%	19%	21%
sables très fins	21%	17%	21%
sables fins	21%	27%	30%
sables grossiers	7%	23%	8%

Analyse chimique de 2 échantillons provenant de la Forêt de la Bertrange (1).		
H ₂ O	3,55	3,15
SiO ₂	85,80	88,00
Al ₂ O ₃ + Fe ₂ O ₃	8,20	7,10
CaO	0,80	0,10
MgO	0,45	0,50
Na ₂ O	0,80	0,70
K ₂ O	0,85	0,85

(1) analyse effectuée par le Laboratoire de l'Institut de Géographie de Clermont-Ferrand.

TABEAU 2
IDENTIFICATION DES MINERAUX ARGILEUX DES ARGILES A CHAILLES (1)

A - dans l'altérite					B - dans le sol						
Pro-fon-deur en mètres	Lieu de prélèvement				Pro-fon-deur en mètres	Lieu de prélèvement					
	Forêt de Bellary les Vulurins	Bertrange le Valton	Communale de Prémery	Colline de Limon		Bellary les Vulurins	Bertrange la Gauthierie	les Brûlés	Communale de Prémery	Colline de Limon	Sardolles
2,5	J pauvre en chailles	Kaolinite Illite argile gon-flante non			0,5	Kaolinite moyen Illite moyen					
3,5	Kaolinite moyen Illite forte	Kaolinite forte Illite moyen	Kaolinite faible Illite forte		0,8						
4,5			Kaolinite forte Illite moyen	Kaolinite dominante Illite traces	1,0	Kaolinite moyen Illite dominante					Kaolinite moyen Illite traces
5,5	Kaolinite forte Illite moyen Montmorillonite faible	Kaolinite très forte Illite moyen Montmorillonite Vermiculite	Kaolinite moyen		1,2		Kaolinite moyen Illite faible				
7,5	Kaolinite forte Illite forte Montmorillonite Vermiculite Chlorite	Kaolinite forte Illite moyen			1,5				Kaolinite forte Illite forte Montmorillonite Vermiculite		

(1) - déterminations effectuées par le Laboratoire de Géographie Physique de l'Institut de Géographie, 191 rue St-Jacques, Paris

LIVRE PREMIER

UNITE ET DIVERSITE
CLIMATIQUES




Fig. 2 - Valeur moyenne de la radiation globale au sol (R_g) en langley/jour.
(1 Ly = 1 calorie par cm^2)

- 1 - Châteauroux
- 2 - Bourges
- 3 - Nevers
- 4 - Paris
- 5 - Orléans
- 6 - Nancy




Fig. 3 : Précipitations des 18 et 19 novembre 1962

- 1 - moins de 6mm
- 2 - 6 à 10mm
- 3 - 10 à 20mm
- 4 - plus de 20mm




Fig. 4 : Précipitations de la période du 1er au 5 novembre 1962
1 - moins de 5mm 2 - 5 à 15mm
3 - 15 à 45mm 4 - plus de 45mm




Fig. 5 : Précipitations de la période du 8 au 10 décembre 1962
1 - moins de 8mm 2 - 8 à 13mm
3 - 13 à 19mm 4 - plus de 19mm




Fig. 6 : Précipitations des 12 et 13 décembre 1962

1 - moins de 5mm

2 - 5 à 10mm

3 - 10 à 15mm

4 - 15 à 20mm

5 - 20 à 25mm

6 - plus de 25mm




Fig. 7 : Précipitations de la période du 22 au 24 novembre 1962
 1 - moins de 6mm 2 - 6 à 10mm
 3 - 10 à 14mm 4 - plus de 14mm




Fig. 8 : Précipitations des 20 et 21 décembre 1962
 1 - moins de 7mm 2 - 7 à 11mm 3 - 11 à 15mm
 4 - 15 à 20mm 5 - plus de 20mm




Fig. 9 : Précipitations des 20 et 21 novembre 1962

- | | |
|------------------|------------------|
| 1 - moins de 6mm | 2 - 6 à 10mm |
| 3 - 10 à 14mm | 4 - plus de 14mm |




Fig. 10 : Précipitations du 11 décembre 1962

- | | | |
|------------------|------------------|--------------|
| 1 - moins de 4mm | 2 - 4 à 8mm | 3 - 8 à 12mm |
| 4 - 12 à 19mm | 5 - plus de 19mm | |




Fig. 11 : Précipitations de la période du 28 au 31 octobre 1962
1 - moins de 5mm 2 - 5 à 10mm
3 - 10 à 15mm 4 - plus de 15mm




Fig. 12 : Précipitations du 30 octobre 1962
1 - moins de 4mm 2 - 4 à 7mm 3 - plus de 7mm




Fig. 13 : Précipitations de la période du 15 au 17 novembre 1962
1 - moins de 5mm 2 - 5 à 10mm 3 - 10 à 15mm
4 - 15 à 20mm 5 - 20 à 30mm 6 - plus de 30mm




Fig. 14 : Précipitations de la période du 14 au 19 décembre 1962
 1 - moins de 10mm 2 - de 10 à 20mm 3 - de 20 à 30mm
 4 - de 30 à 40mm 5 - de 40 à 60mm 6 - plus de 60mm




Fig. 15 : Précipitations du 15 décembre 1962
 1 - moins de 6mm 2 - 6 à 13mm 3 - 13 à 19mm
 4 - 19 à 25mm 5 - 25 à 50mm 6 - plus de 50mm




Fig. 16 : Précipitations du 26 octobre 1962

1 - moins de 15mm 2 - 15 à 20mm
3 - 20 à 30mm 4 - plus de 30mm




Fig. 17 : Précipitations de la période du 6 au 8 novembre 1962

1 - moins de 10mm 2 - 10 à 15mm
3 - 15 à 40mm 4 - plus de 40mm




Fig. 18 : Précipitations de la période du 9 au 11 novembre 1962
1 - moins de 5mm 2 - plus de 5mm




Fig. 19 : Précipitations de la période du 9 au 14 novembre 1962
1 - moins de 5mm 2 - 5 à 10mm 3 - plus de 10mm

TABLEAU 3

MOYENNES ANNUELLES DE TEMPERATURE
Période 1921-1950

	Tn	Tx	Tm
Château-Chinon	5.8	13.0	9.4
Nevers	5.6	15.7	10.6
Bourges	6.6	15.9	11.2
Châteauroux	6.7	16.1	11.4




Fig. 20 - Températures moyennes (Tm)

Légende commune aux deux figures:

1 - Châteauroux

2 - Bourges

3 - Nevers

4 - Château-Chinon




Fig. 21 - Moyenne des maxima (Tx)
et moyenne des minima (Tn)




Fig. 22 - Nombre de jours de gel, en Berry et en Nivernais, au cours de l'hiver 1962-1963 (octobre à mai)

1 - moins de 80 jours 2 - 80 à 89 jours 3 - 90 à 99 jours
4 - 100 à 109 jours 5 - 110 à 130 jours




Fig. 23 : Nombre de jours sans dégel, en Berry et en Nivernais, au cours de l'hiver 1962-1963

1 - moins de 20 jours 2 - 20 à 24 jours 3 - 25 à 29 jours
4 - 30 à 37 jours 5 - plus de 37 jours




Fig. 24 : Date de la première gelée de l'automne 1963, en Berry et en Nivernais

- | | |
|--------------------------|--------------------|
| 1 - après le 21 novembre | 2 - 29 octobre |
| 3 - 15 octobre | 4 - 2 et 3 octobre |




Fig. 25 : Intensité de la première gelée généralisée de l'automne 1963 (29-30 octobre), en Berry et en Nivernais

- | | |
|------------------------------------|-------------------|
| 1 - température matinale positive. | 2 - zéro |
| 3 - de 0 à -1,9° | 4 - de -2 à -3,9° |
| | 5 - de -4 à -6° |




Fig. 26 : Date de la dernière gelée printanière,
en Berry et en Nivernais, en 1963

1 - le 25 mars 2 - le 3 avril 3 - le 14 avril 4 - le 3 mai
5 - le 5 mai 6 - après le 11 mai (12 et 25 mai)




Fig. 27 : Inversions matinales de température pendant les trois premières semaines de mai 1964.

- 1 - les minima sont, au matin, plus élevés en Berry et en Nivernais qu'en Morvan,
- 2 - inversion atteignant au plus 4 degrés,
- 3 - valeur de l'inversion comprise entre 4 et 8 degrés.

TABLEAU 4

Inversions matinales au cours de l'année 1963

Période	Durée (en jours)	Situations	Bazois		Sud du Pl. Nivernais		Val de Loire		Champagne du Berry de Bourges de Chateaux			Dillon entière	
			nombre de jours	%	nombre de jours	%	nombre de jours	%	nombre de jours	%	nombre de jours	nombre de jours	%
4 janvier au 20 mars	37	beau temps	20	54	21	57	18	49	11	30	13	11	30
	39	temps perturbé	23	59	18	46	13	33	11	28	13	11	28
	76	total	43	57	39	51	31	41	22	29	26	22	29
21 mars au 23 juin	16	beau temps	8	50	7	44	7	44	4	25	5	4	25
	79	temps perturbé	43	54	36	45	32	40	24	30	27	24	30
	95	total	51	54	43	47	39	45	28	30	32	28	30
24 juin au 23 septembre	17	beau temps	12	71	12	71	10	50	8	47	12	8	47
	75	temps perturbé	47	63	37	49	27	36	23	31	23	23	31
	92	total	59	64	49	63	37	40	31	34	35	31	34
24 septembre au 30 décembre	38	beau temps	26	69	20	53	25	66	17	45	18	17	45
	60	temps perturbé	32	63	31	52	24	40	18	30	19	18	30
	98	total	58	59	51	52	49	50	35	36	37	35	36
année (4-1 au 30-XII)	08	beau temps	66	61	60	55	60	55	40	37	48	40	37
	253	temps perturbé	145	57	122	48	96	38	76	30	82	76	30
	361	total	211	58	182	50	156	43	116	32	130	116	32




Fig. 28 : "Relief thermique" matinal de la partie méridionale du Bassin Parisien (Berry et Nivernais) en mai 1964 (zéro = *minimum* de Château-Chinon).




Fig. 29 : " Relief thermique " matinal de la partie méridionale du Bassin Parisien en mai 1964. (zéro = *minimum* de Châteauroux)

T A B L E

D O N N E E S M E T E O R O L O

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 23

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation										Tn	heure Tx heure
			0	3	6	9	12	15	18	21				
23	Châteauroux	13.8	15.6	13.3	12.2	18.8	23.9	24.4	22.7	16.7	12.2	5.00	24.4	15.00
	Bourges	11.8	17.7	14.1	11.3	19.3	23.0	24.5	23.5	18.7	11.3	5.50	25.2	15.35
	Nevers	11.2	9.8	8.2	8.3	17.2	22.4	23.3	21.6	11.2	7.3	5.10	23.3	14.45
24	Châteauroux	13.8	12.8	11.1	10.6	19.4	25.0	25.0	24.4	18.3	10.6	4.00	25.5	14.00
	Bourges	10.7	15.0	9.9	8.9	18.3	25.0	26.2	24.3	19.0	8.5	6.15	26.9	15.20
	Nevers	10.7	7.9	5.2	5.0	17.8	23.8	25.1	24.8	14.3	4.0	5.15	25.7	14.40
25	Châteauroux	13.7	15.6	12.8	12.8	23.3	31.1	31.1	28.9	21.1	12.2	4.00	31.1	12.00
	Bourges	12.4	15.5	13.8	12.8	22.6	28.5	30.1	28.1	21.8	12.0	4.35	30.4	15.10
	Nevers	12.9	11.0	9.5	9.8	20.2	26.3	29.0	27.8	17.2	9.0	4.30	29.2	14.20
26	Châteauroux	13.7	17.8	15.0	13.9	28.3	32.8	35.0	31.7	23.9	12.8	5.00	35.0	14.00
	Bourges	12.5	18.8	16.0	15.8	25.2	33.1	35.4	33.0	26.0	14.8	5.15	35.8	15.15
	Nevers	12.9	15.5	14.6	15.0	22.6	29.6	32.2	28.8	19.0	13.9	4.10	32.4	15.50
27	Châteauroux	13.6	19.4	21.1	15.6	27.2	31.7	34.4	31.1	22.7	15.6	5.00	34.4	14.00
	Bourges	12.7	22.6	19.0	16.6	26.6	32.7	34.1	32.7	26.4	15.8	4.20	34.3	16.20
	Nevers	12.9	15.2	12.6	12.0	24.2	31.6	32.9	30.0	20.0	11.8	6.10	33.2	14.10
28	Châteauroux	10.3	20.5	17.8	16.1	25.5	28.9	30.0	26.7	21.1	15.6	5.00	30.0	14.00
	Bourges	11.1	20.6	18.8	17.7	26.0	30.5	31.7	27.2	23.4	17.2	4.40	32.5	15.30
	Nevers	11.7	17.1	15.0	12.9	24.2	31.0	32.8	28.7	22.9	12.9	5.40	33.0	14.25
29	Châteauroux	3.4	17.8								16.1	5.00	21.6	14.00
	Bourges	2.2	20.1								15.9	9.30	21.1	16.00
	Nevers	1.8	17.2								14.2	2.00	17.9	8.45

A U 5

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

au 28 août 1964

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES												
heures d'observation										heures d'observation												
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.	
126	115	117	118	85	84	91	108	105.5		71	75	82	55	28	28	33	57	53.6	28	12.00	82	
146	124	114	118	92	77	71	89	103.9		72	74	85	53	33	25	24	41	51.3	22	17.10	90	
115	104	107	137	108	90	105	115	110.1		95	96	97	70	40	31	40	83	69.0	31	14.45	97	
112	117	123	132	116	112	117	123	119.0		76	89	96	59	36	35	38	58	60.9	33	14.00	96	
96	103	100	115	103	101	115	124	107.1		57	85	88	54	32	30	38	56	55.0	29	15.15	90	
99	84	84	121	104	108	132	122	106.7		93	95	97	60	35	34	42	75	66.4	23	14.30	98	
118	122	127	116	109	89	104	143	116.0		67	82	86	41	24	19	26	57	50.3	19	15.00	87	
127	126	122	136	113	128	127	140	127.4		72	80	82	49	29	30	33	53	53.5	27	13.50	82	
116	108	112	131	120	147	173	73	135.0		89	91	92	55	35	36	46	88	66.5	28	14.20	92	
136	130	130	101	73	58	88	100	102.0		67	77	82	26	14	11	19	34	41.3	10	14.00	85	
146	144	136	141	100	59	93	135	119.3		67	80	77	44	20	11	18	40	44.6	10	15.30	80	
155	144	139	152	132	138	165	164	148.6		88	87	81	55	32	29	42	74	61.0	19	15.50	88	
104	86	96	111	111	113	118	124	107.9		46	34	54	31	24	21	26	46	35.3	21	15.00	61	
130	145	118	118	120	115	124	140	126.3		50	66	63	34	24	22	25	41	40.6	20	13.30	72	
149	139	129	129	120	115	159	158	137.2		86	95	91	43	26	23	37	67	58.5	18	15.45	95	
148	150	158	165	135	155	155	165	153.9		61	74	87	50	34	36	44	66	56.5	33	14.00	87	
134	148	149	153	149	138	160	164	149.4		55	68	74	47	34	30	44	57	51.1	24	15.45	76	
158	149	133	164	165	156	145	174	155.5		81	87	89	54	36	32	37	62	59.7	22	14.25	89	
164								135.0		80								69.8	33	16.00	83	
169								142.5		72								71.8	45	17.15	88	
173								144.1		88								80.0	65	8.45	95	




Fig. 30 - Insolation, température, tension de vapeur, humidité relative, à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 23 au 28 août 1964.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle, pour la matinée (à gauche), et pour l'après-midi (à droite), au temps pendant lequel le soleil est caché.
c - température (symbole T).
d - Tension de vapeur (symbole e).
e - humidité relative (symbole U).

Sur les figures c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin,
Châteauroux: C - trait moyen,
Nevers: N - trait fort.





Fig. 33 - Amplitudes thermiques comparées de Châteauroux et Bourges.

- 1) Tx de Bourges - Tx de Châteauroux.
- 2) Tn de Bourges - Tn de Châteauroux.
- 3) Supériorité d'amplitude thermique de Bourges.
- 4) Supériorité d'amplitude thermique de Châteauroux.

Figure construite sur le modèle de la planche 112.2, Pédelaborde, 1957.






Fig. 32 - Durées pendant lesquelles les seuils d'humidité relative 80%, 85%, 88%, sont atteints à Nevers, Bourges et Châteauroux, pendant les nuits de la période du 23 au 28 août 1964.




Fig. 34 - Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative, à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 2 au 13 janvier 1964.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle, pour la matinée (à gauche), et pour l'après-midi (à droite), au temps pendant lequel le soleil est caché.

b - précipitations: les rectangles noirs représentent la durée des précipitations, le signe * indique les chutes de neige.

c - température (symbole T)

d - tension de vapeur (symbole e)

e - humidité relative (symbole U)

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin; Châteauroux: C - trait moyen; Nevers: N - trait fort.

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,
Tension de vapeur,
Période du 2 au

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
2	Châteauroux	1.6	2.2	1.7	2.8	2.2	3.3	3.3	1.1	1.7	1.1	1.00	4.4	14.00
	Bourges	0.0	4.4	1.9	3.3	2.9	3.2	2.9	1.6	0.8	1.5	2.30	3.4	12.30
	Nevers	0.0	4.4	3.2	2.7	1.8	3.0	2.0	1.3	0.2	1.3	18.00	3.4	11.30
3	Châteauroux	0.0	1.1	0.6	-0.6	-0.6	0.0	0.6	0.0	-1.1	-0.6	5.00	0.6	15.00
	Bourges	0.0	0.4	0.8	0.6	0.6	1.5	1.6	0.6	-0.2	0.3	7.30	2.0	14.00
	Nevers	0.0	0.6	0.2	0.0	0.1	1.0	1.1	0.1	-0.1	-0.1	4.00	1.4	13.00
4	Châteauroux	0.0	-1.1	-1.7	-1.7	-2.2	-2.2	-2.2	-2.2	-1.7	-2.2	5.00	-1.7	6.00
	Bourges	0.0	-1.0	-1.9	-2.1	-2.6	-1.4	-1.5	-1.2	-1.2	-2.6	7.00	-1.2	18.00
	Nevers	0.0	-1.8	-2.1	-2.1	-1.7	-1.8	-0.3	-0.4	-0.3	-2.9	5.00	-0.1	14.30
5	Châteauroux	0.0	-1.7	-2.8	-2.8	-3.3	-2.2	-1.1	-1.1	-2.2	-3.3	8.00	-1.1	14.00
	Bourges	0.0	-1.7	-1.9	-2.4	-2.0	-1.5	-0.7	-0.4	-2.0	-2.7	8.30	-0.2	17.00
	Nevers	0.0	-1.5	-2.1	-2.8	-2.8	-1.4	0.1	-0.9	-1.6	-3.1	8.00	0.2	14.30
6	Châteauroux	0.0	-3.3	-3.3	-2.2	-1.7	-1.1	-0.6	0.0	-0.6	-3.9	1.00	0.0	16.00
	Bourges	0.0	-2.4	-2.6	-1.7	-0.9	0.5	1.5	1.7	0.0	-2.9	1.30	1.8	18.30
	Nevers	0.0	-2.7	-2.4	-2.1	-1.4	0.3	0.4	0.4	0.6	-3.3	2.00	0.8	12.30
7	Châteauroux	0.0	-1.7	-3.9	-5.0	-2.2	0.0	1.7	1.1	-0.6	-5.0	5.00	1.7	13.00
	Bourges	0.0	-2.3	-2.3	-3.2	-1.0	2.7	2.2	2.0	1.0	-3.6	3.50	2.7	11.50
	Nevers	0.0	-2.2	-4.6	-5.0	-3.7	1.4	2.0	1.3	-0.6	-7.0	8.00	2.0	15.00
8	Châteauroux	8.8	-1.1	-1.7	-2.8	-2.8	0.6	1.7	1.7	-2.8	-2.8	6.00	1.7	14.00
	Bourges	6.9	0.3	-0.3	-1.2	1.3	1.8	3.1	0.4	-2.4	-2.6	8.00	3.4	15.30
	Nevers	6.2	-3.0	-3.6	-4.6	-3.6	1.7	3.9	-0.2	-5.9	-6.9	8.00	4.1	14.00
9	Châteauroux	0.1	-3.3	-3.9	-3.9	-3.9	-1.1	0.6	0.6	0.6	-4.4	4.00	1.1	16.00
	Bourges	0.0	-2.0	-4.9	-4.1	-1.1	-0.3	0.9	1.0	0.5	-5.1	3.30	1.2	18.10
	Nevers	0.0	-7.2	-7.4	-7.7	-3.3	-1.6	0.1	0.3	0.3	-9.0	5.00	0.9	22.00
10	Châteauroux	0.0	0.6	0.6	1.1	-1.1	1.7	1.7	1.1	0.6	-1.1	9.00	2.2	13.00
	Bourges	0.0	0.5	1.0	-0.2	0.3	1.9	3.0	3.2	2.1	-0.4	5.30	3.9	16.00
	Nevers	0.0	0.4	0.4	0.1	0.1	1.2	2.2	1.6	1.7	-0.1	5.30	2.4	14.30
11	Châteauroux	3.6	0.0	-1.1	-2.8	-1.7	-1.1	0.0	-1.1	-2.8	-3.3	7.00	0.0	14.00
	Bourges	0.0	0.8	-0.8	-1.0	-2.4	0.0	0.4	-0.9	-2.8	-3.4	8.30	0.6	14.00
	Nevers	0.0	0.6	-1.2	-3.4	-3.4	-0.8	-0.1	-3.4	-3.8	-5.0	8.00	-0.1	14.30
12	Châteauroux	0.0	-2.2	-3.3	-2.8	-1.7	-0.6	-1.1	-2.2	-2.2	-3.3	3.00	-0.6	12.00
	Bourges	0.0	-3.0	-2.2	-2.8	-2.1	-0.9	0.0	-1.0	-1.3	-3.3	23.00*	0.2	14.00
	Nevers	0.0	-4.1	-2.8	-2.2	-3.2	1.1	0.2	-0.6	-1.2	-5.1	23.00*	0.4	15.00
13	Châteauroux	0.0	-2.8	5.0	-2.2	-0.6	0.0	1.1	1.1	1.7	-5.0	2.00	7.8	14.00°
	Bourges	0.0	-1.7	-3.4	-1.3	0.1	1.1	2.6	3.1	4.9	-4.4	2.30	6.6	6.00°
	Nevers	0.0	-1.4	-1.2	-0.8	0.0	1.9	3.6	5.7	7.2	-1.9	1.00	7.8	21.30
14	Châteauroux	7.9	6.1								1.1	20.00*	13.9	13.00
	Bourges	6.4	5.4								3.1	18.00*	15.1	14.00
	Nevers	5.5	6.8								5.7	18.00*	13.8	15.00

* - la veille

* - le lendemain

A U 6

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

13 janvier 1964

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES												
heures d'observation										heures d'observation												
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.	
72	69	66	65	68	68	64	61	66.6		100	100	89	91	88	88	96	89	92.6	82	14.00	100	
78	61	72	67	65	63	63	58	65.5		93	87	93	89	84	84	92	90	89.0	84	12.00	96	
64	65	66	63	64	61	61	57	62.6		76	84	89	91	84	87	91	92	86.7	76	0.00	94	
65	64	58	58	59	64	61	56	60.6		98	100	99	99	96	100	100	99	98.9	95	2.40	100	
60	61	60	61	66	65	61	59	61.6		96	94	94	96	96	94	96	98	95.5	93	2.00	98	
60	58	59	60	63	62	60	55	59.6		94	94	96	98	96	94	98	97	95.9	93	14.40	98	
53	52	52	51	51	51	51	53	51.8		95	96	96	98	98	98	98	98	97.1	95	0.00	98	
54	51	49	46	49	49	51	52	50.1		96	96	94	91	90	90	91	93	92.6	90	12.00	96	
51	50	50	51	50	53	54	56	52.0		96	96	96	94	94	90	92	94	94.0	89	14.30	96	
53	48	48	46	51	58	58	51	51.6		98	97	97	97	98	99	99	98	97.9	97	3.00	99	
52	51	49	49	50	55	54	47	50.9		96	95	96	94	92	95	92	90	93.8	87	24.00	96	
53	51	48	48	53	59	55	52	52.4		96	98	97	97	97	96	97	96	96.8	95	23.50	98	
47	51	51	53	56	58	61	58	53.9		97	97	98	98	99	99	100	99	98.4	96	1.00	100	
44	47	49	52	56	59	58	54	52.4		87	93	92	91	86	87	84	88	88.5	83	19.00	94	
47	47	48	48	53	54	55	52	50.5		95	93	92	88	85	86	88	81	88.5	80	21.30	96	
53	44	40	51	59	66	66	58	54.6		98	96	95	98	96	96	100	99	97.3	95	5.00	100	
48	46	45	54	60	57	58	58	53.3		94	89	93	95	81	80	82	88	87.8	78	19.00	98	
46	40	40	45	60	58	58	51	49.7		89	93	95	96	89	82	87	88	89.9	81	14.30	96	
56	43	48	47	59	61	53	48	53.1		99	98	97	95	92	89	98	97	95.6	89	15.00	99	
52	52	52	49	48	44	45	47	48.6		85	88	93	88	69	58	75	91	80.9	58	15.00	93	
44	43	40	41	46	54	43	36	43.4		89	92	93	88	66	67	81	92	83.5	64	14.00	94	
44	44	44	44	56	64	64	64	53.0		92	96	96	96	99	100	100	100	97.4	92	0.00	100	
47	39	42	52	56	61	61	60	52.3		90	93	94	93	94	94	92	94	93.0	90	0.00	96	
32	32	31	45	50	55	61	62	45.7		91	91	90	95	92	90	98	100	93.4	89	13.00	100	
64	64	66	56	65	69	66	58	63.5		100	100	100	99	94	100	100	99	99.0	94	12.00	100	
61	61	56	59	63	67	72	65	63.0		96	92	94	94	91	89	93	91	92.5	81	24.00	96	
63	63	61	61	65	69	66	66	64.2		100	100	100	100	98	96	96	96	98.3	88	24.00	100	
59	51	45	51	48	48	47	45	49.3		96	91	91	94	86	79	85	91	89.1	79	14.00	98	
52	43	47	45	51	48	49	46	47.6		81	75	83	89	84	76	87	93	83.5	71	14.30	95	
56	44	43	44	50	46	41	42	45.7		88	79	90	92	87	76	88	92	86.5	74	14.30	93	
49	46	47	48	50	51	51	46	48.5		94	97	95	90	86	91	98	89	92.5	82	14.00	98	
45	46	46	48	52	49	53	51	48.8		93	89	93	92	91	80	93	92	90.4	80	14.30	95	
41	46	47	45	48	46	46	50	46.1		92	93	92	93	80	74	80	89	86.6	74	15.00	94	
45	40	45	57	61	65	66	65	55.5		91	95	87	97	100	98	100	94	95.3	85	23.00	100	
49	44	51	57	59	66	69	78	59.1		92	92	92	92	89	89	91	90	90.9	86	0.30	92	
48	51	55	56	64	72	82	86	64.3		88	91	95	93	91	91	89	84	90.3	80	23.45	96	
84								84.1		89								79.1	58	15.00	100	
78								88.3		88								79.4	55	13.30	89	
82								85.3		83								79.0	59	12.00	96	




Fig. 35 - Fluctuation du pouvoir évaporant de l'air à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 6 au 9 janvier 1964.




Fig. 41 - Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche.-Période du 30 juin au 8 juillet 1964.




Fig. 42 - Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche.-Période du 7 au 22 août 1964.




Fig. 36 - Insolation (a), précipitations (b), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 16 au 26 janvier 1963.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché (matinée à gauche, après-midi à droite).
 b - précipitations: les rectangles noirs représentent la durée des précipitations; le signe * indique les chutes de neige.

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin; Châteauroux: C - trait moyen; Nevers: N - trait fort.

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,
Tension de vapeur,
Période du 16 au

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
16	Châteauroux	4.0	-7.2	-7.8	-8.9	-6.7	-3.3	-1.1	-3.9	-5.6	-9.4	4.00	-0.6	13.00
	Bourges	1.1	-5.7	-6.4	-8.8	-6.0	-3.4	-1.9	-3.8	-4.9	-9.6	5.30	-1.8	14.00
	Nevers	1.0	-9.1	-8.1	-7.2	-6.3	-3.3	-1.9	-4.4	-7.9	-10.2	2.00	-1.7	15.30
17	Châteauroux	2.3	-6.7	-7.8	-8.9	-7.2	-4.4	-4.4	-4.4	-6.1	-8.9	6.00	-4.4	12.00
	Bourges	1.6	-6.7	-6.0	-5.0	-5.3	-4.3	-4.0	-4.4	-5.2	-7.8	6.45	-4.0	14.50
	Nevers	4.4	-10.1	-10.0	-9.2	-7.2	-3.2	-2.7	-4.4	-7.0	-10.6	1.00	-2.3	14.30
18	Châteauroux	0.0	-7.4	-8.9	-8.3	-7.3	-6.1	-3.9	-3.9	-6.1	-8.9	3.00	-3.9	15.00
	Bourges	0.0	-6.9	-8.6	-7.7	-7.3	-5.2	-3.5	-3.8	-6.2	-8.6	2.50	-3.2	18.05
	Nevers	0.2	-7.5	-7.8	-6.8	-6.7	-5.0	-2.9	-4.6	-7.8	-8.3	2.00	-2.7	14.00
19	Châteauroux	2.3	-9.4	-11.1	-12.8	-12.8	-9.4	-9.6	-9.8	-9.3	-13.3	7.00	-3.3	6.00°
	Bourges	2.1	-8.2	-10.4	-12.0	-11.8	-9.1	-9.1	-9.4	-9.0	-12.2	7.00	0.9	6.00°
	Nevers	0.3	-9.2	-10.4	-12.8	-13.3	-10.4	-10.0	-9.8	-8.4	-14.0	8.00	1.0	5.00°
20	Châteauroux	0.1	-7.8	-6.7	-3.3	1.1	1.1	2.2	1.7	1.1	-9.8	18.00*	2.8	14.00
	Bourges	0.7	-5.7	-2.9	0.9	1.0	3.2	5.0	2.8	1.0	-9.4	18.00*	5.2	15.30
	Nevers	5.8	-5.8	-1.3	0.3	-0.1	4.1	4.4	-0.6	-2.7	-9.8	18.00*	6.1	14.00
21	Châteauroux	7.5	-0.6	-1.7	-3.9	-5.0	-1.7	-0.6	-3.3	-4.4	-5.0	7.00	0.0	14.00
	Bourges	7.2	-0.4	-2.0	-4.4	-3.9	-1.0	0.1	-1.4	-4.0	-5.3	8.30	0.1	14.50
	Nevers	7.2	-2.3	-3.5	-5.9	-5.7	-0.2	-0.1	-2.1	-5.6	-7.8	8.00	0.1	14.00
22	Châteauroux	9.2	-6.7	-7.8	-8.9	-8.9	-3.9	-2.8	-5.0	-6.1	-10.0	8.00	-2.8	14.00
	Bourges	7.6	-6.4	-7.3	-8.2	-7.5	-3.7	-1.6	-3.2	-5.4	-8.4	7.00	-1.6	14.50
	Nevers	7.7	-8.0	-8.2	-8.9	-7.8	-4.7	-2.4	-4.0	-6.4	-9.2	5.30	-2.2	14.30
23	Châteauroux	9.3	-7.8	-10.0	-11.1	-10.0	-5.0	-2.8	-7.2	-9.4	-12.2	7.00	-2.8	14.00
	Bourges	7.7	-7.0	-8.0	-9.4	-7.4	-3.2	-1.2	-3.4	-7.9	-10.4	7.15	-0.8	14.00
	Nevers	7.5	-8.2	-9.4	-10.8	-9.2	-3.0	-1.1	-7.8	-13.2	-13.3	8.00	-0.8	14.30
24	Châteauroux	9.3	-10.0	-11.7	-12.2	-10.6	-3.3	-1.1	-6.1	-7.8	-12.2	5.00	-1.1	14.00
	Bourges	7.8	-8.3	-9.7	-11.1	-9.2	-3.8	-0.5	-4.4	-6.9	-11.6	7.00	-0.1	14.30
	Nevers	7.2	-15.0	-15.4	-15.7	-11.6	-4.3	-2.3	-7.9	-11.8	-15.9	5.30	-1.5	15.00
25	Châteauroux	9.3	-10.6	-9.4	-10.6	-8.9	-3.9	-1.1	-4.4	-6.7	-11.1	7.00	-1.1	14.00
	Bourges	6.6	-8.0	-9.5	-9.8	-11.0	-3.0	0.4	-2.2	-5.0	-11.0	8.50	0.4	14.50
	Nevers	5.6	-13.9	-14.5	-14.4	-13.2	-5.4	-1.0	-5.0	-6.6	-15.3	8.00	-0.7	16.00
26	Châteauroux	0.0	-8.3								-12.2	5.00	-1.5	10.00°
	Bourges	0.0	-8.0								-13.6	6.30	-1.4	4.00°
	Nevers	0.0	-9.3								-14.7	5.00	-2.4	3.30°

* - la veille

° - le lendemain

A U 7

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

25 janvier 1963

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES												
heures d'observation										heures d'observation												
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.	
32	31	29	34	40	43	39	35	35.4		91	92	92	93	83	77	87	87	87.5	72	13.00	93	
36	33	29	36	40	40	42	38	36.8		90	89	92	92	83	75	92	88	87.6	74	15.30	93	
28	30	33	36	45	45	39	31	35.9		92	92	93	94	93	86	89	90	91.1	82	16.00	95	
33	29	27	29	36	31	27	21	29.1		91	87	86	82	82	60	61	53	76.5	53	21.00	91	
33	34	36	35	35	30	26	22	31.4		88	87	86	85	80	66	59	52	75.4	52	21.00	88	
20	26	27	31	36	32	25	19	27.0		88	88	89	88	75	63	57	54	75.2	53	20.00	89	
24	25	24	25	24	26	22	22	24.0		69	80	75	72	61	58	47	52	64.3	47	17.00	80	
24	26	21	21	24	24	22	19	22.6		64	80	62	60	57	50	47	48	58.5	44	20.00	82	
23	26	26	24	25	24	18	16	22.7		66	78	70	65	60	48	42	48	59.6	38	17.00	79	
16	18	18	18	15	19	22	24	18.8		54	59	77	77	57	63	76	79	69.0	54	0.00	80	
17	18	17	19	20	21	24	25	20.1		51	64	71	75	64	67	79	80	68.9	52	0.00	83	
19	19	17	18	20	23	25	28	21.1		62	68	74	80	71	81	88	86	76.2	62	0.00	91	
28	27	40	56	56	63	58	55	47.9		82	73	83	85	85	88	84	83	82.9	72	5.00	93	
33	43	58	53	66	60	55	53	52.6		82	89	88	81	73	69	74	81	79.6	68	14.15	90	
35	45	52	49	52	57	51	45	48.2		87	84	81	81	64	68	88	91	80.9	60	13.30	92	
47	44	32	31	32	29	28	26	33.6		82	82	71	73	60	50	59	59	67.0	47	24.00	86	
47	34	31	30	25	25	25	19	29.5		80	65	70	67	45	41	45	43	57.0	40	17.20	80	
45	35	31	32	27	25	22	17	29.2		89	74	89	79	45	43	42	43	63.0	40	17.00	91	
17	18	18	18	18	19	19	18	18.1		47	54	59	59	40	38	45	46	48.5	38	14.00	62	
17	18	19	20	19	20	19	17	18.6		45	49	58	58	41	36	38	42	46.9	32	15.00	60	
15	17	18	18	19	17	16	16	17.0		47	52	56	54	44	33	35	42	45.3	31	16.00	57	
21	18	18	22	23	23	23	19	20.9		62	62	69	78	54	47	64	64	62.5	47	14.00	78	
17	18	20	25	24	21	20	22	20.9		46	53	67	71	49	38	42	64	53.8	37	15.15	77	
16	19	19	23	25	24	21	18	20.6		50	63	70	76	52	42	62	80	61.8	40	14.30	86	
19	18	17	18	23	25	24	22	20.8		65	72	70	68	47	44	64	64	61.8	44	14.00	80	
22	21	20	22	24	25	25	24	22.9		66	72	76	73	52	42	57	67	63.1	41	15.10	84	
16	16	15	22	24	24	22	20	19.9		86	86	86	86	55	46	64	82	73.8	45	14.50	88	
22	20	23	24	29	31	29	26	25.5		80	67	87	77	65	56	65	70	70.9	56	14.00	87	
28	26	25	23	31	31	31	30	28.1		84	88	88	87	64	49	60	71	73.9	49	15.00	89	
18	17	18	20	31	33	31	30	24.8		87	87	87	88	76	58	73	81	79.6	56	14.30	89	
24								27.8		75								84.8	75	0.00	94	
28								30.4		84								87.0	83	0.15	93	
27								29.9		89								90.5	87	14.50	96	

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,
Tension de vapeur,
Période du 12 au

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES													
			heures d'observation										Tn	heure	Tx	heure
			0	3	6	9	12	15	18	21						
12	Châteauroux	0.0	1.7	1.1	-0.6	0.0	2.2	3.9	3.9	0.6	-0.6	6.00	4.4	17.00		
	Bourges	0.0	3.0	2.6	2.0	2.0	6.2	6.2	5.0	3.9	1.6	7.40	6.7	12.15		
	Nevers	0.0	3.5	2.6	2.5	2.7	6.2	6.8	5.1	3.3	2.0	7.35	6.9	14.40		
13	Châteauroux	6.8	-0.6	-0.6	-1.1	0.0	6.7	7.8	4.4	4.4	-1.1	1.00	7.8	14.00		
	Bourges	7.1	3.1	3.0	1.9	1.2	7.9	7.0	4.9	2.8	0.9	7.30	8.0	13.50		
	Nevers	4.7	2.6	2.1	-2.2	0.2	7.7	6.6	3.8	2.8	-2.6	6.55	8.4	11.40		
14	Châteauroux	6.6	5.6	3.9	2.8	3.9	9.4	10.6	6.1	4.4	1.7	8.00	10.6	15.00		
	Bourges	6.7	3.0	4.0	3.0	5.5	11.0	11.5	7.0	5.8	1.7	7.15	11.9	15.45		
	Nevers	7.1	2.6	2.6	1.9	5.2	10.3	10.6	6.1	4.6	1.6	22.15*	11.1	14.05		
15	Châteauroux	0.0	5.0	4.4	4.4	4.4	5.6	6.7	6.7	7.2	4.4	1.00	7.2	21.00		
	Bourges	0.0	4.8	4.4	4.5	4.3	6.0	6.2	6.1	6.0	3.8	4.00	7.1	23.40		
	Nevers	0.0	4.2	3.9	3.8	4.6	6.3	7.2	6.2	6.2	2.6	1.30	7.2	14.45		
16	Châteauroux	6.3	6.1	5.0	5.0	5.0	8.9	11.1	9.4	8.3	3.3	7.00	11.1	14.00		
	Bourges	4.2	6.9	5.8	5.4	5.8	10.1	11.2	10.0	7.9	3.2	8.00	11.4	16.00		
	Nevers	5.6	6.0	6.6	5.4	6.8	10.6	12.4	10.4	7.8	5.0	5.30	14.0	13.45		
17	Châteauroux	0.0	9.4	10.0	4.4	4.4	5.6	5.6	4.4	3.9	4.4	6.00	5.6	11.00		
	Bourges	0.4	8.0	10.3	5.0	5.1	6.3	6.2	4.3	4.1	4.3	18.00	7.0	13.00		
	Nevers	0.0	7.2	8.9	6.9	5.1	6.0	6.0	4.7	3.9	4.7	17.45	7.2	12.45		
18	Châteauroux	1.4	3.9	3.3	3.3	3.9	6.7	8.9	7.8	6.7	3.3	3.00	8.9	15.00		
	Bourges	0.4	3.4	3.7	2.5	3.2	6.1	8.1	7.2	7.0	2.3	6.50	8.4	16.00		
	Nevers	0.4	3.8	3.6	2.1	2.9	4.8	6.9	6.6	5.2	1.6	7.15	7.8	16.40		
19	Châteauroux	0.4	6.1	5.6	4.4	5.0	7.2	8.3	5.6	4.4	4.4	6.00	8.3	14.00		
	Bourges	4.1	6.8	6.3	5.0	6.3	8.9	10.2	6.6	5.0	4.4	7.15	10.9	14.00		
	Nevers	5.5	6.0	5.9	1.8	4.7	10.9	11.0	7.3	5.8	0.8	6.05	12.4	13.00		
20	Châteauroux	0.0	2.2	1.7	1.7	1.7	2.2	3.3	2.8	2.2	1.1	7.00	3.3	15.00		
	Bourges	0.0	4.0	2.9	2.7	2.6	3.1	3.1	3.6	2.1	2.2	8.00	3.6	17.50		
	Nevers	0.0	4.4	3.5	2.8	2.4	3.0	3.2	2.7	1.8	2.0	7.30	3.5	15.30		
21	Châteauroux	4.9	1.1	-1.7	-2.2	-1.7	2.8	5.6	3.3	0.6	-2.8	7.00	6.1	16.00		
	Bourges	7.0	0.3	-1.0	-2.8	-0.9	4.3	6.0	3.6	1.9	-3.0	6.15	6.6	16.15		
	Nevers	7.5	-1.3	-3.8	-6.7	-2.3	4.7	7.1	4.3	-1.4	-6.8	5.30	7.6	14.05		
22	Châteauroux	0.0	-0.6								-1.7	3.00	11.1	14.00		
	Bourges	3.4	0.3								-1.4	6.50	11.2	13.00		
	Nevers	4.5	0.4								-1.8	22.15*	11.8	12.10		

* - la veille

° - le lendemain

A U 8

G I Q U E S R E G I O N A L E S

Température

Humidité relative

21 février 1964

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES												
heures d'observation										heures d'observation												
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.	
61	65	55	61	72	77	73	64	66.0		89	96	95	100	100	95	90	100	95.6	89	0.00	100	
66	68	66	66	64	72	69	68	67.4		88	93	93	93	67	77	80	85	84.5	65	12.30	93	
68	66	66	69	73	71	73	69	69.4		87	89	91	93	77	71	83	90	85.1	67	12.30	94	
57	57	53	57	58	61	65	65	57.9		97	97	95	93	59	48	77	77	80.4	48	14.00	99	
67	69	63	61	61	65	61	61	63.5		88	91	91	92	58	65	70	83	79.8	50	13.15	94	
68	66	48	55	63	61	60	59	60.0		93	93	94	88	60	62	75	79	80.5	50	11.40	95	
76	73	66	73	83	71	73	68	72.9		83	90	89	90	70	55	78	82	79.6	55	15.00	91	
62	76	66	75	80	72	68	71	71.3		83	93	88	83	62	53	69	77	76.0	52	15.45	93	
62	66	65	73	81	73	73	62	69.4		84	89	93	83	65	57	78	73	77.5	55	14.00	95	
66	77	81	81	87	89	89	99	83.6		77	92	97	97	95	91	91	97	92.1	77	0.00	97	
66	68	78	79	87	89	81	82	78.8		77	82	93	95	93	94	86	88	88.5	77	0.00	95	
62	70	75	76	87	91	75	75	76.4		76	87	93	90	91	90	79	79	85.6	76	0.00	93	
92	78	78	71	72	72	84	93	80.0		97	90	90	81	63	54	71	85	78.9	54	15.00	97	
92	87	84	81	76	77	83	92	84.0		93	94	94	88	58	58	68	86	79.9	52	13.30	94	
82	82	74	72	73	75	80	92	78.7		88	85	83	73	57	52	64	87	73.6	46	14.00	90	
101	93	68	72	67	58	62	61	72.8		85	76	82	86	74	63	74	75	76.9	58	14.00	86	
93	92	66	71	70	58	60	62	71.5		87	73	77	81	74	62	73	76	75.4	62	14.50	88	
92	86	74	66	68	63	53	54	69.5		90	75	74	75	73	67	62	67	72.9	59	13.40	90	
65	71	71	73	88	97	94	89	81.0		80	91	91	90	90	85	89	91	88.4	75	1.00	97	
59	70	69	72	78	89	85	81	85.4		76	88	95	93	83	82	84	81	85.3	76	0.00	96	
58	59	67	67	75	85	83	79	71.6		72	75	95	89	87	85	85	89	84.6	72	0.00	95	
87	83	77	78	85	83	76	77	80.8		93	91	92	90	84	76	83	92	87.6	76	15.00	93	
84	83	75	76	79	78	75	80	78.8		85	86	86	79	70	62	77	92	79.7	61	14.00	95	
79	79	63	75	90	81	72	68	75.9		85	85	91	87	69	63	70	74	78.0	60	12.45	92	
65	65	61	61	64	63	55	57	61.4		91	94	89	89	89	81	74	80	85.9	74	18.00	96	
71	68	65	61	61	61	53	57	62.1		87	91	88	83	79	79	67	80	81.8	66	18.15	92	
73	71	63	59	59	56	57	55	61.6		87	90	84	82	78	73	77	80	81.4	72	14.50	91	
56	51	49	51	57	60	58	53	54.4		85	94	94	94	81	66	75	83	84.0	57	16.00	98	
50	49	44	48	56	55	60	51	51.6		80	87	89	85	68	58	76	73	77.0	55	15.10	89	
48	43	34	49	59	55	55	48	48.9		88	94	93	90	70	55	66	58	76.8	53	14.00	97	
52								74.4		90								86.3	74	13.00	94	
49								75.9		78								86.0	61	11.30	97	
49								71.1		78								79.0	57	14.15	92	




Fig. 37 - Insolation (a), précipitations (b), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 12 au 21 février 1964.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché (matinée à gauche, après-midi à droite).

b - précipitations: les rectangles noirs représentent la durée des précipitations. Le signe * indique les chutes de neige.

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin; Châteauroux: C - trait moyen; Nevers: N - trait fort.




Fig. 38 - Insolation (a), précipitations (b), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 9 au 20 février 1963.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché (matinée à gauche, après-midi à droite).

b - précipitations: les rectangles noirs représentent la durée des précipitations; le signe * indique les chutes de neige.

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin; Châteauroux: C - trait moyen; Nevers: N - trait fort.

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 9 au

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
9	Châteauroux	10.0	-2.2	-3.9	-3.9	-2.2	5.4	6.1	0.6	-0.6	-4.4	4.00	7.0	14.00
	Bourges	4.2	-2.0	-0.8	-1.6	0.3	2.6	1.9	0.6	1.0	-2.8	1.30	4.8	11.00
	Nevers	0.4	-1.5	-3.4	-3.6	-2.6	0.8	2.0	0.4	0.5	-3.9	3.00	2.1	15.00
10	Châteauroux	4.1	-0.6	0.5	1.8	4.3	7.8	8.4	2.8	1.7	-0.6	0.00	8.4	15.00
	Bourges	2.5	0.8	0.1	0.6	1.7	7.9	8.2	6.3	2.8	-0.4	2.00	8.8	16.30
	Nevers	2.6	0.2	-0.1	-0.2	0.8	4.0	6.0	3.3	1.8	-1.8	19.00*	7.0	14.30
11	Châteauroux	0.5	1.1	2.2	2.6	2.6	4.4	5.0	2.8	1.1	1.1	0.00	5.0	14.00
	Bourges	0.0	1.8	1.7	1.3	2.0	4.7	5.1	3.4	2.4	0.9	5.30	5.4	14.30
	Nevers	0.2	2.2	2.1	2.2	2.4	3.9	5.7	4.3	2.5	1.2	20.00*	5.8	14.30
12	Châteauroux	0.9	1.1	0.6	0.0	1.1	1.7	3.3	1.7	0.3	0.0	6.00	3.3	15.00
	Bourges	0.2	1.5	1.6	1.5	1.8	3.0	4.4	2.8	2.0	0.9	8.30	4.7	16.00
	Nevers	0.5	2.5	1.6	1.4	1.4	1.8	3.8	2.7	1.7	0.9	6.00	3.9	14.30
13	Châteauroux	0.0	0.1	0.1	0.4	0.6	0.6	1.1	0.0	1.7	0.6	5.00	1.1	15.00
	Bourges	0.0	0.8	0.4	-0.0	0.0	0.7	1.1	0.4	0.0	-0.8	7.30	2.8	16.00
	Nevers	0.0	0.7	0.4	0.0	0.1	0.4	0.4	0.3	-0.3	-0.2	8.00	0.8	11.30
14	Châteauroux	7.4	-2.2	-4.4	-3.9	-1.7	3.3	4.4	1.7	0.7	-4.4	2.00	4.4	13.00
	Bourges	7.0	-0.6	-3.1	-5.0	-4.9	-0.1	3.2	1.6	0.6	-6.3	8.00	3.3	14.00
	Nevers	4.8	-2.8	-3.2	-3.1	-2.6	0.4	3.0	1.5	1.1	-4.1	1.30	3.4	14.30
15	Châteauroux	0.4	1.3	2.2	2.8	4.1	5.5	7.4	4.0	2.8	0.2	22.00*	7.9	14.00
	Bourges	0.3	0.4	1.8	2.1	1.8	4.6	8.2	4.8	4.2	0.4	0.00	8.3	14.00
	Nevers	0.9	-0.4	1.1	2.2	3.7	3.6	6.1	5.8	4.4	-0.8	22.30*	6.4	16.00
16	Châteauroux	0.4	3.1	2.2	2.2	2.2	6.1	6.7	5.0	3.3	1.8	8.00	6.7	13.00
	Bourges	1.3	2.6	2.8	3.0	3.2	7.9	7.3	5.9	5.2	2.2	3.30	8.1	14.00
	Nevers	0.3	3.8	2.1	2.2	2.1	6.6	6.8	5.0	3.7	1.1	8.00	6.9	14.30
17	Châteauroux	0.0	1.7	0.6	0.6	3.4	4.6	6.7	4.1	1.4	0.6	3.00	6.7	15.00
	Bourges	0.0	2.8	2.3	2.4	3.0	5.0	6.1	4.4	1.9	1.3	7.00	6.3	17.00
	Nevers	0.9	2.0	1.1	0.8	2.3	4.0	6.3	3.3	2.5	0.4	5.30	6.3	14.30
18	Châteauroux	0.0	0.6	-1.1	-0.5	-1.0	-1.0	-0.3	-0.6	-0.3	-1.1	3.00	3.3	6.00
	Bourges	0.0	0.9	0.4	-0.6	-0.6	0.1	0.9	0.2	0.0	-0.8	8.00	0.9	15.00
	Nevers	0.0	0.6	0.1	-0.6	-1.0	0.2	0.4	0.1	-0.3	-1.4	7.30	3.1	6.00
19	Châteauroux	2.1	0.1	0.0	3.3	6.1	6.7	6.7	4.4	3.3	-0.6	19.00*	6.8	16.00
	Bourges	0.7	-0.4	0.2	1.8	4.9	4.5	4.7	5.4	4.6	-0.8	23.00*	6.4	10.00
	Nevers	0.6	0.1	0.6	3.1	6.8	6.3	5.4	5.0	4.6	-0.4	20.30*	7.8	10.30
20	Châteauroux	1.9	4.4	2.8	4.0	4.4	7.2	3.5	-1.7	-2.7	-1.7	18.00	7.2	16.00
	Bourges	0.9	4.3	3.9	3.7	4.0	7.8	5.0	-0.4	-1.6	-0.9	17.45	7.9	12.00
	Nevers	2.3	4.2	4.0	2.3	4.2	6.6	5.4	0.4	-1.6	0.4	17.30	7.3	12.30
21	Châteauroux	0.0	-5.0								-5.0	0.00	0.6	16.00
	Bourges	0.0	-2.7								-4.8	3.30	0.7	14.00
	Nevers	0.0	-3.3								-5.0	3.30	0.4	12.00

* - la veille

* - le lendemain

A U 9

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

20 février 1963

TENSIONS DE VAPEUR									HUMIDITES RELATIVES											
heures d'observation									heures d'observation											
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.
47	39	39	27	76	73	60	58	52.4	92	85	85	52	84	78	94	99	83.6	52	9.00	99
51	55	51	56	61	62	58	58	56.5	98	95	94	90	83	89	90	88	90.9	78	11.15	98
53	46	45	49	61	63	57	54	53.5	96	97	96	97	94	89	90	92	93.8	88	16.00	98
58	58	64	75	82	76	66	61	67.5	99	92	92	90	77	69	89	89	87.1	69	15.00	99
61	59	59	62	81	77	78	64	67.5	92	96	92	91	76	71	82	86	85.8	70	16.30	99
58	58	58	61	75	79	71	66	65.7	94	96	96	94	93	85	91	95	93.0	79	16.30	97
57	60	68	67	77	74	66	64	66.6	86	84	93	91	92	84	89	96	89.4	84	3.00	100
64	64	63	66	77	80	70	67	68.9	92	92	94	95	90	91	90	93	92.1	67	15.40	96
67	66	69	70	77	73	76	68	70.7	93	93	96	96	95	80	92	93	92.2	78	14.30	98
66	61	61	65	66	60	60	60	62.4	100	96	100	98	96	78	87	96	93.9	78	15.00	100
61	65	66	64	69	62	59	61	63.4	91	94	98	92	91	74	84	87	88.9	72	15.30	98
71	67	66	67	68	64	62	61	65.7	98	98	98	100	98	80	84	89	93.1	77	16.00	100
55	56	54	55	56	56	50	48	53.8	90	92	92	94	86	85	82	90	88.9	79	17.00	95
57	58	58	56	59	61	59	56	58.0	88	92	94	92	92	92	94	92	92.0	80	16.10	94
63	60	59	59	58	59	59	56	59.1	98	96	96	96	92	94	94	94	95.0	91	16.00	98
47	40	39	47	40	44	47	54	44.8	91	91	85	88	52	53	69	85	76.8	46	13.00	96
53	46	39	38	51	52	48	56	47.9	92	95	93	91	84	68	71	88	85.3	62	14.40	96
47	46	47	49	50	49	45	49	47.7	97	97	97	97	80	66	77	74	85.6	59	10.00	98
63	65	66	75	83	85	75	72	73.0	94	91	88	92	92	83	92	95	90.9	79	14.00	95
59	63	65	64	75	84	80	77	70.9	94	91	91	92	89	77	93	93	90.0	76	14.30	94
58	63	67	65	69	81	75	69	68.3	98	96	95	82	87	86	82	82	88.5	73	22.00	98
68	65	65	65	80	75	78	75	71.4	90	91	91	91	85	77	90	97	89.0	77	13.00	97
71	66	67	72	81	77	80	81	74.4	90	89	89	93	81	76	86	92	87.0	73	14.10	98
70	66	65	67	81	80	77	73	72.3	87	93	91	95	83	81	89	95	89.2	77	13.00	98
61	64	64	68	79	79	71	61	68.4	89	100	100	88	93	81	87	91	91.1	81	15.00	100
74	71	71	72	76	72	72	65	71.6	98	98	98	95	87	77	86	93	91.5	75	16.50	98
70	65	65	71	75	74	69	69	69.7	98	98	100	98	93	78	90	95	93.7	78	14.00	100
60	49	59	55	51	55	50	52	53.9	94	87	100	97	91	92	86	88	91.9	82	19.00	100
61	58	55	49	49	49	47	47	51.9	94	92	94	84	80	75	78	77	84.3	72	16.45	95
61	59	55	50	53	57	55	53	55.3	96	96	93	89	86	90	90	88	91.0	83	14.20	96
55	57	5	84	84	79	72	68	71.8	90	90	97	89	85	81	86	88	88.3	70	14.00	97
54	58	64	80	77	80	78	72	70.4	92	95	92	92	92	93	88	84	91.0	83	19.30	95
57	61	74	86	86	80	82	74	75.0	94	96	97	87	91	89	94	87	91.8	73	10.00	98
75	58	73	73	80	69	47	47	65.3	90	86	88	87	79	88	88	95	87.6	74	11.00	95
74	74	70	73	75	74	52	42	66.8	89	91	88	90	71	84	88	78	84.9	70	12.00	92
68	73	68	73	70	81	59	47	67.4	82	90	95	88	72	91	94	88	87.5	70	12.15	95
33								48.8	78								88.9	78	0.00	100
36								47.5	71								85.5	71	0.00	94
41								43.9	85								86.9	76	2.00	94

T A B L E

D O N N E E S M E T E O R O L O

Insolation,
Tension de vapeur,
Période du 3

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
3	Châteauroux	9.2	-0.6	-2.2	-2.8	0.6	8.9	12.2	5.6	2.2	-2.8	6.00	12.2	15.00
	Bourges	9.0	0.5	-0.6	-1.5	2.0	8.0	11.6	7.6	3.4	-2.8	7.05	11.9	15.10
	Nevers	9.5	1.16	-0.1	0.0	2.4	7.2	10.4	5.4	2.8	-0.6	2.10	10.6	15.10
4	Châteauroux	5.5	1.1	0.0	-2.2	2.2	10.6	12.8	7.8	4.4	-2.2	6.00	12.8	13.00
	Bourges	9.5	1.9	0.0	-0.8	3.7	11.1	13.4	9.8	5.6	-1.0	6.15	14.0	16.00
	Nevers	9.7	2.0	0.8	-1.0	4.0	10.0	12.3	7.4	2.8	-1.6	6.50	12.6	14.30
5	Châteauroux	10.0	3.9	3.9	1.7	6.1	12.8	13.9	11.1	3.9	1.7	6.00	13.9	15.00
	Bourges	9.4	3.4	2.6	0.6	4.8	13.6	15.2	10.6	7.1	0.0	6.35	15.6	15.30
	Nevers	9.2	-1.0	-1.2	-0.1	4.6	11.6	13.9	9.0	4.2	-2.0	4.20	14.1	13.50
6	Châteauroux	8.0	3.3	0.6	-0.6	6.1	6.7	18.3	13.3	8.3	-0.6	6.00	18.3	14.00
	Bourges	7.5	4.6	2.8	2.0	5.0	15.6	17.6	12.8	9.8	-0.4	7.10	18.9	14.15
	Nevers	8.6	3.2	2.8	2.9	6.2	12.8	14.8	11.8	10.1	1.2	3.10	15.0	14.20
7	Châteauroux	9.3	8.9	8.3	7.2	10.6	15.6	17.8	13.3	8.9	7.2	5.00	18.3	14.00
	Bourges	8.2	7.8	5.6	5.1	10.8	17.0	19.0	15.0	9.0	3.9	7.15	19.8	15.15
	Nevers	7.8	6.9	5.3	5.0	8.4	16.5	18.8	14.9	7.6	4.0	6.05	19.3	15.50
8	Châteauroux	3.8	6.1								4.4	5.00	14.4	10.00
	Bourges	3.7	7.6								4.4	6.15	16.9	13.00
	Nevers	4.5	5.8								3.9	23.10*	17.2	12.05

* - la veille

° - le lendemain

A U 1 0

G I Q U E S R E G I O N A L E S

Température

Humidité relative

au 7 mars 1963

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES											
heures d'observation										heures d'observation											
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.
48	47	47	57	69	61	61	53	55.4		82	91	95	89	61	43	66	74	75.1	43	15.00	95
49	49	49	53	72	64	61	57	56.8		78	84	89	75	67	47	59	73	71.5	46	15.15	91
50	52	49	58	64	61	62	59	56.9		74	86	80	80	63	48	69	79	72.4	42	15.20	87
52	52	49	57	71	51	79	74	60.6		79	86	94	80	55	35	75	89	74.1	35	15.00	95
57	53	53	60	61	58	59	66	58.4		82	88	92	75	46	38	52	73	68.3	36	14.30	92
62	55	50	56	74	68	65	56	60.8		87	85	89	69	60	48	64	74	72.0	44	15.45	91
63	71	55	78	84	84	90	73	77.3		90	88	94	83	56	53	69	90	77.9	53	15.00	95
70	55	51	80	85	76	84	64	67.9		90	75	81	67	54	43	66	63	67.4	41	15.45	93
51	51	51	61	73	74	71	56	61.0		89	91	84	72	54	47	62	67	70.8	44	14.05	93
65	54	55	70	54	47	70	66	60.1		84	85	93	73	28	23	45	61	61.5	23	14.00	93
55	54	55	47	72	59	66	72	60.0		65	72	78	54	41	30	45	60	55.6	29	16.00	82
53	56	51	50	67	61	65	68	58.9		69	75	67	53	45	36	47	55	55.9	32	16.15	76
71	66	77	77	93	92	87	83	80.8		62	61	76	66	53	45	57	72	61.5	44	14.00	81
66	62	65	80	91	92	96	87	79.9		63	68	73	62	47	42	57	76	61.0	39	15.30	79
66	65	65	70	94	102	95	93	81.3		66	73	75	64	50	47	56	89	65.0	40	16.00	90
76								77.5		81								69.0	43	10.00	89
81								80.8		77								69.4	39	11.10	89
78								82.8		87								71.5	39	11.55	97




Fig. 39 - Insolation (a), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), pouvoir évaporant de l'air (f, -symbole Ea), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 3 au 7 mars 1963.

a - insolation : la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché.

Sur les figures c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin.

Châteauroux: C - trait moyen.

Nevers: N - trait fort.

Fig. 40 - Insolation (a), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 30 juin au 8 juillet 1964.


a - insolation : la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché.

Sur les figures c, d, e, les nuits sont en grisé.


Bourges: B - trait fin.

Châteauroux: C - trait moyen.


Nevers: N - trait fort.




e



d



c



a

T A B L E

D O N N E E S M E T E O R O L O

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 30 juin

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
30	Châteauroux	15.7	14.4	10.6	11.7	18.3	21.6	23.9	22.7	16.1	8.9	4.00	23.9	15.00
	Bourges	13.7	14.2	11.5	11.2	16.8	19.9	22.0	22.2	18.3	10.4	6.10	23.1	17.00
	Nevers	14.2	11.9	7.8	10.1	15.8	18.8	21.4	21.4	13.9	6.0	4.25	22.1	15.50
1	Châteauroux	11.6	12.8	9.4	12.8	21.6	24.4	26.1	25.0	18.8	9.4	3.00	26.1	14.00
	Bourges	10.7	15.7	11.2	14.8	21.2	23.7	25.8	24.8	21.5	10.8	3.30	26.1	15.15
	Nevers	11.2	10.2	7.5	11.1	19.9	23.3	24.1	24.0	18.2	6.1	4.30	24.9	12.50
2	Châteauroux	15.7	17.2	12.8	12.8	20.0	23.9	26.1	25.0	17.2	11.7	5.00	26.1	14.00
	Bourges	14.4	17.0	13.9	13.8	19.0	22.4	24.8	23.7	19.8	12.5	4.30	25.0	15.30
	Nevers	14.0	15.8	12.4	12.7	18.2	22.6	24.2	23.2	16.8	10.6	4.40	24.4	14.40
3	Châteauroux	11.2	15.6	13.3	13.3	22.2	25.5	28.3	26.1	18.3	11.1	4.00	28.3	15.00
	Bourges	13.5	16.4	12.8	12.0	21.8	25.3	27.2	26.8	23.0	10.2	5.00	28.0	16.30
	Nevers	12.7	10.8	7.7	11.1	21.6	24.5	26.4	25.4	18.6	6.0	4.10	27.0	15.15
4	Châteauroux	7.6	17.2	14.4	15.6	22.2	26.7	26.1	23.3	18.3	13.9	4.00	26.7	11.00
	Bourges	9.3	18.8	15.0	17.1	22.5	24.3	24.9	22.2	19.1	14.8	3.30	25.6	15.40
	Nevers	10.8	12.3	10.4	13.3	21.4	24.2	24.4	20.8	17.6	8.8	3.40	25.3	13.05
5	Châteauroux	15.7	16.1	13.3	12.2	18.3	21.1	22.7	21.1	13.9	11.7	5.00	23.3	14.00
	Bourges	11.8	15.9	13.1	13.3	17.5	20.1	21.3	20.2	16.4	12.4	5.20	22.2	15.40
	Nevers	13.1	16.1	12.9	11.6	17.6	19.5	21.1	19.9	13.7	10.4	4.40	21.6	14.15
6	Châteauroux	11.5	11.1	9.4	11.1	18.8	21.1	23.9	22.2	15.0	8.3	5.00	23.9	15.00
	Bourges	13.3	14.0	10.5	12.3	17.5	20.9	22.2	21.8	18.2	8.4	4.45	22.9	17.00
	Nevers	13.6	11.4	7.8	9.1	17.9	20.8	22.2	21.1	16.1	4.0	4.30	22.4	15.15
7	Châteauroux	11.7	11.7	7.2	11.1	21.1	23.9	24.4	23.3	16.7	7.2	3.00	24.4	13.00
	Bourges	11.7	14.8	11.0	10.5	20.0	23.0	25.2	23.8	17.6	9.0	5.15	25.9	14.30
	Nevers	12.2	10.6	6.2	9.9	19.8	21.8	24.4	24.2	18.5	4.9	4.30	25.0	16.15
8	Châteauroux	10.7	11.1	10.6	12.8	18.3	21.6	23.9	23.9	16.1	10.6	23.00*25.0		16.00
	Bourges	12.6	14.0	11.2	13.8	18.6	23.4	25.4	24.5	18.2	10.7	4.40	26.4	16.30
	Nevers	10.4	15.1	12.7	13.4	18.2	22.8	26.4	26.4	19.8	11.9	5.20	26.9	15.05
9	Châteauroux	3.9	14.4								13.3	7.00	20.5	14.00
	Bourges	2.5	14.6								10.6	0.30	21.6	15.10
	Nevers	3.8	15.8								13.2	2.30	21.2	16.00

* - la veille

* - le lendemain

A U 11

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

au 8 juillet 1964

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)									HUMIDITES RELATIVES											
heures d'observation									heures d'observation											
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.
121	101	102	78	64	69	69	96	87.5	74	79	74	38	25	24	26	52	49.0	24	15.00	85
107	95	92	85	77	73	73	95	87.1	66	70	70	45	33	27	27	46	48.0	26	16.00	72
100	92	93	89	89	95	105	108	96.3	72	87	76	49	41	37	41	68	58.9	35	15.30	88
88	97	112	120	143	144	145	152	125.1	59	83	76	46	47	43	46	70	58.8	43	15.00	83
100	100	108	127	152	145	147	152	128.9	56	75	64	50	52	44	47	60	56.0	37	10.00	81
98	93	114	130	120	154	157	151	127.1	79	89	86	56	42	52	53	72	66.1	39	10.45	94
127	120	120	125	119	94	93	103	112.6	65	81	81	54	40	28	29	52	53.8	28	15.00	87
125	118	119	120	108	100	102	114	113.3	64	75	76	55	40	32	35	49	53.3	31	16.00	79
128	122	121	130	118	112	102	118	118.8	71	85	82	62	43	38	36	62	59.9	35	17.00	89
113	112	122	108	99	94	106	126	110.0	64	73	80	40	30	25	31	60	50.4	25	15.00	82
114	109	113	117	115	105	118	126	114.6	52	74	81	45	35	29	33	45	50.5	29	15.00	85
104	95	115	116	117	121	133	152	119.1	80	90	88	45	38	35	41	71	61.0	28	16.30	95
142	142	151	157	148	132	134	126	141.5	72	87	85	58	43	39	47	60	61.4	39	15.00	89
146	141	151	159	147	139	133	124	143.8	72	83	77	58	48	44	50	55	60.9	42	16.00	83
128	118	142	165	162	148	142	129	141.7	89	94	93	64	53	48	58	64	70.3	42	15.25	95
96	85	91	78	70	73	70	77	80.0	52	56	64	38	28	26	28	49	42.6	26	14.00	67
89	87	89	80	76	84	81	87	84.1	50	58	58	40	32	33	34	47	44.0	31	15.40	59
92	89	93	84	88	84	93	89	89.0	50	60	68	42	39	34	40	57	48.8	33	14.20	70
80	81	88	75	83	89	97	93	85.8	61	69	66	35	33	30	36	55	48.1	30	14.00	71
83	81	85	87	94	102	104	105	92.6	52	64	60	43	38	38	40	50	48.1	36	17.00	80
84	82	84	92	106	113	105	110	97.0	62	77	72	45	43	42	42	60	55.4	39	14.20	87
98	90	108	84	93	93	97	108	96.4	71	88	82	34	31	31	34	57	53.5	28	13.00	92
107	102	106	107	106	100	107	109	105.5	63	78	83	46	38	31	36	55	53.8	30	14.40	88
99	84	104	118	104	106	95	109	102.3	77	88	86	51	40	35	32	51	57.5	31	16.50	90
114	118	137	126	109	114	108	129	119.4	86	92	93	60	42	38	36	70	64.6	32	17.00	93
107	110	126	131	119	128	115	130	128.0	67	83	80	61	42	40	38	62	59.1	36	16.00	88
115	106	124	112	108	108	110	125	113.5	67	72	81	53	39	32	34	54	54.0	31	15.40	81
142								141.8	87								80.5	54	14.00	100
129								140.3	78								79.1	54	15.10	98
107								129.9	60								72.3	48	15.30	89

D O N N E E S M E T E O R O L O

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 7 au

Dates	Stations	Insola- tion	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
7	Châteauroux	5.3	17.2	16.7	15.0	20.0	21.1	17.2	20.0	16.7	15.0	2.00	22.2	15.00
	Bourges	4.8	20.1	16.2	15.0	18.4	21.0	18.2	19.1	16.0	14.9	6.30	23.1	13.45
	Nevers	2.4	22.0	17.2	14.8	16.9	20.3	23.2	17.4	15.6	14.6	6.05	23.4	15.15
8	Châteauroux	6.5	13.9	13.9	13.9	18.3	18.8	19.4	19.4	15.6	13.3	4.00	19.4	13.00
	Bourges	5.0	14.0	13.2	13.6	17.4	19.0	18.0	18.4	16.6	12.0	5.15	21.1	13.30
	Nevers	5.6	14.9	12.5	13.7	17.4	19.4	19.8	18.5	18.4	12.0	2.50	20.8	12.15
9	Châteauroux	3.0	12.8	13.3	14.4	17.2	16.7	19.4	20.0	15.6	12.8	0.00	21.1	11.00
	Bourges	2.8	14.2	13.1	13.0	14.2	17.4	18.2	18.8	16.6	11.6	4.20	19.4	17.00
	Nevers	1.6	13.4	11.0	12.6	15.6	16.3	17.7	17.7	15.4	10.2	3.25	18.6	15.10
10	Châteauroux	3.3	12.2	11.7	11.1	15.6	20.0	20.5	20.0	16.1	10.0	4.00	21.1	14.00
	Bourges	1.2	14.8	13.0	12.6	15.2	19.5	20.0	19.2	17.2	12.4	4.00	20.8	13.30
	Nevers	4.8	14.3	13.9	13.5	15.8	19.3	20.7	19.3	16.8	13.1	5.35	20.9	14.40
11	Châteauroux	2.8	13.9	13.3	14.4	16.7	18.3	21.6	17.8	13.9	12.8	1.00	21.6	15.00
	Bourges	0.9	15.6	14.3	14.0	15.9	18.4	18.1	16.6	14.8	14.0	5.50	19.2	12.50
	Nevers	0.4	15.7	14.2	14.4	15.1	15.8	17.8	15.4	14.0	13.7	3.50	18.3	15.30
12	Châteauroux	7.3	11.1	8.9	8.9	16.1	20.0	20.0	20.0	14.4	6.7	5.00	20.5	14.00
	Bourges	7.0	12.2	10.2	8.4	11.0	17.8	21.2	19.5	16.4	7.8	6.15	22.1	14.30
	Nevers	6.0	11.3	9.9	9.3	12.6	17.2	19.7	19.4	12.1	9.0	5.40	20.4	16.15
13	Châteauroux	8.2	12.8	9.4	9.4	17.8	21.1	23.3	22.2	16.7	8.3	5.00	23.3	15.00
	Bourges	9.6	13.1	10.1	10.1	17.2	20.8	22.4	21.6	18.0	9.8	5.20	24.0	15.40
	Nevers	5.7	9.2	7.2	7.2	14.4	19.9	20.6	20.7	15.7	6.0	5.15	22.4	14.05
14	Châteauroux	8.9	14.4	11.7	12.8	19.4	23.9	24.4	23.9	18.8	11.1	4.00	25.0	16.00
	Bourges	8.1	15.4	12.8	13.6	18.5	23.2	25.4	23.8	21.1	12.4	6.30	25.8	14.15
	Nevers	9.1	11.3	8.6	8.9	18.4	23.4	24.6	23.6	20.4	7.3	4.55	25.4	15.25
15	Châteauroux	7.1	15.6	13.9	13.3	21.1	26.1	26.1	24.4	20.0	11.7	5.00	26.1	14.00
	Bourges	6.2	17.2	15.4	13.0	20.0	24.3	24.3	23.7	21.4	12.6	6.20	25.6	14.00
	Nevers	6.7	17.3	16.3	15.8	19.0	23.7	23.3	23.4	17.4	15.4	4.40	24.5	12.15
16	Châteauroux	11.4	15.6	13.9	13.3	19.4	25.5	28.9	28.3	19.4	12.8	5.00	28.9	15.00
	Bourges	11.2	17.8	15.0	13.2	20.4	25.8	28.8	28.0	21.2	12.4	5.30	29.0	17.00
	Nevers	12.2	15.3	13.0	11.6	20.4	25.9	27.0	26.0	19.1	10.8	5.30	27.9	15.05
17	Châteauroux	9.7	16.7	15.6	15.6	28.3	30.0	30.0	26.1	20.0	14.4	4.00	30.0	12.00
	Bourges	9.1	19.0	16.7	16.4	27.2	28.9	29.8	27.2	19.3	15.4	4.15	30.8	16.00
	Nevers	8.3	18.3	17.2	17.3	24.0	30.3	28.8	19.2	19.1	16.1	4.25	30.8	11.45
18	Châteauroux	5.6	18.3	15.6	14.4	18.8	20.0	19.4	15.6	15.0	14.4	4.00	21.1	11.00
	Bourges	6.4	17.8	17.6	15.0	19.0	20.0	19.7	16.8	14.9	15.0	5.50	22.2	12.40
	Nevers	5.8	17.3	17.1	14.8	18.3	21.0	21.4	17.6	15.2	14.4	5.55	22.5	14.20
19	Châteauroux	3.9	14.4	13.9	13.9	15.6	19.4	21.1	18.3	14.4	13.9	2.00	21.1	15.00
	Bourges	2.8	15.0	14.5	14.2	15.8	17.6	20.1	19.1	15.6	14.1	5.40	20.5	15.45
	Nevers	3.9	15.4	14.3	14.3	15.7	18.1	20.2	18.6	15.3	14.0	5.40	20.4	14.30
20	Châteauroux	10.7	10.6	11.1	10.6	15.6	17.8	21.1	19.4	14.4	10.0	5.00	21.1	15.00
	Bourges	8.7	14.0	11.0	9.7	15.8	17.8	20.1	19.2	15.4	9.6	6.10	21.0	14.00
	Nevers	9.8	14.0	11.3	9.8	15.4	18.2	20.2	17.8	13.2	9.1	4.50	20.8	14.50
21	Châteauroux	2.7	12.8	10.6	10.6	13.3	16.7	21.1	19.4	16.7	10.0	4.00	21.1	14.00
	Bourges	3.3	15.0	13.2	11.2	14.3	18.9	21.0	20.7	17.0	11.0	5.30	21.7	16.00
	Nevers	2.6	10.1	6.8	9.0	13.5	18.8	19.5	19.0	16.8	6.6	3.45	19.8	16.00
22	Châteauroux	5.8	16.1	15.6	14.4	18.3	18.3	20.5	21.1	17.8	14.4	6.00	21.6	16.00
	Bourges	6.9	15.5	15.0	15.0	18.1	21.0	22.5	21.7	18.2	14.7	4.50	22.9	14.30
	Nevers	5.3	13.8	13.3	14.1	16.0	20.8	21.1	20.9	14.8	13.0	2.20	23.0	13.30
23	Châteauroux	13.8	15.6								12.2	5.00	24.4	15.00
	Bourges	11.8	17.7								11.3	5.50	25.2	15.35
	Nevers	11.2	9.8								7.3	5.40	23.3	14.45

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

22 août 1964

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)									HUMIDITES RELATIVES											
heures d'observation									heures d'observation											
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.
144	142	165	168	156	186	131	126	152.3	74	75	97	72	62	95	56	66	74.6	49	11.00	97
137	139	163	142	142	190	140	140	149.1	58	76	96	67	57	91	63	78	73.3	48	13.40	96
134	142	157	163	167	173	165	160	157.6	51	72	93	85	70	61	83	90	75.6	51	0.00	94
127	130	141	128	111	124	124	118	125.4	80	82	89	61	51	55	55	67	67.5	51	11.00	93
131	130	141	127	131	136	121	121	129.8	82	86	91	64	60	65	58	64	71.3	50	13.00	91
131	119	132	135	123	127	130	161	132.2	78	82	84	68	54	55	61	76	69.7	47	13.00	87
122	135	160	196	178	145	115	130	147.6	82	88	98	100	94	65	49	73	81.1	49	18.00	100
130	135	139	164	186	164	148	155	152.6	80	89	93	100	94	79	68	82	85.6	66	17.00	100
132	121	136	159	176	187	157	145	151.6	86	92	93	90	95	93	80	83	89.0	76	17.50	96
127	123	129	140	116	116	119	135	125.6	89	89	97	80	49	48	51	74	72.1	44	14.00	97
147	136	130	139	124	122	132	135	133.1	87	91	89	81	54	52	62	69	73.1	47	13.30	93
135	134	139	138	130	121	128	129	131.7	83	85	90	78	59	50	57	68	71.2	49	14.40	91
125	131	155	150	128	126	150	148	139.1	79	86	94	79	61	49	74	93	76.9	49	15.00	98
136	135	136	160	140	138	151	154	143.8	77	83	86	89	66	67	80	91	79.9	62	13.10	94
141	140	146	159	159	156	158	140	149.8	80	87	89	92	89	76	90	88	86.4	68	15.45	95
129	109	109	130	111	111	111	109	114.9	97	96	96	71	47	47	47	66	70.9	39	14.00	100
129	115	104	135	123	110	109	119	118.0	90	92	94	85	61	44	48	64	72.3	42	14.30	94
127	118	114	134	124	124	123	123	123.3	95	97	97	62	63	54	54	87	79.8	47	15.40	97
117	106	110	143	132	128	131	138	125.6	79	90	93	70	53	45	49	73	69.0	45	15.00	93
115	112	117	144	144	132	146	149	132.4	76	91	95	74	59	49	56	72	71.5	45	16.00	96
109	97	95	138	141	137	145	154	127.0	93	96	94	85	61	57	59	86	78.9	53	13.45	97
136	127	143	150	139	153	121	158	140.9	83	93	96	66	47	50	41	73	68.6	37	16.00	100
147	132	141	151	135	128	132	150	139.5	84	88	91	70	48	40	46	59	65.8	40	14.50	93
127	107	109	153	165	151	175	157	143.0	95	96	96	73	57	49	60	66	74.0	43	15.35	97
140	148	144	155	138	122	124	131	137.8	80	93	94	62	41	36	40	56	62.8	36	14.00	98
167	158	139	162	155	142	161	163	155.9	81	90	93	70	51	47	55	64	68.9	46	13.00	93
179	176	169	178	160	173	186	176	174.6	91	95	95	81	54	60	65	89	78.7	50	12.15	96
134	136	135	150	130	127	121	115	131.0	76	86	88	66	40	31	32	51	58.8	30	16.00	93
167	137	137	151	124	130	150	154	143.8	82	81	91	63	37	33	40	62	61.1	31	16.00	92
161	143	130	157	180	156	155	165	155.8	92	95	95	66	54	44	47	74	70.8	39	15.30	96
127	118	131	136	146	141	156	131	135.8	67	67	74	35	35	35	46	56	51.9	35	12.00	76
158	144	144	106	141	136	107	152	136.0	71	76	78	30	36	33	30	66	52.5	26	17.00	88
150	146	136	143	161	157	209	191	161.6	71	75	69	47	38	40	94	87	62.6	33	12.05	95
150	166	155	158	168	169	155	152	159.1	71	94	94	73	72	75	87	89	81.9	59	11.00	95
179	142	141	139	142	137	155	146	147.8	88	71	83	64	62	60	81	86	74.4	58	15.40	90
185	78	140	149	130	117	143	152	149.2	94	92	94	71	52	46	72	88	74.9	44	14.40	94
146	137	141	134	112	96	108	103	122.1	89	87	89	76	50	39	51	63	68.0	39	15.00	89
134	131	128	128	113	95	86	105	115.0	79	80	79	71	56	40	39	59	62.9	32	12.50	90
134	136	130	129	104	97	106	123	119.8	77	84	81	72	50	41	49	71	65.6	39	15.15	88
104	115	118	100	91	89	85	98	100.0	81	88	92	56	45	35	37	60	61.8	35	15.00	92
96	100	102	90	87	87	85	97	93.0	60	77	85	50	43	37	38	55	55.6	35	16.00	88
111	107	107	102	100	105	112	115	107.3	69	80	88	58	48	44	55	76	64.7	40	14.50	93
102	101	113	133	163	165	191	184	144.0	69	79	89	87	87	66	85	97	82.4	66	14.00	100
96	97	100	112	138	151	158	171	127.9	57	64	75	68	63	60	65	89	67.6	56	0.15	95
104	92	105	122	154	162	152	166	132.1	85	93	92	79	71	71	70	92	81.6	62	12.15	97
183	177	164	177	167	156	143	168	167.0	100	100	100	85	85	65	57	83	83.8	55	17.00	100
166	161	161	170	159	146	143	171	159.6	95	95	95	82	64	54	55	82	77.8	46	15.50	96
153	148	156	164	154	155	153	154	154.6	97	96	97	90	63	62	61	91	82.1	47	13.30	97
126							105.5		71								53.6	28	12.00	82
146							103.9		72								51.3	22	17.10	90
115							110.1		95								69.0	31	14.45	97




Fig. 43 - Insolation (a), précipitations (b), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 7 au 22 août 1964.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché (matinée à gauche, après-midi à droite).

b - les rectangles noirs représentent la durée des précipitations.

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin; Châteauroux: C - trait moyen; Nevers: N - trait fort.




Fig. 44 - Insolation (a), précipitations (b), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole U), humidité relative (e, -symbole U) à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 8 au 29 octobre 1963.

a - insolation : la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour - la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché (matinée à gauche, après-midi à droite).

b - précipitations : les rectangles noirs représentent la durée des précipitations.

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin.
Châteauroux: C - trait moyen
Nevers: N - trait fort.

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 8 au

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
8	Châteauroux	5.4	11.1	10.6	0.6	11.1	13.3	16.1	14.4	12.2	10.6	2.00	16.1	15.00
	Bourges	1.5	12.4	9.1	8.6	10.7	14.9	16.4	15.0	14.7	7.5	6.45	16.2	14.00
	Nevers	1.6	9.9	9.0	8.8	12.0	15.4	15.8	12.9	8.3	7.8	5.15	16.2	11.20
9	Châteauroux	2.9	10.0	7.2	7.2	12.2	16.1	16.1	15.6	13.9	7.2	3.00	16.1	12.00
	Bourges	1.5	13.6	12.5	10.6	15.2	16.9	17.1	15.3	14.6	10.4	6.20	17.7	14.20
	Nevers	1.1	10.0	9.4	10.1	13.1	16.1	16.6	15.7	14.7	7.2	21.50*	16.9	15.30
10	Châteauroux	8.0	12.2	10.6	8.9	8.3	14.4	15.6	13.3	9.4	7.8	7.00	16.1	14.00
	Bourges	9.5	13.2	9.8	9.8	11.9	15.4	16.7	14.4	10.3	9.0	7.30	17.8	14.00
	Nevers	8.7	13.6	11.5	10.1	11.4	15.4	16.3	12.1	7.7	10.0	5.40	16.8	13.45
11	Châteauroux	8.8	9.4	8.9	9.4	12.2	15.6	17.8	12.8	10.0	7.8	2.00	17.8	15.00
	Bourges	9.0	10.0	8.6	10.0	13.0	16.8	18.4	15.6	11.6	8.6	2.30	18.6	15.15
	Nevers	5.9	6.4	6.0	4.1	9.2	14.9	18.1	13.0	8.4	3.2	6.45	18.1	14.45
12	Châteauroux	11.1	8.9	7.8	6.1	11.7	20.0	21.1	13.9	10.6	6.1	6.00	21.6	14.00
	Bourges	9.5	9.6	8.0	6.3	12.0	19.0	21.0	16.6	13.1	5.6	6.40	21.6	14.40
	Nevers	9.1	5.4	4.4	4.8	10.2	17.8	21.8	13.6	7.0	2.9	4.00	22.00	14.55
13	Châteauroux	3.7	7.8	6.1	6.1	13.3	11.7	12.8	12.2	11.7	6.1	3.00	14.4	10.00
	Bourges	5.5	9.6	6.3	6.2	14.1	18.0	13.6	12.4	12.2	5.0	5.15	18.4	12.10
	Nevers	7.8	4.7	6.7	5.1	11.7	18.6	14.8	12.7	11.7	2.9	1.00	19.7	12.50
14	Châteauroux	8.4	10.0	10.6	10.0	11.1	13.3	13.9	10.0	7.8	10.0*	13.00	14.4	14.00
	Bourges	6.5	11.6	11.7	11.0	10.8	14.0	13.8	11.6	8.8	10.8	8.30	14.9	14.20
	Nevers	7.4	11.7	11.4	9.1	10.8	13.7	13.9	9.2	6.0	8.7	6.05	14.2	14.10
15	Châteauroux	6.1	4.4	3.9	3.9	7.2	12.2	14.4	9.4	6.7	2.8	2.00	14.4	14.00
	Bourges	7.5	7.1	4.6	2.6	7.6	12.7	15.0	11.6	8.7	2.0	5.30	15.5	15.15
	Nevers	6.3	2.8	1.0	-0.4	7.0	13.3	14.8	9.7	4.0	-1.1	5.30	15.1	14.30
16	Châteauroux	8.1	4.4	3.3	2.8	7.2	15.6	17.8	12.8	9.4	2.8	5.00	17.8	14.00
	Bourges	6.3	4.8	5.3	4.3	7.0	16.2	19.1	13.9	8.8	4.1	6.10	19.2	15.50
	Nevers	5.9	2.5	1.6	2.8	8.3	13.9	17.0	11.0	7.4	1.1	2.40	17.1	14.45
17	Châteauroux	2.6	7.8	7.8	10.6	11.7	15.6	16.7	12.8	12.2	7.2	2.00	16.7	14.00
	Bourges	1.6	6.7	8.9	9.8	12.7	15.9	17.0	13.5	11.8	6.4	0.30	18.6	13.40
	Nevers	2.8	5.1	6.5	6.6	13.5	14.4	16.6	14.1	11.0	4.8	23.45*	16.7	14.45
18	Châteauroux	6.0	10.6	8.3	8.3	10.0	13.3	15.6	11.7	9.4	8.3	3.00	15.6	15.00
	Bourges	3.9	11.1	10.5	9.5	10.1	13.0	16.2	13.0	8.7	9.0	6.40	17.0	15.20
	Nevers	4.0	10.5	8.9	10.5	11.1	13.9	15.3	9.3	4.5	7.4	1.45	16.2	15.55
19	Châteauroux	9.6	6.7	6.1	5.6	9.4	19.4	21.6	15.6	12.2	4.4	7.00	21.6	14.00
	Bourges	8.7	6.4	6.4	6.5	10.8	20.0	22.5	16.2	12.3	5.6	2.15	22.9	15.10
	Nevers	9.5	3.2	2.8	4.1	9.0	16.8	19.7	13.6	11.4	2.0	2.20	19.8	14.45

* - la veille

* - le lendemain

A U 13

G I Q U E S R E G I O N A L E S

Température

Humidité relative

30 octobre 1963

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES											
heures d'observation										heures d'observation											
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.
129	123	125	132	133	135	136	134	130.9		97	96	96	100	87	74	83	94	90.9	70	14.00	100
137	112	107	124	141	126	137	136	127.5		95	97	96	96	84	68	81	81	87.3	67	15.40	99
110	107	107	129	130	133	130	102	118.5		90	93	94	91	74	74	87	94	87.1	69	12.30	98
123	102	102	138	140	140	153	141	129.9		100	100	100	98	77	77	86	89	90.9	72	16.00	100
138	131	124	139	144	151	164	148	142.4		89	91	97	81	75	77	95	89	86.8	71	13.15	97
119	114	120	133	135	145	158	155	134.9		97	97	97	88	77	74	89	92	88.9	70	12.45	97
134	123	114	109	90	92	102	96	107.5		94	96	100	100	54	52	66	82	80.5	52	15.00	100
130	112	113	103	98	90	107	104	107.1		86	92	93	74	56	47	65	83	74.5	42	15.10	95
143	125	117	113	98	109	111	95	113.9		92	93	95	84	56	59	78	90	80.9	48	13.05	95
96	101	104	112	122	123	117	113	111.0		82	88	88	78	69	60	79	92	79.5	60	15.00	96
97	102	107	114	123	125	126	122	114.5		79	92	87	76	64	59	71	89	77.1	57	14.00	93
90	90	79	112	118	129	126	106	106.2		94	97	97	96	70	62	84	96	87.0	59	13.30	97
109	102	94	123	125	120	120	118	113.9		96	96	100	89	54	48	76	92	81.4	46	14.00	100
110	102	93	124	139	129	139	133	121.1		92	94	97	88	63	52	74	88	81.0	52	14.45	97
87	82	85	108	140	160	134	95	11.4		97	98	98	87	69	61	86	96	86.5	59	14.30	98
102	94	94	122	127	127	117	118	112.6		96	100	100	80	93	86	82	86	90.4	80	9.00	100
115	90	92	136	139	133	120	122	118.4		96	94	97	85	68	85	83	86	86.8	68	11.50	97
83	95	87	121	138	134	119	122	112.4		97	97	98	88	65	80	81	89	86.9	62	12.30	98
113	123	113	97	82	74	84	82	96.0		92	96	92	73	54	47	69	77	75.0	41	15.00	97
125	126	115	101	85	77	87	93	101.1		91	91	88	78	53	49	64	83	74.6	46	14.20	92
121	128	108	105	94	87	89	83	101.9		88	95	93	81	60	55	76	89	79.6	53	14.05	95
77	73	73	85	88	67	71	68	75.3		92	90	90	84	62	42	60	70	73.8	41	16.00	100
85	76	67	89	81	67	64	69	74.8		84	90	91	85	55	40	47	62	69.3	38	14.30	95
68	61	55	87	96	80	81	73	75.1		91	92	94	87	63	47	68	90	79.0	44	14.10	96
68	68	66	85	93	108	107	106	87.6		82	88	89	84	53	53	72	90	76.4	51	14.00	93
69	71	71	83	90	91	102	95	84.0		81	80	85	83	49	41	64	84	70.9	38	13.30	91
69	63	66	87	113	109	104	95	88.2		95	82	89	80	71	57	79	93	80.7	50	14.20	96
97	97	112	136	138	133	127	134	121.8		91	91	88	99	79	70	86	94	87.3	70	15.00	99
89	100	102	135	136	129	129	124	118.0		91	88	85	92	76	67	83	89	83.9	64	13.20	96
84	92	93	118	152	134	134	117	115.5		95	95	95	76	92	71	84	89	87.1	70	14.55	95
123	109	109	123	149	115	112	101	117.6		96	100	100	100	98	65	82	85	90.8	62	16.00	100
127	118	115	120	118	102	94	96	111.3		96	94	97	97	79	55	63	85	83.3	55	14.50	99
119	109	122	124	129	119	100	81	112.9		94	96	96	94	81	69	85	97	89.0	58	15.30	98
89	92	83	110	131	131	130	124	111.3		91	97	91	93	59	51	73	87	80.3	51	14.00	97
85	87	92	107	131	130	142	126	112.5		88	91	95	82	56	48	78	88	78.3	46	14.40	96
76	74	81	101	127	139	128	122	106.0		98	98	98	88	66	60	82	90	85.0	57	13.00	98

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 8 au
suite

Dates	Stations	Insolation	TEMPERATURES											
			heures d'observation											
			0	3	6	9	12	15	18	21	Tn	heure	Tx	heure
20	Châteauroux	6.8	10.0	8.3	6.7	12.8	21.1	20.5	16.1	15.0	6.7	6.00	21.1	12.00
	Bourges	7.4	11.2	10.3	8.7	13.8	21.0	21.8	17.1	15.0	8.5	6.10	23.0	14.15
	Nevers	8.0	9.3	8.4	7.4	14.0	19.6	20.2	15.3	12.0	6.9	1.15	20.9	14.25
21	Châteauroux	6.0	14.4	13.9	13.3	16.1	18.3	20.5	15.6	12.2	12.8	4.00	20.5	14.00
	Bourges	6.9	15.0	13.4	13.6	16.5	21.3	22.0	17.8	14.1	12.8	4.00	22.6	14.30
	Nevers	7.2	12.7	12.6	10.0	15.2	20.4	21.0	14.3	11.6	9.2	5.30	21.0	14.45
22	Châteauroux	10.5	10.6	9.4	8.3	13.9	20.0	21.6	16.1	13.3	7.8	4.00	21.6	14.00
	Bourges	8.4	11.4	10.0	8.6	14.6	21.6	23.2	19.6	15.6	8.4	4.40	23.6	15.15
	Nevers	7.7	8.3	7.7	6.6	12.8	20.6	22.6	15.2	11.5	5.4	6.45	22.9	13.50
23	Châteauroux	10.5	12.8	10.0	10.0	14.5	21.6	23.3	18.3	13.9	9.4	7.00	23.3	13.00
	Bourges	9.6	12.7	11.0	11.0	15.2	22.5	23.0	18.9	13.9	10.4	6.30	23.8	15.20
	Nevers	8.1	9.7	8.5	8.1	12.6	20.3	22.8	14.9	10.6	7.1	3.50	22.8	14.45
24	Châteauroux	8.9	12.8	10.6	8.9	10.6	18.3	20.0	16.1	12.2	8.3	7.00	20.0	14.00
	Bourges	6.7	11.9	12.0	10.0	10.4	18.9	21.0	18.0	14.4	10.0	5.50	21.9	14.30
	Nevers	4.0	9.5	6.7	10.0	11.1	13.6	19.0	12.8	7.0	5.4	3.45	19.2	14.40
25	Châteauroux	6.8	12.2	11.7	11.1	11.7	14.4	16.1	10.6	8.9	10.6	18.00	16.1	14.00
	Bourges	7.5	12.3	12.3	12.1	11.8	15.7	17.0	12.8	8.2	11.6	8.40	17.6	15.15
	Nevers	6.1	11.5	11.0	10.2	11.4	14.2	16.6	10.4	6.8	5.8	22.00*	17.0	14.20
26	Châteauroux	3.6	6.7	5.6	5.6	6.1	8.3	13.9	9.4	6.1	5.0	4.00	13.9	15.00
	Bourges	5.5	7.2	7.0	5.8	7.3	13.3	14.8	10.6	7.5	5.4	6.15	15.6	13.55
	Nevers	5.0	3.8	4.6	6.9	7.8	12.3	14.4	8.0	4.0	2.4	0.50	14.9	14.30
27	Châteauroux	0.0	3.9	3.9	5.0	4.4	7.2	7.8	7.8	7.2	3.9	0.00	8.3	22.00
	Bourges	0.0	5.2	2.1	2.9	4.8	7.6	8.0	8.4	6.8	1.8	3.15	8.6	16.00
	Nevers	0.0	1.8	2.6	4.2	6.4	9.0	9.7	8.3	7.3	1.0	1.35	9.8	14.45
28	Châteauroux	5.4	7.7	6.7	7.2	7.8	10.6	12.8	6.7	6.1	6.7	2.00	12.8	13.00
	Bourges	3.4	7.0	7.3	7.2	8.0	8.8	9.1	6.8	7.0	6.6	21.20*	10.0	14.00
	Nevers	2.0	7.5	7.1	7.1	6.6	9.3	10.1	5.0	4.9	5.0	17.45	10.2	14.40
29	Châteauroux	1.2	5.0	2.8	2.2	2.2	3.3	6.1	3.3	2.2	2.2	6.00	6.1	15.00
	Bourges	2.7	5.0	3.7	3.1	4.0	5.1	8.9	4.4	-0.3	2.8	5.15	8.9	14.20
	Nevers	2.5	3.4	3.8	4.3	4.9	5.2	8.8	3.7	-1.8	1.2	23.05*	9.2	14.20
30	Châteauroux	1.0	0.6	1.1	1.1	3.9	11.7	12.8	13.1	12.8	0.6	0.00	13.9	14.00
	Bourges	3.0	1.4	1.8	3.2	5.6	11.5	14.2	13.0	12.7	-1.0	22.10*	14.5	14.30
	Nevers	4.0	0.8	2.3	2.2	6.2	12.1	14.7	15.6	13.1	-3.8	23.10*	16.1	17.15
31	Châteauroux	2.1	12.2								8.9	18.00	13.3	13.00
	Bourges	2.5	12.1								10.8	7.00	14.3	15.30
	Nevers	1.1	11.8								9.2	16.25	13.2	11.50

* - la veille

° - le lendemain

A U 13

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

30 octobre 1963

et fin

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)										HUMIDITES RELATIVES												
heures d'observation										heures d'observation												
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne		min.	heure	max.
118	107	93	127	132	131	140	139	123.4		96	97	95	86	53	54	77	81	79.9		53	12.00	100
119	115	104	123	129	136	173	143	130.3		90	92	93	78	52	52	89	84	78.8		47	14.00	93
111	106	98	124	150	151	146	132	127.2		95	96	96	78	66	63	84	94	84.0		59	14.00	97
148	148	149	140	144	148	140	134	143.9		90	93	98	77	69	61	80	94	82.8		60	14.00	98
143	139	143	140	146	136	143	141	141.4		84	91	92	75	57	51	70	88	76.0		45	13.40	95
140	139	118	139	151	162	139	122	138.7		95	95	96	81	63	65	86	90	83.9		61	14.00	96
123	118	109	136	154	149	145	144	134.8		96	100	100	86	66	58	80	94	85.0		58	15.00	100
128	116	107	134	144	153	154	147	135.8		95	95	96	83	55	53	67	83	78.4		50	14.30	96
105	104	96	130	170	162	149	126	130.2		96	99	99	88	70	59	86	93	86.3		57	14.10	99
137	123	118	136	154	139	150	148	138.1		93	100	96	83	60	49	71	93	80.6		49	15.00	100
131	123	124	147	159	155	147	130	139.5		89	94	95	85	58	55	67	82	78.1		51	14.10	95
116	110	107	134	169	170	141	121	133.5		97	99	99	92	71	61	84	95	87.3		59	14.30	99
132	123	109	128	144	150	151	134	133.9		89	96	96	100	69	64	82	94	86.3		61	14.00	100
129	129	118	119	159	162	154	144	139.3		93	91	96	95	73	65	75	88	84.5		62	14.30	97
114	95	118	129	140	165	132	93	123.2		96	97	96	97	90	75	89	93	91.6		75	14.45	97
138	132	129	119	106	120	95	97	117.0		98	96	97	87	65	66	74	85	83.5		65	12.00	98
136	135	126	106	107	84	94	100	111.0		95	94	89	76	61	43	64	92	76.8		43	15.00	95
128	123	110	112	112	121	107	95	113.5		94	94	88	83	69	64	85	96	84.1		59	14.05	96
89	83	91	94	109	110	96	84	94.5		91	91	100	100	100	69	82	89	90.3		67	16.00	100
95	90	87	97	119	111	105	96	100.0		94	90	94	96	78	66	82	93	86.6		65	14.00	97
76	83	98	103	117	118	95	78	96.0		95	98	99	97	82	72	89	97	91.1		69	14.10	99
77	81	83	84	102	106	106	102	92.6		95	100	95	100	100	100	100	100	98.8		95	0.00	100
85	69	74	83	98	103	104	97	89.1		97	98	98	97	94	96	94	99	96.6		93	17.00	99
67	71	80	93	107	109	104	98	91.1		96	96	97	97	93	91	94	96	95.0		88	16.15	97
104	98	94	102	108	120	89	94	101.1		99	100	93	96	85	81	91	100	93.1		81	13.00	100
94	97	97	93	95	89	93	93	93.9		94	96	96	87	84	77	94	93	90.1		76	14.30	98
100	97	93	90	96	93	92	93	91.7		96	96	93	93	82	76	94	95	90.6		74	15.05	96
87	71	72	69	77	92	75	69	76.5		100	95	100	96	100	97	97	96	97.6		94	22.00	100
82	78	75	77	84	83	78	57	76.8		94	98	98	95	95	72	93	96	92.6		70	15.15	98
74	78	80	81	82	87	74	51	75.9		95	97	97	94	92	77	93	96	92.6		72	15.15	97
60	66	66	77	100	126	142	132	96.1		94	100	100	95	72	85	94	89	91.1		72	12.00	100
65	67	74	77	76	100	136	138	91.6		96	96	97	85	57	62	91	94	84.8		55	12.15	97
62	69	69	78	89	103	118	133	90.1		96	96	96	82	63	62	67	88	81.2		56	12.05	96
134								115.8		94								88.3		70	15.00	96
128								119.3		90								86.6		64	16.00	97
122								111.5		88								88.9		64	12.50	94




Fig. 45 - Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche.
Période du 8 au 29 octobre 1963.



Fig. 46 - Evaporation quotidienne mesurée à Bourges
au tube de Piche.-Période du 3 au 17 mai 1963.




Fig. 47 - Insolation (a), précipitations (b), température (c, -symbole T), tension de vapeur (d, -symbole e), humidité relative (e, -symbole U), à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 3 au 17 mai 1963.

a - insolation: la surface du demi-cercle figure la durée astronomique du jour; la surface des secteurs noirs est proportionnelle au temps pendant lequel le soleil est caché (matinée à gauche, après-midi à droite).

b - les rectangles noirs représentent la durée des précipitations.

Sur les figures b, c, d, e, les nuits sont en grisé.

Bourges: B - trait fin; Châteauroux: C - trait moyen; Nevers: N - trait fort.

TABLE

DONNEES METEOROLO

Insolation,

Tension de vapeur,

Période du 3

Dates	Stations	Insola- tion	TEMPERATURES											
			heures d'observation								Tn	heure	Tx	heure
			0	3	6	9	12	15	18	21				
3	Châteauroux	5.7	5.6	3.3	3.9	8.3	10.6	10.6	10.0	8.4	3.3	3.00	11.1	14.00
	Bourges	4.7	3.2	2.6	3.4	8.2	11.2	11.3	10.3	9.0	1.7	4.40	11.7	15.10
	Nevers	4.4	3.1	4.0	1.2	8.2	10.7	11.2	10.4	8.8	-1.6	4.15	11.4	15.10
4	Châteauroux	12.8	8.9	6.1	5.0	9.4	11.1	13.3	13.3	9.4	4.4	5.00	13.3	15.00
	Bourges	9.6	7.0	5.0	4.1	7.6	11.6	14.0	13.9	10.8	2.4	4.10	14.8	15.30
	Nevers	9.6	7.6	5.6	5.6	7.2	11.6	14.2	14.1	8.4	5.1	2.50	15.0	16.45
5	Châteauroux	7.9	6.7	3.9	3.9	12.8	17.2	17.2	16.1	11.1	2.8	5.00	17.2	15.00
	Bourges	10.8	7.8	3.8	4.8	12.2	16.3	16.7	16.3	11.4	2.4	5.20	17.8	16.10
	Nevers	11.9	3.8	1.0	1.9	12.1	15.9	17.0	16.6	9.9	-0.9	4.30	17.6	16.30
6	Châteauroux	4.8	8.3	7.2	8.3	11.1	13.3	15.0	15.0	10.6	7.2	2.00	15.6	16.00
	Bourges	4.9	9.0	8.8	9.0	11.9	15.4	16.0	17.1	13.2	7.9	2.00	17.1	17.50
	Nevers	5.8	6.1	5.3	7.9	12.0	14.9	16.4	16.1	9.4	4.8	2.15	16.9	15.05
7	Châteauroux	14.7	7.8	7.2	7.2	13.9	20.0	22.7	21.6	14.4	6.7	5.00	22.7	15.00
	Bourges	12.6	9.6	8.0	9.0	15.6	21.0	22.9	23.0	18.6	6.4	4.30	23.7	16.20
	Nevers	12.7	7.6	5.0	7.1	15.8	19.6	22.1	22.9	13.7	3.9	4.10	23.4	16.05
8	Châteauroux	12.3	11.1	8.3	10.6	17.8	23.0	23.9	21.6	17.2	8.3	3.00	23.9	16.00
	Bourges	12.5	13.9	9.6	9.0	19.4	23.7	25.0	22.7	15.8	8.4	5.30	25.3	15.50
	Nevers	12.0	10.5	7.3	9.1	18.3	24.1	25.2	21.7	15.9	5.7	4.50	25.4	14.45
9	Châteauroux	7.4	14.0	11.7	11.7	11.5	15.0	15.6	15.6	11.1	10.8	10.00	16.1	16.00
	Bourges	5.0	15.0	13.6	11.1	11.8	13.0	15.0	15.8	11.6	11.1	5.50	16.6	18.15
	Nevers	4.7	13.6	13.3	11.9	12.2	12.4	12.4	15.2	8.7	11.2	6.10	15.6	17.00
10	Châteauroux	5.6	9.4	6.1	8.3	12.2	11.5	14.4	14.4	10.0	6.1	3.00	15.6	16.00
	Bourges	5.9	9.0	5.8	7.8	13.0	12.0	15.0	14.5	10.6	5.3	3.50	15.2	16.00
	Nevers	6.9	5.8	4.3	5.8	13.1	15.0	10.9	14.2	11.2	2.1	4.45	15.9	11.30
11	Châteauroux	8.2	7.8	7.2	7.2	11.1	13.9	14.4	13.3	10.0	6.7	4.00	15.0	14.00
	Bourges	8.9	8.4	7.1	7.4	11.1	14.2	16.0	15.3	10.2	6.2	4.15	16.2	15.15
	Nevers	8.7	9.5	8.1	8.0	10.4	13.2	15.4	14.8	8.0	7.4	5.15	16.0	14.15
12	Châteauroux	12.0	7.2	5.0	6.1	12.8	17.2	17.8	17.2	12.8	4.4	4.00	17.8	14.00
	Bourges	12.6	8.0	7.4	5.3	13.3	16.8	18.6	17.8	14.6	3.2	5.15	19.0	16.45
	Nevers	12.0	5.1	2.4	3.6	13.3	16.9	18.3	18.6	10.7	1.4	4.25	19.2	15.45
13	Châteauroux	3.8	10.0	8.3	9.4	12.8	11.8	16.1	15.0	11.7	7.8	4.00	17.2	16.00
	Bourges	4.4	9.5	6.4	7.8	14.5	12.3	16.0	15.6	12.6	6.3	3.40	17.1	16.00
	Nevers	4.2	6.6	4.9	7.6	15.8	15.7	12.2	15.1	12.7	4.3	3.00	16.9	11.15
14	Châteauroux	5.2	10.6	10.0	9.4	11.7	13.3	14.4	13.9	10.2	9.4	10.00	15.0	16.00
	Bourges	4.2	10.0	8.8	9.0	11.3	13.2	14.1	13.7	10.2	8.3	4.30	14.4	15.45
	Nevers	3.6	11.4	9.7	9.0	10.7	12.5	13.8	13.2	10.2	8.8	5.05	14.0	15.15
15	Châteauroux	6.4	9.5	10.7	10.1	10.0	12.8	13.9	11.7	8.3	9.4	10.00	13.9	15.00
	Bourges	2.4	9.3	10.0	10.2	10.3	12.6	10.4	10.6	10.4	9.0	0.30	14.0	13.00
	Nevers	1.5	9.6	8.9	10.6	8.9	11.7	11.4	9.2	8.5	8.3	1.50	12.2	12.50
16	Châteauroux	12.6	6.1	5.0	6.1	11.7	15.6	16.7	15.0	8.9	4.4	4.00	16.7	15.00
	Bourges	12.2	7.0	4.9	6.4	10.3	14.5	15.0	15.3	12.4	4.1	4.15	16.0	15.30
	Nevers	1.4	7.0	5.8	6.4	7.6	11.2	14.6	13.8	8.7	4.9	3.40	14.9	14.40
17	Châteauroux	7.6	7.2	5.6	6.7	13.3	16.3	18.5	16.8	13.3	5.6	3.00	18.5	15.00
	Bourges	6.6	7.8	5.3	6.0	14.2	17.3	17.2	17.0	15.0	4.3	4.00	17.9	15.20
	Nevers	11.4	3.9	1.8	3.1	13.6	15.6	17.3	17.1	13.5	0.8	3.45	18.1	15.15
18	Châteauroux	6.7	11.1								10.0	5.00	17.8	13.00
	Bourges	6.3	12.6								10.8	1.10	18.7	16.10
	Nevers	6.0	9.0								6.4	1.35	19.0	12.15

A U 14

GIQUES REGIONALES

Température

Humidité relative

au 17 mai 1963

TENSIONS DE VAPEUR (en 1/10mb)									HUMIDITES RELATIVES											
heures d'observation									heures d'observation											
0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	0	3	6	9	12	15	18	21	moyenne	min.	heure	max.
73	69	68	83	63	84	89	102	78.9	80	90	85	76	49	66	72	93	76.4	49	12.00	93
67	67	73	73	66	74	89	101	76.3	88	91	93	68	49	55	71	88	75.4	42	12.10	94
64	58	63	71	63	70	76	92	69.6	84	88	94	65	49	52	60	81	71.6	45	11.45	95
102	78	77	89	83	70	65	83	80.9	89	83	89	76	63	45	43	70	69.8	43	18.00	93
93	77	81	85	74	71	77	70	78.5	93	89	98	81	54	44	49	54	70.3	42	18.30	98
97	86	84	83	71	60	65	72	77.2	93	95	92	81	52	37	41	65	69.5	34	16.40	95
68	73	73	84	70	75	84	87	76.8	70	90	90	56	39	38	46	66	61.9	37	14.00	90
71	69	73	80	76	78	83	88	77.3	67	87	84	56	41	41	45	66	60.0	40	16.10	90
63	58	60	76	74	74	76	93	71.7	79	88	85	54	41	38	40	76	62.6	34	13.45	90
87	90	97	104	106	93	77	87	92.6	80	88	89	79	74	55	45	68	72.3	45	18.00	93
90	92	100	98	98	85	95	92	93.8	78	81	87	70	56	47	48	61	66.0	46	17.30	87
83	79	95	102	101	93	91	90	91.6	88	89	89	73	60	50	50	76	71.8	47	14.30	91
88	77	77	102	111	97	85	116	94.1	83	76	76	64	47	34	33	71	60.5	30	17.00	83
83	78	82	111	118	83	107	109	96.5	69	72	71	63	48	29	38	51	55.1	27	16.30	80
83	73	78	104	119	116	112	122	100.8	80	84	77	58	52	44	40	78	64.1	34	17.00	89
104	90	101	122	98	118	131	121	110.6	79	82	79	60	35	40	51	62	61.0	35	12.00	85
107	100	100	112	100	111	129	128	110.9	67	84	87	50	34	35	47	71	59.4	29	13.40	87
108	91	102	130	124	124	116	128	115.3	85	89	88	61	39	39	45	71	64.6	35	14.40	95
134	108	118	118	97	76	83	100	104.3	80	78	86	86	57	43	47	75	69.0	42	16.00	93
137	145	118	125	106	105	77	88	112.6	81	93	90	90	70	61	43	65	74.1	40	17.00	95
138	129	124	124	127	102	74	91	113.6	89	91	89	87	88	71	43	81	79.8	41	18.10	92
90	78	93	97	124	92	85	81	92.5	77	83	85	69	91	56	52	66	72.4	47	17.00	91
87	81	94	90	129	116	87	88	96.5	76	88	89	60	91	68	53	69	74.3	51	16.00	92
84	77	83	93	68	111	95	88	87.4	91	93	89	62	40	85	58	66	73.0	38	11.15	93
82	85	91	90	77	71	88	92	84.5	77	84	90	69	49	43	57	74	67.9	43	14.00	90
86	88	94	95	80	82	81	81	85.9	78	87	91	72	49	45	47	65	66.8	41	17.15	92
84	92	92	89	85	75	75	82	84.2	71	85	86	70	56	42	45	77	66.0	38	14.30	92
80	74	84	93	84	91	101	112	89.9	79	84	89	63	43	45	51	76	66.3	43	12.00	89
82	88	80	93	82	92	87	103	88.4	76	85	89	61	43	42	43	62	62.6	40	14.00	89
81	72	76	90	79	80	95	101	84.2	92	98	97	59	41	38	44	78	68.3	34	13.00	98
100	93	101	107	131	92	85	90	99.9	81	85	86	72	95	50	50	66	73.0	43	16.00	95
100	90	94	115	119	105	88	93	100.5	84	94	89	70	83	58	50	63	73.9	43	16.40	95
85	78	93	92	80	78	84	104	92.0	79	81	83	67	52	48	53	83	68.3	47	16.00	93
101	100	97	92	80	78	84	104	92.0	79	81	83	67	52	48	53	83	68.3	47	16.00	93
107	101	102	98	81	83	85	112	96.1	87	89	89	73	54	51	55	90	73.5	47	16.00	93
104	108	100	92	83	77	83	92	92.4	77	90	87	71	57	49	55	74	70.0	46	13.50	92
111	111	111	96	84	77	72	77	92.4	93	86	90	78	56	49	52	70	71.8	49	15.00	95
109	115	108	89	71	87	82	78	92.4	93	94	87	71	49	69	64	62	73.6	42	13.00	94
109	106	113	90	89	93	95	94	98.6	92	93	89	78	65	69	82	85	81.6	55	12.45	94
72	74	80	82	75	66	64	79	74.0	77	84	85	60	45	35	38	70	61.5	33	16.00	85
80	78	81	80	73	77	81	78	78.5	80	90	85	64	44	45	47	55	63.8	43	18.40	92
85	82	83	88	93	93	92	97	89.1	85	89	87	85	70	56	58	87	77.1	52	15.45	
77	74	84	113	96	105	116	136	100.1	76	81	85	74	52	49	61	89	70.9	47	16.00	94
79	80	81	93	90	95	101	116	91.9	75	85	86	57	46	49	52	68	65.3	42	12.20	92
77	66	75	97	85	92	87	99	84.8	95	96	98	62	48	46	44	64	69.1	40	15.10	98
124								121.0	94								77.5	56	13.00	97
118								116.0	81								70.6	48	15.15	88
102								112.6	89								75.0	49	10.40	95




Fig. 48 - Les *maxima* de Bourges et Châteauroux par rapport à ceux de Nevers.
(moyennes des années 1921-1950)




Fig. 49 - Evolution comparée de la température à Châteauroux, Bourges et Nevers: supériorité thermique moyenne (de 9h à 18h et de 6h à 18h) et avantage instantané de Bourges et Châteauroux au cours de la période du 23 au 28 août 1964.

TABLEAU 15

MAXIMA MOYENS EN SITUATION ANTICYCLONIQUE
AU COURS DE L'HIVER 1963-1964.

Dates	Châteauroux	Bourges	Nevers	Prémery	les Brays
27/29-10-63	9.1	9.2	9.7	11.7	11.5
22/23-11-63	12.3	13.0	12.1	12.5	12.5
5/10-12-63	4.4	4.4	4.6	4.8	6.3
13/16-12-63	-2.2	-1.1	-1.4	-2.5	-2.4
21/24-12-63	-1.5	0.0	-0.2	-1.3	-1.6
27/30-12-63	8.1	8.1	8.0	8.0	9.3
2/ 4- 1-64	1.1	1.4	1.6	0.3	2.0
16/20- 1-64	5.1	6.2	5.9	6.4	6.3
21/24- 1-64	-1.5	-0.5	1.0	0.5	1.0
25/27- 1-64	0.8	1.7	1.2	-0.2	1.1
2/ 3- 2-64	10.0	10.0	9.7	9.5	10.0
4 - 2-64	8.9	9.9	10.2	10.0	10.2
5/ 8- 2-64	4.7	5.2	4.3	3.2	2.6
9/11- 2-64	6.1	6.6	6.7	5.7	5.2
20/21- 2-64	4.7	5.1	5.6	4.0	4.2
8/10- 3-64	5.2	6.2	6.4	4.3	4.0
7/12- 4-64	15.6	16.3	16.3	16.0	13.7
15/16- 4-64	21.9	21.1	20.5	20.0	19.0

TABLEAU 16

MAXIMA MOYENS EN SITUATION ANTICYCLONIQUE
DURANT LA PERIODE DE VEGETATION DE 1964.

Dates	Châteauroux	Bourges	Nevers	Prémery	les Brays
24/27- 4-64	17.2	18.3	18.3	17.5	15.8
30-4/2-5-64	16.4	17.8	17.3	16.7	16.4
9/12- 5-64	22.1	23.4	22.6	23.0	21.0
15/17- 5-64	22.2	23.5	22.7	21.7	21.0
8/11- 6-64	23.2	25.8	25.2	24.5	22.7
15/17- 6-64	21.2	22.8	22.1	22.0	20.0
21/25- 6-64	21.3	21.7	21.5	21.0	18.9
1/ 8- 7-64	25.5	25.3	24.7	24.1	22.9
13/17- 7-64	32.0	33.4	33.3	33.3	32.3
22/26- 7-64	28.9	29.4	28.7	28.6	27.5
4/ 6- 8-64	30.9	31.4	31.0	30.7	29.6
23/27- 8-64	30.1	30.6	28.8	28.2	28.4
30/31-8/1/2-9-64	25.3	25.3	25.1	23.5	23.8
7/14- 9-64	26.5	27.0	27.1	26.5	26.5
21/25- 9-64	22.8	23.1	22.4	21.0	21.3
28/29- 9-64	22.2	20.9	21.6	21.0	22.0
19/22-10-64	9.9	10.8	10.3	9.5	10.6

TABLEAU 17

SUPERIORITE THERMIQUE DE CHATEAUROUX ET BOURGES
SUR NEVERS

Séquence de temps du 23 au 28 août 1964

dates	CHATEAUROUX		BOURGES	
	intervalle 6 à 18h	intervalle 9 à 18h	intervalle 6 à 18h	intervalle 9 à 18h
23	1.8	1.3	1.9	1.5
24	1.6	0.6	1.2	0.6
25	2.8	2.8	1.8	1.5
26	2.7	3.6	2.9	3.4
27	1.9	1.4	2.4	1.9
28	0.5	-1.4	0.7	-0.4
moyenne	1.7	1.4	1.8	1.4

TABLEAU 18

EVAPOTRANSPIRATION REELLE CALCULEE (en mm)

Période du 23 au 27 août 1964

	CHATEAUROUX	BOURGES	NEVERS
Prairie sur sol à faible réserve hydrique	4.6	5.3	10.7
Forêt sur sol à faible réserve hydrique	5.2	5.8	11.0
Forêt sur sol à réserve hydrique importante	5.0	6.3	11.5

TABEAU 19

INTERCEPTION DES PRECIPITATIONS PAR LE COUVERT FORESTIER

Eléments de comparaison

Référence	Localisation	Peuplement	Interception brute (%)	Ecoulement le long des troncs (%)
Ovington, 1954	Kent	<i>Quercus petraea</i>	35.8	0.3
Schnock- 1964 Galoux , 1965	Ardenne belge	<i>Quercus petraea</i> et <i>Carpinus</i>	30.1 23.0	
Aussenac, 1968	Lorraine	<i>Fagus + Carpinus</i>	24.0	7.1
Eidmann, 1959	Sauerland	<i>Fagus</i>	40.6	16.6
Slavik, 1965	Bohême	<i>Fagetum Asperuletosum</i> <i>Quercetum medio-europaeum</i>	40.0 24.0	

TABLEAU 20

PRECIPITATIONS HORS FORET ET PRECIPITATIONS SOUS FORET

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY - NIEVRE)

Années 1966 et 1967

Données mensuelles

	1966				1967			
	Précipitations		Interception		Précipitations		Interception	
	hors forêt	sous forêt	brute	%	hors forêt	sous forêt	brute	%
Janvier	108.7	84.1	24.6	22.6	55.9	41.7	14.2	25.4
Février	130.9	96.7	34.2	26.1	89.3	60.6	28.7	32.1
Mars	41.4	27.5	13.9	33.6	54.9	39.3	15.6	28.4
Avril	76.2	55.1	21.1	27.7	24.4	15.7	8.7	35.7
Mai	48.1	33.4	14.7	30.6	89.4	59.2	30.2	33.8
Juin	85.9	67.1	18.8	21.9	24.1	15.6	8.5	35.3
Juillet	87.4	67.1	20.3	23.2	12.8	7.5	5.3	41.4
Août	154.4	115.3	39.1	25.3	79.6	57.1	22.5	28.3
Septembre	34.0	24.4	9.6	28.2	109.6	74.6	35.0	31.9
Octobre	95.3	65.3	30.0	31.5	116.9	74.5	42.4	36.3
Novembre	81.7	41.6	40.1	49.1	96.5	61.4	35.1	36.4
Décembre	187.6	129.0	58.6	31.2	117.1	79.7	32.0	28.6
Année	1 131.6	806.6	325.0	28.7	865.1	586.9	278.2	32.2

TABEAU 21

INTERCEPTION DES PRECIPITATIONS PAR LE COUVERT FORESTIER

COMPARAISON AMANCE-PRÉMERY

Juillet 1966 à Juin 1967

	P L U V I O M É T R I E				I N T E R C E P T I O N (%)			
	Référence		Sous-forêt		Déficit brut		Interception nette Amance	Ecoulement le long des trunks Amance
	Amance	Prémery	Amance	Prémery	Amance	Prémery		
Juillet	24.2	87.4	17.7	67.1	26.8	23.2	19.8	7.0
Août	94.6	154.4	72.6	115.3	23.2	25.3	17.6	5.6
Septembre	42.7	34.0	30.4	24.4	28.2	28.2	20.1	8.7
Octobre	77.3	95.3	60.0	65.3	22.4	31.5	16.2	6.2
Novembre	58.0	81.7	46.1	41.6	20.5	49.1	11.3	9.2
Décembre	158.0	187.6	118.1	129.0	25.2	31.2	18.3	6.9
Janvier	33.7	55.9	29.1	41.7	13.5	25.4	7.0	6.5
Février	41.6	89.3	31.9	60.6	23.3	32.1	15.2	8.1
Mars	45.8	54.9	35.1	39.3	23.4	28.4	14.4	9.0
Avril	31.1	24.4	23.8	15.7	23.6	35.7	15.4	8.2
Mai	75.8	89.4	53.2	59.2	29.7	33.8	23.1	6.6
Juin	41.4	24.1	32.4	15.6	21.7	35.3	16.8	4.9
Total	724.2	978.4	550.4	674.8	24.0	31.0	16.9	7.1

TABLEAU 22

PRECIPITATIONS HORS FORET ET PRECIPITATIONS SOUS FORET

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY - NIEVRE)

Etablissement des corrélations entre précipitations et interception

ANNEE 1966

Année	Dates		Précipitations hors forêt X	Interception		X ²	XY	Y ²
	Mois	Jours		brute	% Y			
65-66 66	12- 1	29- 3	43.5	13.9	32.0	1 892.3	1 392.0	1 024.0
	1	10	4.3	0.8	18.6	18.5	80.0	346.0
	1	20-23	68.7	15.2	22.1	4 719.7	1 518.3	488.4
	1	25-27	11.4	1.6	14.0	130.0	159.6	196.0
	1	30	8.5	1.5	17.6	72.3	149.6	309.8
	2	2	1.2	0.3	25.0	1.4	30.0	625.0
	2	6-12	80.7	23.7	29.4	6 512.5	2 372.6	864.4
	2	16-17	9.5	1.8	18.9	90.3	179.6	357.2
	2	19-21	11.9	3.2	26.9	141.6	320.1	723.6
	2	23	1.9	1.3	68.4	3.6	130.0	4 678.6
	2	25-28	25.7	3.9	15.2	660.5	390.6	231.0
	3	3- 4	4.9	0.9	18.4	24.0	90.2	338.6
	3	11-12	11.5	3.8	33.0	132.2	379.5	1 089.0
	3	18	0.4	0.2	50.0	0.2	20.0	2 500.0
	3	23-24	5.8	1.8	31.0	33.6	179.8	961.0
	3	26-27	18.8	6.9	36.7	353.4	690.0	1 346.9
	4	1	1.9	1.9	100.0	3.6	190.0	10 000.0
	4	5- 7	5.1	1.6	31.4	26.0	160.1	986.0
	4	9-11	12.2	3.3	27.0	148.8	329.4	729.0

4	13-18	33.4	24.7	8.7	26.0	1	115.6	868.4	676.0
4	20	6.6	3.2	3.4	51.5		43.6	339.9	2 652.3
4	24-25	16.4	14.8	1.6	9.8		269.0	160.7	96.0
4	27	0.6	0.0	0.6	100.0		0.4	60.0	10 000.0
5	3-10	34.9	26.2	8.7	24.9	1	218.0	869.0	620.0
5	17-22	12.2	6.6	5.6	45.9		148.8	560.0	2 106.8
5	24	1.0	0.6	0.4	40.0		1.0	40.0	1 600.0
6	4	4.8	4.5	0.3	6.3		23.0	30.2	39.7
6	10-12	20.5	16.7	3.8	18.5		420.3	379.3	342.3
6	15	13.4	7.0	6.4	47.8		179.6	640.5	2 284.8
6	17-22	43.3	36.8	6.5	15.0	1	874.9	649.5	225.0
6	24	2.7	2.0	0.7	25.9		7.3	69.9	670.8
6	27	1.2	0.1	1.1	91.7		1.4	110.0	8 408.9
7	3- 6	42.1	30.2	11.9	28.3	1	772.4	1 191.4	800.9
7	11	1.3	1.0	0.3	23.1		1.7	30.0	533.6
7	16-22	36.0	30.7	5.3	14.7	1	296.0	529.2	216.1
7	24	6.8	4.6	2.2	32.4		46.2	220.3	1 049.8
7	29	1.2	0.6	0.6	50.0		1.4	60.0	2 500.0
8	1- 5	76.6	54.3	22.3	29.1	5	867.6	2 229.1	846.8
8	7	5.2	5.0	0.2	3.8		27.0	19.8	14.4
8	15	0.2	0.0	0.2	100.0		0.0	20.0	10 000.0
8	18-19	12.5	11.6	0.9	7.2		156.3	90.0	51.8
8	21-22	40.7	32.7	8.0	19.7	1	656.5	801.8	388.1
8	29-31	19.2	12.6	6.6	34.4		368.6	660.5	1 183.4
9	2	0.1	0.0	0.1	100.0		0.0	10.0	10 000.0
9	4	6.6	3.5	3.1	47.0		43.6	310.2	2 209.0
9	12	1.3	0.8	0.5	38.5		1.7	50.1	1 482.3
9	15	17.8	13.9	3.9	21.9		316.8	389.8	479.6
9-10	28- 2	13.3	10.2	3.1	23.3		176.9	309.9	542.9
10	4	0.3	0.0	0.3	100.0		0.1	30.0	10.000.0
10	9	1.7	0.9	0.8	47.1		2.9	80.1	2 218.4
10	12	2.6	1.3	1.3	50.0		6.8	130.0	2 500.0
10	14-21	49.6	34.2	15.4	31.0	2	460.2	1 537.6	961.0
10	23-28	36.0	24.9	11.1	30.8	1	296.0	1 108.8	948.8
11	2	1.1	0.2	0.9	81.8		1.2	90.0	6 691.2
11	4- 5	9.0	5.4	3.6	40.0		81.0	36.0	1 600.0
11	8- 9	10.2	4.0	6.2	60.8		104.0	620.2	3 696.6
11	14-20	27.7	10.3	17.4	62.8	1	767.3	1 739.6	3 943.8
11	23	1.5	0.5	1.0	66.7		2.3	100.0	4 448.9
11-12	26- 4	66.4	44.9	21.5	32.4	4	409.0	2 151.4	1 049.8
12	7-15	72.7	52.0	20.7	28.5	5	285.3	2 072.0	812.3
12	18-24	33.5	19.2	14.3	42.7	1	122.3	1 430.5	1 823.3

TABLEAU 23

PRECIPITATIONS HORS FORET ET PRECIPITATIONS SOUS FORET

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY - NIEVRE)

Etablissement des corrélations entre précipitations et interception

ANNEE 1967

Année	Dates		Précipitations hors forêt X	Interception		X ²	XY	y ²
	Mois	Jours		brute	% y			
66-67 67	12-1	27-2	59.8	16.0	26.8	3 576.0	1 606.2	718.2
	1	4-5	10.0	3.5	35.0	100.0	350.0	1 225.0
	1	18	0.5	0.2	40.0	0.3	20.0	1 600.0
	1	20-21	13.9	2.8	20.1	193.2	279.4	404.0
	1	23-26	18.8	4.7	25.0	353.4	470.0	625.0
	2	2-3	1.0	0.4	40.0	1.0	40.0	1 600.0
	2	15-20	59.2	18.8	31.8	3 504.6	1 882.6	1 011.2
	2	24-26	19.4	5.4	27.8	376.4	539.3	772.8
	2-3	28-3	21.7	4.9	22.6	470.9	490.4	510.8
	3	8-12	15.8	4.4	27.8	249.6	439.2	772.8
	3	15	0.7	0.3	42.9	0.5	30.0	1 840.4
	3	17-19	4.3	2.0	46.5	18.5	200.0	2 162.3
	3	28-28	20.0	7.5	37.5	400.0	750.0	1 406.3
	3	30-31	2.1	0.6	28.6	4.4	60.1	818.0
	4	3	0.5	0.3	60.0	0.3	30.0	3 600.0
	4	6-8	5.8	1.8	31.0	33.6	179.8	961.0

4	10	1.0	0.4	0.6	60.0	1.0	60.0	3	600.0
4	20-24	15.8	10.2	5.6	35.4	249.6	559.3	1	253.2
4-5	30-2	5.6	3.8	1.8	31.4	31.4	179.8	1	030.4
5	5-7	12.1	10.2	1.9	15.7	146.4	190.0		246.5
5	12	3.9	2.8	1.1	28.2	15.2	110.0		795.2
5	14-16	9.8	6.0	3.8	38.8	96.0	380.2	1	505.4
5	19	0.5	0.0	0.5	100.0	0.3	50.0	10	000.0
5	21-25	46.3	28.8	17.5	37.8	2 143.7	1 750.1	1	428.8
5	28	7.9	5.1	2.8	35.4	62.4	279.7	1	253.2
5	30	4.6	3.4	1.2	26.1	21.2	120.1		681.2
6	15-16	2.4	1.3	1.1	45.8	5.8	109.9	2	097.6
6	20	0.2	0.0	0.2	100.0	0.0	20.0	10	000.0
6	26-27	21.5	14.3	7.2	33.5	462.3	720.3	1	122.3
7	2-3	2.5	0.8	1.7	68.0	6.3	170.0	4	624.0
7	6	7.3	5.0	2.3	31.5	53.3	230.0		992.3
7	8	3.0	1.7	1.3	43.3	9.0	129.9	1	874.9
8	1-2	15.1	11.9	3.2	21.2	228.0	320.1		449.4
8	8-16	64.4	45.2	19.2	29.8	4 147.4	1 919.1		888.0
8	19	0.1	0.0	0.1	100.0	0.0	10.0	10	000.0
9	3	11.3	7.7	3.6	31.9	127.7	360.5	1	017.6
9	5-8	11.1	5.2	5.9	53.2	123.2	590.5	2	830.2
9	12-16	41.6	24.7	16.9	40.6	1 730.6	1 689.0	1	648.4
9	20-22	39.2	31.7	7.5	19.1	1 536.6	748.7		364.8
9	29-30	6.3	5.3	1.0	15.9	39.7	100.2		252.8
10	2-4	12.4	6.6	5.8	46.8	153.8	580.3	2	190.2
10	6	15.1	10.9	4.2	27.8	228.0	419.8		772.8
10	13-17	40.4	24.9	15.5	38.4	1 632.2	1 551.4	1	474.6
10	21-22	16.2	12.7	3.5	21.6	262.4	349.9		466.6
10-11	26-2	48.9	27.9	21.0	42.9	2 391.2	2 097.8	1	840.4
11	4-6	28.4	19.4	9.0	31.7	806.6	900.3	1	004.9
11	11-17	29.6	20.9	8.7	29.4	876.2	870.2		864.4
11	25-26	12.9	8.3	4.6	35.7	166.4	460.5	1	272.5
11	28-29	9.5	4.3	5.2	54.7	90.3	519.7	2	992.1
12	5-6	12.5	8.1	4.4	35.2	156.3	440.0	1	239.0
12	14	2.8	2.7	0.1	3.6	7.8	10.1		13.0
12	16	4.5	3.2	1.3	28.9	20.3	130.		835.2
12	18-19	14.9	12.4	2.5	16.8	222.0	250.3		282.2
12	21-25	60.6	41.0	19.6	32.3	3 672.4	1 957.4	1	043.3

PRECIPITATIONS HORS FORET ET PRECIPITATIONS SOUS FORET
MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY - NIEVRE)

RECAPITULATION DES DONNEES

	Séquences pluvieuses		Précipitations hors sous forêt forêt	Interception brute	$\sum Y$	$\sum X^2$	$\sum XY$	$\sum Y^2$
	Classe	Nombre						
Phénophase feuillée	1966	3	198.9	58.4	88.6	13 613.1	5 838.7	2 620.1
	1967	1	64.4	19.2	29.9	4 147.4	1 919.1	888.0
	1966 et 1967	4	263.3	77.6	118.4	17 760.5	7 757.8	3 508.1
Phénophase défeuillée	1966	3	215.8	60.4	83.9	15 641.2	6 042.3	2 402.6
	1967	3	179.6	54.4	90.9	10 753.0	5 442.6	2 772.7
	1966 et 1967	6	395.4	114.8	174.8	26 394.2	11 484.9	5 175.3
Année entière	1966	6	414.7	118.8	172.5	29 254.3	11 881.0	5 022.7
	1967	4	244.0	73.6	120.7	14 900.4	7 361.7	3 660.7
	1966 et 1967	10	658.7	192.4	293.2	44 154.7	19 242.7	8 683.4
Phénophase feuillée	1966	6	233.0	51.5	133.4	9 113.8	5 149.7	3 198.7
	1967	7	274.4	96.1	239.9	11 117.1	9 607.5	8 626.2
	1966 et 1967	13	507.4	147.6	373.3	20 230.9	14 757.2	11 824.9
Phénophase défeuillée	1966	3	110.4	36.9	100.7	4 130.2	3 690.9	3 523.3
	1967	0						
	1966 et 1967	3	110.4	26.9	100.7	4 130.2	3 690.9	3 523.3
Année entière	1966	9	343.4	88.4	234.1	13 244.0	8 840.6	6 722.0
	1967	7	274.4	96.1	239.9	11 117.1	9 607.5	8 626.2
	1966 et 1967	16	617.8	184.5	474.0	24 361.1	18 448.1	15 348.2
Phénophase feuillée	1966	5	101.6	33.3	147.4	2 142.0	3 329.9	6 045.1
	1967	5	83.7	22.5	131.9	1 430.3	2 249.3	3 583.9
	1966 et 1967	10	185.3	55.8	279.3	3 572.3	5 579.2	9 629.0
Phénophase défeuillée	1966	2	44.5	10.8	51.9	1 013.9	1 080.0	1 577.9
	1967	6	110.6	30.6	165.1	2 072.3	3 059.3	4 850.3
	1966 et 1967	8	155.1	41.4	217.0	3 086.2	4 139.3	6 428.2
Année entière	1966	7	146.1	44.1	199.3	3 155.9	4 409.9	7 623.0
	1967	11	194.3	53.1	297.0	3 502.6	5 308.6	8 434.2
	1966 et 1967	18	340.4	97.2	496.3	6 658.5	9 718.5	16 057.2

Phénophase feuillée	1966	4	51.4	35.4	16.0	124.2	661.6	1 600.4	4 986.3
	1967	3	35.8	24.5	11.3	94.4	427.9	1 130.8	3 454.3
	1966 et 1967	7	87.2	59.9	27.3	218.6	1 089.5	2 731.2	8 440.6
Phénophase défeuillée	1966	4	47.0	35.1	11.9	100.9	552.7	1 188.6	2 737.6
	1967	3	39.3	27.5	11.8	91.0	515.9	1 179.9	2 917.5
	1966 et 1967	7	86.3	62.6	23.7	191.9	1 068.6	2 368.5	5 655.1
Année entière	1966	8	98.4	70.5	27.9	225.1	1 214.3	2 789.0	7 723.9
	1967	6	75.1	52.0	23.1	185.4	943.8	2 310.7	6 371.8
	1966 et 1967	14	173.5	122.5	51.0	410.5	2 158.1	5 099.7	14 095.7
Phénophase feuillée	1966	6	42.6	27.0	15.6	190.3	324.8	1 236.7	8 609.5
	1967	8	56.5	36.6	19.9	261.2	442.4	1 990.5	9 340.7
	1966 et 1967	14	99.1	63.6	35.5	451.5	767.2	3 227.2	17 950.2
Phénophase défeuillée	1966	7	44.7	32.9	11.8	187.4	308.3	1 179.2	5 950.9
	1967	5	34.1	20.3	13.8	196.1	262.7	1 379.6	8 175.6
	1966 et 1967	12	78.8	53.2	25.6	383.5	571.0	2 558.8	14 126.5
Année entière	1966	13	87.3	59.9	27.4	377.7	633.1	2 415.9	14 560.4
	1967	13	90.6	56.9	33.7	457.3	705.1	3 370.1	17 516.3
	1966 et 1967	26	177.9	116.8	61.1	835.0	1 338.2	5 786.0	32 076.7
Phénophase feuillée	1966	14	16.8	8.0	8.8	914.8	28.2	880.1	71 054.1
	1967	6	8.7	3.8	4.9	457.1	21.4	489.8	38 596.5
	1966 et 1967	20	25.5	11.8	13.7	1 371.9	49.6	1 369.9	109 650.6
Phénophase défeuillée	1966	4	5.4	1.7	3.7	243.4	8.8	370.0	17 803.6
	1967	7	8.6	6.1	2.5	275.1	15.3	250.2	13 071.4
	1966 et 1967	11	14.0	7.8	6.2	518.5	24.1	620.2	30 875.0
Année entière	1966	18	22.2	9.7	12.5	1 158.2	37.0	1 250.1	88 857.7
	1967	13	17.3	9.9	7.4	732.2	36.7	740.0	51 857.7
	1966 et 1967	31	39.5	19.6	19.9	1 890.4	73.7	1 990.1	140 525.6
Phénophase feuillée	1966	38	644.3	460.7	183.6	1 598.7	25 883.5	18 035.5	96 513.8
	1967	30	523.5	349.6	173.9	1 214.3	17 586.5	17 387.0	64 489.6
	1966 et 1967	68	1 167.8	810.3	357.5	2 813.0	43 470.0	35 422.5	161 003.4
Phénophase défeuillée	1966	23	467.8	332.3	135.5	768.2	21 655.1	13 550.3	33 995.9
	1967	24	372.2	259.1	113.1	818.2	13 619.2	11 311.6	31 787.5
	1966 et 1967	47	840.0	591.4	248.6	1 586.4	35 274.3	24 861.9	65 783.4
Année entière	1966	61	1 112.1	793.0	319.1	2 366.9	47 538.6	31 585.8	130 509.7
	1967	54	895.7	608.7	287.0	2 032.5	31 205.7	28 698.6	96 277.1
	1966 et 1967	115	2 007.8	1 401.7	606.1	4 399.4	78 744.3	60 284.4	226 786.8

TABLEAU 25

CARACTERES STATISTIQUES DE L'INTERCEPTION DES PRECIPITATIONS PAR LE COUVERT FORESTIER

(Interception apparente)

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY-NIEVRE)

Années 1966 et 1967

	Séquences pluvieuses	Nombre	Etendue de la Distribution	Moyenne	Médiane	Quartiles		Intervalle semi- interquartile	Variance			Coefficient de variation	Intervalles de confiance		
						1er	3ème		Ecart-type	Ecart-type corrigé	à 99%		à 95%	à 90%	
Phénophase feuillée Phénophase défeuillée Année entière	plus de 49,4 mm	4	2.5	29.6	29.5				0.9	0.9	3.1				
		6	10.3	29.1	30.6				13.8	3.7	12.7				
		10	10.3	29.3	29.6	28.5	31.8	1.9	8.7	2.9	3.1	10.0	26.1/32.5	27.1/31.5	27.5/31.1
Phénophase feuillée Phénophase défeuillée Année entière	28,0 à 49,4 mm	13	28.2	28.7	29.4				85.0	9.2	32.1				
		3	10.7	33.6	32.0				47.8	6.9	20.6				
		16	28.2	29.6	30.1	22.3	38.1	7.9	81.6	9.0	9.3	30.5	22.7/36.5	24.6/34.6	25.5/33.7

Phénophase feuillée	10	53.0	27.9	28.7						182.8	13.5	48.5			
Phénophase défeuillée	8	22.3	27.1	24.9						67.8	8.2	30.4			
Année entière	18	53.0	27.6	26.4	21.2	34.4	6.6			131.8	11.5	11.8	19.5/35.6	21.7/33.5	22.7/30.4
Phénophase feuillée	7	40.6	31.3	31.9						287.8	17.0	54.3			
Phénophase défeuillée	7	21.7	27.4	27.0						56.3	7.5	27.4			
Année entière	14	40.6	29.3	29.5	17.9	40.8	11.5			147.1	12.1	12.6	18.9/39.8	22.1/36.6	23.4/35.3
Année entière	32		28.3							139.3	11.8	12.0	22.5/34.2	24.0/32.6	24.7/31.9
Phénophase feuillée	14	57.0	32.3	32.3						242.1	15.6	48.2			
Phénophase défeuillée	12	37.1	32.0	31.0						155.9	12.5	39.1			
Année entière	26	57.0	32.1	31.5	18.9	40.0	10.6			202.3	14.2	14.5	24.2/40.1	26.3/38.0	27.3/37.0
Année entière	58		30.0							178.0	13.3	13.5	25.3/34.7	26.5/33.6	27.1/32.9
Phénophase feuillée	20	76.9	76.2	67.4						777.3	27.9	36.6			
Phénophase défeuillée	11	96.4	39.9	42.9						585.0	24.2	60.6			
Année entière	31	4	61.0	50.0	40.0	100.0	30.0			814.4	28.5	29.0	47.2/74.8	50.6/71.4	52.3/69.6
Phénophase feuillée	68		41.4							656.4	25.6	61.9			
Phénophase défeuillée	47		33.8							260.4	16.1	47.7			
Année entière	115		38.3							508.6	22.6	59.9			




Fig. 50 - Interception comparée des précipitations par le couvert forestier à Premery et Amance.
(Moyennes mensuelles)

Classement des séquences pluvieuses et taux d'interception par le couvert forestier

--






Fig. 52 (cf. texte, p. 139-141).

TABEAU 26

TENSION DE VAPEUR ET HUMIDITE RELATIVE DANS LA FORET

N°	Heure	Date	Lieu d'observation	Stations de référence											
				T	T'	e	U	BOURGES				NEVERS			
1	15	4-10-65	St-Baudel, -sous bois	21.9	18.8	17.5	67	23.0	16.6	13.8	49	22.2	16.0	13.3	50
2	15	4-10-65	St-Baudel, -champ	22.7	17.5	15.8	58	23.0	16.6	13.8	49	22.2	16.0	13.3	50
3	18	6- 6-66	Prémery, -mardelle sous bois	18.4	16.3	16.8	80	22.2	16.6	14.5	54	22.5	16.5	14.0	52
4	18	6- 6-66	Prémery, -mardelle en lisière	15.7	14.5	15.5	70	22.2	16.6	14.5	54	22.5	16.5	14.0	52
5	15	7- 6-66	Le Bréau, -sous forêt, à l'ombre	23.7	19.6	19.5	67	24.5	18.3	15.0	44	25.0	17.4	13.8	44
6	15	7- 6-66	Le Bréau, -dans tache de soleil	25.0	19.4	18.0	57	24.5	18.3	15.0	44	25.0	17.4	13.8	44
7	16-30	29- 7-66	Jussy-Argenvières	18.0	14.8	14.2	69	(19.2)	(13.8)	(11.5)	(49)	(18.8)	(13.8)	(11.8)	(54)
8	16	9- 8-66	Villepuant, -forêt, N° 571	18.5	16.7	17.6	82	(21.5)	(15.4)	(12.7)	(43)	(21.6)	(15.8)	(13.3)	(51)
9	16	9- 8-66	Villepuant, -pelouse	21.5	16.0	13.8	53	(21.5)	(15.4)	(12.7)	(43)	(21.6)	(15.8)	(13.3)	(51)
10	18	9- 8-66	Les Ferrands, -forêt, N° 576	18.1	15.2	15.0	72	21.4	15.4	12.8	50	21.2	15.9	13.9	55
11	15	13- 8-66	La Chapelle Saint-André	25.2	23.2	26.8	83	28.6	22.5	22.4	58	30.6	22.1	19.8	46
12	15	16- 8-66	Fontenille	17.9	11.6	8.6	42	19.0	12.1	8.6	39	18.9	12.0	8.5	35
13	15	16- 8-66	Moussard	17.4	12.4	10.4	52	19.0	12.1	8.6	39	18.9	12.0	8.5	35
14	16	16- 8-66	Les Brault	18.0	13.4	10.2	49	(18.6)	(12.0)	(8.5)	(40)	(18.3)	(11.7)	(8.6)	(40)
15	17	16- 8-66	Bohème	17.0	13.2	11.2	58	(18.4)	(11.8)	(8.5)	(40)	(17.7)	(11.4)	(8.6)	(41)
16	18	16- 8-66	Bois Rabot	16.1	11.8	10.3	57	18.1	11.6	8.4	40	17.1	11.2	8.7	44
17	12	19- 8-66	Saint-Laurent	18.2	16.7	17.8	85	20.2	17.8	18.5	78	18.0	16.7	17.7	86
18	16	19- 8-66	Mont-Vigne, -sommet	16.5	16.0	17.8	95	(20.0)	(18.3)	(19.5)	(75)	(19.2)	(18.0)	(19.7)	(88)
19	18	19- 8-66	Mont-Vigne, -chênaie pubescente	16.7	16.0	17.8	93	18.6	18.2	20.6	96	19.0	18.0	19.8	90
20	18	19- 8-66	Mont-Vigne, -chênaie-charmaie à buis	17.8	17.0	18.8	93	18.6	18.2	20.6	96	19.0	18.0	19.8	90
21	17	20- 8-66	Champcelée	20.8	20.0	22.8	92	(22.2)	(20.9)	(21.2)	(71)	(20.7)	(19.5)	(21.7)	(89)
22	14	5- 3-69	Les Bordes	12.2	7.2	6.2	43	(8.1)	(4.2)	(5.5)	(50)	(10.0)	(6.3)	(6.2)	(53)
23	15	5- 3-69	Dun-sur-Auron	10.5	7.6	8.1	64	9.4	5.3	5.7	48	10.3	6.3	6.4	51

T = température du thermomètre sec.-T' = température du thermomètre mouillé.- e = tension de vapeur.- U = humidité relative
Les valeurs entre parenthèses sont obtenues par interpolation.




Fig. 53 - Localisation des points d'observation figurant au tableau 26.




Fig. 54 - Energie disponible dans les écosystèmes forestiers et dans les écosystèmes agricoles.

- 1 - Rayonnement global au-dessus d'une surface horizontale d'albedo nul (latitude = 47° N).
- 2 - Rayonnement global au-dessus d'une surface horizontale d'albedo 25.
- 3 - Rayonnement pénétrant dans la forêt (surface horizontale).
- 4 - Valeurs d'albedo utilisées pour le calcul du rayonnement pénétrant en forêt.
- 5 - Supplément d'énergie capté par la forêt, par rapport à une surface d'albedo 25 (terrain plat).
- 6 - Supplément pour un versant forestier de pente 12°, orienté au Sud, par rapport aux champs et aux prairies en terrain plat (d'albedo = 25).
- 7 - Supplément pour un versant forestier de pente 5°, orienté au Sud.
- 8 - Comparaison entre versant forestier orienté au Nord (pente = 5°) et campagnes voisines en terrain plat.
- 9 - Comparaison entre versant forestier orienté au Nord (pente = 12°) et campagnes voisines en terrain plat.

1 Ly = 1 cal/cm²




Fig. 55 - La radiation solaire à Nevers, en 1966 et 1967, calculée en fonction de la durée d'insolation.

1 - Radiation solaire aux limites de l'atmosphère.

2 à 5 - Radiation au sol pour différentes valeurs d'albedo:

2 - albedo nul.

3 - albedo = 25.

4 - albedo = 15.

5 - albedo modulé saisonnièrement selon l'évolution du feuillage de la forêt, mais compte non tenu de l'influence des conditions météorologiques (cf. Fig. 54).

1 Ly = 1 cal/cm².



Fig. 56 - Evolution comparée des températures *maxima* et *minima* à Nevers et Premery-le Chasnay, au cours des années 1966 et 1967 (moyennes décadaires).




Fig. 57 - Evolution comparée des températures sous forêt et hors forêt.
(moyennes mensuelles)

- 1 - supplément de rayonnement global au profit de la forêt, par rapport aux formations herbacées.
- 2 - température moyenne en forêt - température moyenne hors forêt.
- 3 - *minimum* en forêt - *minimum* hors forêt.
- 4 - *maximum* en forêt - *maximum* hors forêt.

Phénophase feuillée

Phénophase feuillée




Fig. 58 - Evolution comparée des températures sous forêt et hors forêt (moyennes décadaires).

- 1 - supplément de rayonnement global au profit de la forêt, par rapport aux formations herbacées
- 2 - température moyenne en forêt - température moyenne hors forêt.
- 3 - *minimum* en forêt - *minimum* hors forêt.
- 4 - *maximum* en forêt - *maximum* hors forêt.

TABLEAU 27

TEMPERATURES SOUS FORET ET TEMPERATURES HORS FORET - STATION DE PREMERY-LE CHASNAY

Moyennes décadaires et mensuelles des *minima* et des *maxima*.-Années 1966 et 1967

		1966						1967					
		Prémery-le Chasnay				Nevers MN		Prémery-le Chasnay				Nevers MN	
		prairie		forêt				prairie		forêt			
		Tn	Tx	Tn	Tx	Tn	Tx	Tn	Tx	Tn	Tx	Tn	Tx
Janvier:	1ère décade	0.1	6.3	-0.1	6.5	0.3	6.9	-4.2	-1.5	-5.0	-0.6	-4.6	1.0
	2ème décade	-11.8	-3.0	-12.2	-2.5	-11.1	-1.9	-2.5	3.9	-3.0	3.8	1.3	4.3
	3ème décade	6.0	10.0	5.5	10.4	6.5	11.5	3.4	10.0	3.2	10.1	4.2	11.5
	mois	-1.6	4.6	-2.0	5.0	-1.2	5.7	-1.0	4.3	-1.5	4.6	-0.4	5.8
Février:	1ère décade	4.7	12.5	4.2	12.7	5.8	13.5	1.6	6.7	0.9	7.4	0.3	7.6
	2ème décade	3.1	8.7	2.4	9.1	4.0	10.1	-0.8	8.7	-1.3	9.2	0.2	9.9
	3ème décade	5.6	13.6	5.3	14.0	5.4	14.0	3.9	11.9	3.6	12.3	4.8	13.2
	mois	4.4	11.5	3.9	11.8	5.0	12.4	1.4	8.9	0.9	9.4	1.5	10.0
Mars:	1ère décade	2.3	11.3	1.6	11.6	1.7	11.6	4.4	12.8	3.9	12.9	4.5	13.8
	2ème décade	-0.8	9.3	-1.3	9.5	-1.1	10.0	1.2	10.1	0.8	10.5	1.8	11.5
	3ème décade	-0.9	10.2	-1.3	10.2	-1.0	10.8	2.4	11.3	1.7	11.6	2.2	11.8
	mois	0.2	10.3	0.4	10.4	-0.1	10.8	2.6	11.4	2.1	11.7	2.8	12.4
Avril:	1ère décade	5.4	15.5	4.7	15.3	5.3	15.8	0.7	11.1	0.2	11.0	0.8	11.7
	2ème décade	6.8	16.0	6.3	16.1	7.4	16.6	4.2	17.0	3.6	18.0	3.5	18.1
	3ème décade	6.3	16.5	5.8	16.7	6.0	16.9	2.9	13.6	2.2	14.3	1.5	14.6
	mois	6.2	16.0	5.6	16.0	6.3	16.4	2.6	13.9	2.0	14.4	1.9	14.8
Mai:	1ère décade	8.1	17.3	7.8	16.7	7.5	17.7	5.1	17.4	5.2	16.5	3.7	17.1
	2ème décade	8.9	19.7	8.8	18.2	9.2	19.4	9.7	19.8	9.7	18.4	9.7	19.9
	3ème décade	7.7	18.9	7.5	17.5	7.1	19.6	7.5	17.5	7.4	15.8	7.3	18.0
	mois	8.2	18.6	8.0	17.5	7.9	18.9	7.5	18.2	7.4	16.9	6.9	18.3
Juin:	1ère décade	11.9	24.8	11.9	22.6	10.6	25.1	9.6	20.9	9.2	19.0	8.1	21.3
	2ème décade	13.5	23.6	13.2	21.1	12.4	24.1	7.5	18.3	7.3	17.0	6.2	19.0
	3ème décade	11.4	20.3	10.9	18.8	10.8	21.0	12.6	25.2	12.4	22.8	11.8	25.5
	mois	12.3	22.9	12.0	20.8	11.2	23.4	9.9	21.5	9.6	19.6	8.7	21.9
Juillet	1ère décade	12.2		11.9	22.0	11.0	24.7	12.4	24.7	12.3	22.5	11.6	25.1
	2ème décade	11.6		11.3	17.9	11.6	20.1	14.8	29.8	14.9	27.7	12.8	29.7
	3ème décade	11.0	20.5	10.8	18.6	10.5	21.0	13.6	28.2	14.1	26.0	12.3	28.3
	mois	11.6		11.3	19.5	11.0	21.9	13.6	27.6	13.8	25.4	12.2	27.7
Août:	1ère décade	11.4	21.5	10.9	19.7	12.3	22.0	12.7	24.3	12.9	22.5	12.7	24.8
	2ème décade	13.5	23.4	12.5	21.5	12.9	24.2	11.9	21.2	11.8	19.5	11.8	22.3
	3ème décade	10.2	20.3	10.1	18.6	9.2	21.0	12.4	24.0	12.4	22.7	10.5	25.3
	mois	11.6	21.7	11.1	19.9	11.4	22.4	12.3	23.2	12.4	21.6	11.6	24.2
Septembre:	1ère décade	13.6	23.6	13.2	21.5	12.2	24.4	9.5	18.6	9.5	18.5	8.3	20.5
	2ème décade	9.0	20.2	9.2	18.7	7.9	21.0	10.0	16.3	9.7	15.6	9.9	17.1
	3ème décade	9.0	21.9	9.0	20.4	7.2	23.0	11.9	22.4	12.1	20.7	11.6	22.9
	mois	10.5	21.9	10.5	20.2	9.1	22.8	10.5	19.1	10.4	18.3	9.9	20.2
Octobre:	1ère décade	13.0	20.9	12.6	19.8	12.4	21.3	9.5	17.5	9.5	16.5	9.1	18.3
	2ème décade	8.2	16.4	8.6	15.3	8.1	17.5	8.8	18.6	9.0	17.6	9.0	19.4
	3ème décade	6.3	12.0	6.0	11.8	6.8	13.1	9.5	15.2	9.6	14.4	9.4	16.4
	mois	9.1	16.3	9.0	15.5	9.0	17.2	9.3	17.0	9.4	16.1	9.2	17.9
Novembre	1ère décade	3.1	9.8	3.0	10.1	3.8	11.2	3.1	10.9	3.5	10.1	4.0	11.9
	2ème décade	-0.6	4.5	-0.5	4.6	-1.3	6.0	3.9	11.0	4.1	10.9	5.5	12.0
	3ème décade	-0.7	4.8	-0.9	4.8	0.2	5.6	1.5	5.2	0.8	5.2	2.5	6.4
	mois	0.6	6.4	0.5	6.5	0.9	7.6	2.8	9.0	2.8	8.7	4.0	10.1
Décembre	1ère décade	0.5	5.0	-0.2	5.0	1.6	6.3	-2.2	2.3	-2.7	2.2	-2.6	3.3
	2ème décade	2.0	6.2	1.6	6.3	2.7	7.3	-3.4	1.7	-4.1	1.7	-2.4	2.6
	3ème décade	2.4	6.9	2.0	7.5	3.3	8.5	0.7	5.7	0.0	5.7	1.5	6.9
	mois	1.6	6.1	1.2	6.3	2.6	7.4	-1.5	3.3	-2.2	3.3	-1.1	4.3






Fig. 59 - Evolution comparée des amplitudes thermiques sous forêt et hors forêt (moyennes décadales)

- 1 - amplitude en forêt.
- 2 - amplitude hors forêt.
- 3 - amplitude en forêt - amplitude hors forêt.



T_x

- * - * - * 1
- - ● - ● 2
- - - 3
- ... 4
- * - * - * 5
- - - 6
- 7
- 8



T_m

Fig. 60 - Températures sous forêt et températures hors forêt:- Eléments de comparaison:

1 à 3 - Cuif E., 1913, - Vosges occidentales:


- 1 - peuplement de sapin.
- 2 - peuplement de hêtre.
- 3 - peuplement de chêne et hêtre.
- 4 - Burger H., 1951, - Emmental, forêt de sapin et épicéa.

5 - 6 - Schnock G., 1967, - Ardenne belge:

- 5 - observations de l'année 1964.
- 6 - observations de l'année 1965.

7 - 8 - observations de Prémery:

- 7 - année 1966.
- 8 - année 1967.




T_n

T_x - maxima mensuels.
 T_m - moyennes mensuelles.
 T_n - minima mensuels.

TABEAU 28
LES ANNEES 1966 ET 1967 A NEVERS

	1966	1967	Moyenne 1946-74	Moyenne 1952-73
Insolation	1822h	2006h		1911h
Maxima	15,6°	15,7°	15,5°	15,3°
Minima	6,1°	5,6°	5,5°	5,3°
Précipitations	882mm	703mm	766mm	795mm



intervalle moyenne - écart-type,
moyenne + écart-type
1966
1967




Fig. 62 et 63 - Fréquence des écarts
Température en forêt - Température au-dessus de la prairie
Tx = maxima
Tn = minima




Fig. 63 - Analyse mensuelle.




Fig. 64 - Nombre de jours de gel dans l'abri météorologique pour 6 stations (Nivernais, Bazois, Pays de Fours).
Années 1963 à 1967.

TABLEAU 29

NOMBRE DE JOURS DE GEL SOUS ABRI EN 1966 ET 1967

	PREMERY		NEVERS	BOURGES
	pré	bois		
1966 - Janvier-Mai	42	42	35	22
Octobre-Décembre	33	36	21	14
Total	75	78	56	36
1967 - Janvier-Mai	48	54	43	28
Octobre-Décembre	23	33	33	16
Total	75	78	76	44




Fig. 65 - Moyenne du nombre de jours de gel à Nevers, dans l'abri météorologique (Période 1952-1973).




Fig. 66 - Nombre de jours de gel dans l'abri météorologique, à Prémery-le Chasnay, en 1966 et 1967, au-dessus de la prairie et sous-bois.




Fig. 67 - Classement des jours de gel, sous forêt et au-dessus de la prairie, en fonction des températures enregistrées dans l'abri.-Station de Prémery-le Chasnay,-années 1966 et 1967.




Fig. 68 - Ecart de température entre la forêt et la prairie: valeurs moyennes calculées dans le cadre des séquences de temps. - Station de Prémery-le Chasnay, - année 1966.
 $T_n = \text{minima}$
 $T_x = \text{maxima}$




Fig. 69 - DUN-sur-AURON, -4 mars 1969.



Fig. 70 - BALLERAY, -9 mars 1969.

Fig. 69 à 72 - Température de l'air et température du sol:
a) température dans l'abri de la station de référence (Nevers), et température instantanée de l'air au point d'observation.
b) température de l'air et température du sol au point d'observation.





Fig. 71 - MONT-MARTIN, -8 mars 1969:
1 - versant Sud, pelouse à brachypode.
2 - versant Sud, chênaie pubescente.
3 - plateau sommital, forêt de chêne et charme.
4 - versant Nord, sous chêne, érable et tilleul.



72 - 1 - GRIGNON.
2 - MAUBRANCHES.




Fig. 73 - CHATEAUROUX




Fig. 74-75-76 - Conditions de reconstitution de la réserve d'eau des sols:

1 - Précipitations annuelles:

1 a - courbe des fluctuations des précipitations, mesurées de novembre à octobre, au cours de la période novembre 1952 - octobre 1973.

1 b - moyenne.

1 c - intervalle - écart-type, + écart-type.

2 - Précipitations hivernales:

2 a - précipitations cumulées de novembre à mars; courbe des fluctuations au cours de la période 1952-1973.

2 b - moyenne.

2 c - intervalle - écart-type, + écart-type.

2 d - courbe des précipitations hivernales tenant compte de la fraction des pluies d'octobre dépassant 50mm (c'est-à-dire excédant l'évapotranspiration de ce mois).

3 - Quantité *maxima* de précipitations nécessaire pour reconstituer la réserve d'eau des sols:

3 a - sol à faible réserve (réserve utile = 100mm).

3 b - sol à réserve importante (réserve utile = 250mm, - réserve facilement utilisable = 140mm).





TABLEAU 30

PRECIPITATIONS ANNUELLES ET PRECIPITATIONS HIVERNALES

PERIODE NOVEMBRE 1952 - MARS 1973

	novembre - novembre			novembre - mars		
	moyenne	écart-type	coefficient de variation	moyenne	écart-type	coefficient de variation
CHATEAUROUX	717.1	134.5	18.8%	310.8	70.0	22.5%
BOURGES	699.0	125.0	17.9%	286.0	67.0	23.4%
NEVERS	798.5	123.4	15.5%	331.4	72.7	21.9%




Fig. 76 - Hauteur moyenne des précipitations hivernales (novembre à mars).

1 - plus de 400 mm.
3 - 300 à 350 mm.
5 - moins de 275 mm.

2 - 350 à 400 mm.
4 - 275 à 300 mm.




Fig. 77 - Evolution décadaire de la température dans le sol, à 60cm de profondeur, au cours des années 1961 à 1964.-Maison forestière des Brays,-Forêt de Tronçais (Allier).




Fig. 78 - Evolution décadaire de la température dans le sol, à 30cm de profondeur, au cours des années 1961 à 1964.-Maison forestière des Brays,-Forêt de Tronçais (Allier).




Fig. 79 - Températures dans le sol à 30cm et à 60cm de profondeur, à la Maison forestière des Brays (Forêt de Tronçais, -Allier) d'octobre 1962 à octobre 1963, et d'octobre 1963 à octobre 1964.

- 1 - température dans le sol, à 30cm de profondeur, en 1962-63.
- 2 - température dans le sol, à 30cm de profondeur, en 1962-63.
- 3 - température dans le sol, à 60cm de profondeur, en 1963-64.
- 4 - température dans le sol, à 30cm de profondeur, en 1963-64.
- 5 et 6 - périodes des grands froids: gel à -4° au sol.
- 5 - en 1962-63
- 6 - en 1963-64.




Fig. 80 - Evolution décadaire des écarts de température dans le sol, entre les niveaux de 30cm et de 60cm de profondeur. - Station de la Maison forestière des Brays, - Forêt de Tronçais (Allier).




Fig. 81 - Evolution de la température dans le sol, à différentes profondeurs, entre le 21 février et le 2 mai 1963, en relation avec l'évolution des conditions aérologiques.-Maison forestière des Brays,-Forêt de Tronçais (Allier).




Fig. 82 - Températures vraies dans le sol à 60 cm de profondeur, pendant la période de repos de la végétation.- Station des Brays,- Forêt de Tronçais (Allier).

TABLEAU 31

INDICES DE DEVELOPPEMENT CUMULES A PARTIR DU 1er JANVIER

Période 1949-1967

$$Q_{10} = 2$$

	CHATEAUROUX				BOURGES				NEVERS			
	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type
15 janvier	19	22	14	2	19	22	14	2	19	22	13	2
31 janvier	40	47	27	5	40	46	29	5	39	47	28	5
15 février	61	73	42	8	61	70	44	7	59	69	42	8
28 (29) février	81	95	56	11	81	98	58	11	79	95	56	11
15 mars	105	124	81	12	105	124	85	11	102	120	82	12
31 mars	135	158	106	13	135	152	110	11	131	151	107	11
15 avril	165	189	133	15	165	192	139	13	160	185	135	13
30 avril	199	223	167	16	199	226	173	14	192	217	167	13
15 mai	237	261	201	16	237	265	208	14	229	256	201	14

origine:Météorologie Nationale,Subdivision S.S.M / CLIM.

TABLEAU 32

INDICES DE DEVELOPPEMENT CUMULES A PARTIR DU 1er JANVIER

Période 1949-1967

$$Q_{10} = 3$$

	CHATEAUROUX				BOURGES				NEVERS			
	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type
15 janvier	23	28	13	4	22	29	13	4	22	28	13	4
31 janvier	49	61	27	9	48	60	29	9	47	62	28	9
15 février	75	100	42	15	74	96	44	14	71	90	43	14
28 (29) février	102	129	56	21	101	138	59	20	97	131	57	20
15 mars	133	171	92	24	134	171	96	22	128	163	92	23
31 mars	177	228	124	25	177	211	132	22	169	211	126	22
15 avril	225	275	162	31	224	282	174	27	214	266	167	26
30 avril	279	329	218	33	278	336	228	29	264	318	218	27
15 mai	348	395	273	35	348	407	288	30	328	385	273	30

origine:Météorologie Nationale,Subdivision S.S.M. / CLIM.





Fig. 83 et 84 - Indices de développement cumulé à partir du 1er janvier, pour

$$Q_{10} = 2 \quad \text{et} \quad Q_{10} = 3$$

- 1 - CHATEAUROUX
- 2 - BOURGES
- 3 - NEVERS




Fig. 85 - Températures cumulées au-dessus du seuil de 6°, à Châteauroux, Bourges et Nevers:

- 1 - du 10 mars au 20 octobre;
- 2 - du 16 avril au 20 octobre;
- 3 - du 21 mai au 20 octobre;
- 4 - du 1er septembre au 20 octobre.




Fig. 86 - Températures cumulées au-dessus du seuil de 10°, à Châteauroux, Bourges et Nevers:

- 1 - du 10 mars au 20 octobre;
- 2 - du 16 avril au 20 octobre;
- 3 - du 21 mai au 20 octobre;
- 4 - du 1er septembre au 20 octobre.

TABLEAU 33

TEMPERATURES CUMULEES AU-DESSUS DU SEUIL DE 6°

	CHATEAUROUX	BOURGES	NEVERS
Période prévernale:10 mars-15 avril	116 (+0,9%)	115	103 (-10,4%)
Printemps:16 avril-20 mai	226 (-0,4%)	227	206 (-9,3%)
Eté:21 mai-31 août	1197 (-1,7%)	1218	1152 (-5,4%)
Automne:1er septembre-20 octobre	448 (-0,2%)	449	413 (-8,0%)
16 avril-20 octobre	1871 (-1,2%)	1894	1771 (-6,5%)
10 mars-20 octobre	1897 (-1,1%)	2009	1874 (-6,7%)

Les nombres entre parenthèses indiquent le pourcentage de supériorité ou d'infériorité enregistré à Châteauroux et à Nevers par rapport à Bourges.

TABLEAU 34

TEMPERATURES CUMULEES AU-DESSUS DU SEUIL DE 10°

	CHATEAUROUX	BOURGES	NEVERS
Période prévernale:10 mars-15 avril	32 (+10,3%)	29	24 (-17,2%)
Printemps:16 avril-20 mai	100 (-2,0%)	102	87 (-14,7%)
Eté:21 mai-31 août	786 (-2,5%)	806	742 (-7,9%)
Automne:1er septembre-20 octobre	255 (-0,4%)	256	224 (-12,5%)
16 avril-20 octobre	1141 (-2,0%)	1164	1053 (-9,5%)
10 mars-20 octobre	1173 (-1,7%)	1193	1077 (-9,7%)

Les nombres entre parenthèses indiquent le pourcentage de supériorité ou d'infériorité enregistré à Châteauroux et à Nevers par rapport à Bourges

TABLEAU 35

ECART MOYEN QUOTIDIEN ENTRE BOURGES ET NEVERS
SUR LES TEMPERATURES CUMULEES

	Nombre de jours	Ecart sur la cumulation au-dessus du seuil de	
		6°	10°
1er janvier - 10 mars	69/70	0,07	0,00
11 mars - 15 avril	36	0,33	0,13
16 avril -20 mai	35	0,60	0,42
21 mai - 31 août	103	0,64	0,62
1er septembre - 20 octobre	50	0,72	0,64
16 avril - 20 octobre	188	0,65	0,59
10 mars - 20 octobre	224	0,60	0,52

TABLEAU 36

INDICES DE DEVELOPPEMENT CUMULES A PARTIR DU 1er FEVRIER
Période 1949-1967

$$Q_{10} = 3$$

	CHATEAUROUX				BOURGES				NEVERS			
	Moy.	Max.	Min.	Ecart- type	Moy.	Max.	Min.	Ecart- type	Moy.	Max.	Min.	Ecart- type
15 février	26	46	9	10	26	41	8	9	25	42	7	9
28 (29) février	53	78	19	17	53	83	18	16	51	79	15	17
15 mars	85	124	46	21	85	120	44	20	81	116	40	20
31 mars	128	181	93	23	129	167	94	20	123	166	89	20
15 avril	176	224	126	29	176	232	133	25	167	216	126	24
30 avril	230	282	179	31	230	287	175	27	217	269	166	26
15 mai	299	344	246	33	299	357	249	28	282	336	231	28
31 mai	377	441	300	40	379	424	323	34	357	400	307	31

Origine:Météorologie Nationale,-Subdivision / SMM / CLIM.




Fig. 87 - Indices de développement cumulés à Châteauroux, Bourges et Nevers: a) du 1er février au 31 mai;
b) du 1er août au 31 octobre.

```
1 - moyenne;
2 - intervalle (moyenne + écart-type),
   (moyenne - écart-type).
```

TABLEAU 37

INDICES DE DEVELOPPEMENT CUMULES A PARTIR DU 1er AOUT

Période 1949-1967

$$Q_{10} = 3$$

	CHATEAUROUX				BOURGES				NEVERS			
	Moy.	Max.	Min.	Ecart- type	Moy.	Max.	Min.	Ecart- type	Moy.	Max.	Min.	Ecart- type
15août	122	161	91	20	124	154	96	18	117	159	93	17
31 août	246	305	192	35	250	301	199	31	232	280	186	25
15 septembre	356	453	251	51	358	455	282	48	332	415	274	39
30 septembre	444	578	326	61	447	579	371	58	415	534	346	46
15 octobre	513	675	402	68	516	674	431	66	479	623	415	53
31 octobre	569	743	459	68	572	739	489	64	532	687	469	53

Origine:Météorologie Nationale,Subdivision / SMM / CLIM.




Fig. 88 - Indices de développement cumulés à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 15 avril au 31 octobre:

- 1 - moyenne;
- 2 - intervalle (moyenne + écart-type), (moyenne - écart-type).

TABLEAU 38

INDICES DE DEVELOPPEMENT CUMULES A PARTIR DU 15 AVRIL

Période 1949-1967

$$Q_{10} = 3$$

	CHATEAUROUX				BOURGES				NEVERS			
	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type	Moy.	Max.	Min.	Ecart-type
30 avril	54	71	39	10	54	76	39	10	50	64	36	9
15 mai	123	151	106	12	124	147	109	10	115	139	100	11
31 mai	202	255	163	24	204	247	170	21	190	227	161	19
15 juin	293	360	229	35	299	371	256	33	280	348	229	31
30 juin	406	504	344	44	413	498	357	38	386	474	340	34
15 juillet	533	691	445	68	543	677	475	58	506	630	444	51
31 juillet	669	844	543	85	684	827	592	76	634	779	557	64
15 août	791	1005	641	98	808	978	694	86	751	922	658	74
31 août	915	1139	734	114	934	1108	791	101	866	1043	751	84
15 septembre	1025	1212	794	122	1042	1215	887	109	966	1127	841	88
30 septembre	1113	1320	868	126	1131	1333	975	113	1049	1187	913	89
15 octobre	1182	1417	944	129	1200	1429	1051	117	1113	1274	982	93
31 octobre	1237	1485	1002	129	1256	1493	1107	115	1166	1339	1036	92

Origine: Météorologie Nationale, -Subdivision / SMM / CLIM.




Fig. 89 - Fréquence des températures au sol atteignant ou dépassant 40°.- Station des Brays, -Forêt de Tronçais (Allier), -Années 1960 à 1964.




Fig. 90 - L'année 1963 à Bourges:insolation (h),température (t), précipitations (p),dans le cadre des séquences de temps.




Fig. 91 - L'année 1964 à Bourges:insolation (h),température (t), précipitations (p),dans le cadre des séquences de temps.




Fig. 92

Fig. 93

Fig. 94

Fig. 95




Fig. 92

Fig. 92 à 98 - Précipitations, pendant la période de végétation (avril à octobre),




Fig. 100: 1964

Fig. 99: 1963

Fig. 99 et 100 - Insolation et rayonnement global, à Bourges et à Nevers, en 1963 et 1964.

a -Insolation.

b -Rayonnement global calculé.

1-2-Moyenne 1952-1973:

1 -Bourges.

2 -Nevers.

3-4-Intervalle $(M+\sigma) - (M-\sigma)$:

3 -Bourges.

4 -Nevers.

5-6-Valeurs de l'année:

5 -Bourges.

6 -Nevers.

TABLEAU 39

PRECIPITATIONS EN PERIODE D' ACTIVITE DE LA VEGETATION

	Avril à octobre			Juin à août		
	CHATEAU-ROUX	BOURGES	NEVERS	CHATEAU-ROUX	BOURGES	NEVERS
Moyenne 1952-1973	404	417	468	171	182	203
Ecart-type	112	103	88	75	67	69
M + o	516	520	556	246	249	272
M - o	292	314	380	96	115	134
1962	345	316	363	82	62	89
1963	488	397	528	282	207	288
1964	318	336	422	74	83	148
1965	523	564	568	190	243	203
1966	426	466	490	192	265	270
1967	403	402	401	73	101	89
1968	543	612	590	300	300	256

TABLEAU 40

COMPARAISON DES PRECIPITATIONS

A NEVERS , PREMERY ET RAVEAU
PENDANT LA SAISON DE VEGETATION
(11 avril - 31 octobre)

	NEVERS		PREMERY		RAVEAU	
	Précipitations (mm)	% des P annuelles	Précipitations (mm)	% des P annuelles	Précipitations (mm)	% des P annuelles
1963	491.5	59	525.6	61	583.5	67
1964	401.9	62	489.2	66	407.9	65
1965	558.9	53	553.8	46	479.8	47
1966	472.1	54	564.4	50	506.6	51
1967	389.7	55	449.5	52		




Fig. 101 - Répartition décadaire des précipitations à Nevers, Prémery et Raveau, au cours de la saison de végétation. - Années 1963 à 1967.




Fig. 102 - Excédent ou déficit des précipitations à Premery et à Raveau par rapport à Nevers, pendant la saison de végétation.-Années 1963 à 1967.

TABEAU 41

INSOLATION ET RAYONNEMENT GLOBAL PENDANT LA SAISON DE VEGETATION

		BOURGES							NEVERS						
		avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	avril	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
INSOLATION en heures/mois	Moyenne (M) 1952-73	180.4	211.8	223.3	240.0	211.1	183.9	142.4	187.5	224.8	239.1	258.6	228.1	196.5	145.6
	Ecart- type (σ)	32.1	32.6	43.3	50.6	33.7	41.7	32.2	37.3	38.0	41.2	49.2	38.5	37.0	28.4
	1962	195.3	178.2	313.0	247.0	266.8	194.5	183.8	216.6	199.9	317.8	248.8	287.4	206.5	171.9
	1963	153.6	210.5	220.4	297.9	165.0	131.9	146.9	151.5	215.5	205.7	315.7	181.1	148.0	129.2
	1964	189.5	250.6	277.5	327.7	238.0	200.9	125.2	170.6	244.0	284.8	333.2	235.7	202.7	111.1
	1965	141.7	170.3	202.3	186.4	182.4	132.7	198.5	126.8	276.5	210.9	207.9	208.8	144.4	196.7
	1966	170.8	229.8	248.8	183.2	208.2	231.9	88.1	172.2	233.7	259.5	209.7	209.8	234.5	95.3
	1967	201.9	216.9	266.5	315.4	228.4	134.3	126.4	223.3	234.2	267.4	327.3	247.9	150.5	125.2
	1968	218.6	191.8	221.9	256.7	178.8	152.5	134.5	206.6	176.7	225.3	252.8	183.5	167.6	130.0
RAYONNEMENT GLOBAL en cal/cm2/jour	Moyenne (M) 1952-73	343.4	421.2	465.5	467.9	391.9	301.4	187.5	351.5	437.0	485.8	490.9	411.6	314.4	190.2
	Ecart- type (σ)	36.9	39.5	55.8	62.4	39.0	42.9	25.2	42.9	46.1	53.1	60.7	44.6	36.1	22.4
	1962	360.5	380.5	581.1	476.6	456.4	312.4	220.0	385.0	406.8	587.3	478.8	480.3	324.7	210.7
	1963	312.6	419.6	461.7	539.4	338.6	247.8	191.1	310.1	425.7	442.8	561.4	357.2	264.4	177.2
	1964	353.8	468.3	535.3	576.2	423.1	319.0	174.0	332.1	460.2	544.7	583.0	420.4	320.8	163.0
	1965	298.9	370.9	438.4	401.8	358.7	248.7	231.5	281.7	378.4	449.5	428.3	389.3	260.7	230.1
	1966	332.3	443.0	498.3	397.8	388.6	350.9	144.9	334.0	447.8	512.1	430.5	390.4	353.6	150.6
	1967	368.1	427.4	521.1	561.0	412.0	250.3	175.0	392.7	448.4	522.3	575.7	434.5	267.0	174.0
	1968	387.3	399.0	462.9	488.5	354.5	269.1	181.3	373.5	378.6	468.1	483.7	360.0	284.6	177.8

TABLEAU 42

ABREVIATIONS UTILISEES DANS LES TABLEAUX
EXPRIMANT LES DIFFERENTES OPTIONS DU BILAN DE L'EAU

NJ	Nombre de jours d'une séquence de temps.
RU	Réserve utile du sol au début de cette période.
P	Précipitations au cours de la période.
T	Somme de RU et de P.
ETP	Evapotranspiration potentielle au cours de la période.
f (RFU)	Fraction des besoins en eau prélevée sur la réserve facilement utilisable (RFU), donc non soumise à réduction.
K	Coefficient $(1 - \frac{e}{Rs})^n$, permettant de calculer le volume de la réserve de survie du sol, quand l'augmentation du potentiel efficace entraîne le freinage de la transpiration. (cf. texte, p. 239).
Rs	Réserve de survie, caractéristique du sol.
e	Evapotranspiration potentielle quotidienne (elle est supposée égale pour tous les jours de la séquence de temps).
n	Durée, en jours, de la fraction de la séquence de temps au cours de laquelle il y a réduction de la transpiration; n peut ne pas être un nombre entier.
f (Rs)	Fraction des besoins en eau prélevée sur la réserve de survie.
ETt	Evapotranspiration réelle, $(f (RFU) + f (Rs))$, au cours de la séquence de temps.

La réserve du sol, l'ETP et l'ETR sont exprimées, non en unités de volume, mais comme les précipitations par leur équivalence en millimètres d'épaisseur.

Au niveau des cumulations (déficit, drainage, ETt), l'arrondissement de la première décimale fait apparaître parfois des discordances de + 0,1 ou - 0,1, dues au fait que les décimales de rang inférieur ont été prises en compte pour le calcul.

TABLEAU 43 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

albedo = 25
Réserve utile = 100 mm
Réserve facilement utilisable = 40 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
3	21/25	5	100.0	6.3	106.3	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	7.4
3	6/29	4	98.9	31.4	130.3	6.3	6.3	.	.	6.3	.	24.0	13.7
3/4	30(3)/ 6(4)	8	100.0	15.3	115.3	11.5	11.5	.	.	11.5	.	3.8	25.2
4	7/11	5	100.0	18.2	118.2	8.5	8.5	.	.	8.5	.	9.7	33.7
4	12/13	2	100.0	5.1	105.1	4.7	4.7	.	.	4.7	.	0.4	38.4
4	14/22	9	100.0	18.4	118.4	27.3	27.3	.	.	27.3	.	.	65.7
4	23/24	2	91.1	5.3	96.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	70.4
4	25/27	3	91.7	.	91.7	5.7	5.7	.	.	5.7	.	.	76.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	86.0	9.7	95.7	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	90.4
5	3/ 6	4	81.4	0.3	81.7	11.5	11.5	.	.	11.5	.	.	101.9
5	7/ 8	2	70.2	3.3	73.5	8.4	8.4	.	.	8.4	.	.	110.3
5	9/10	2	65.1	7.1	72.2	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	116.4
5	11/12	2	66.1	.	66.1	6.3	6.1	0.997	0.2	6.3	.	.	122.7
5	13/14	2	59.8	10.1	69.9	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	128.7
5	15/17	3	63.9	0.2	64.1	10.8	4.1	.	6.5	10.6	0.2	0.2	139.3
5	18/19	2	53.5	.	53.5	6.1	.	0.891	5.3	5.3	0.8	.	144.6
5	20/23	4	48.2	20.3	68.5	10.4	8.5	0.901	1.9	10.4	.	.	155.0
5	24/25	2	58.1	2.5	60.6	7.2	0.6	0.968	6.5	7.0	0.2	.	162.1
5	26/29	4	53.5	4.1	57.6	11.6	.	0.892	10.4	10.4	1.2	.	172.4
5	30/31	2	47.3	.	47.3	6.6	.	0.820	5.1	5.1	1.5	.	177.5
6	1/ 7	7	42.2	28.5	70.7	23.2	10.7	0.893	11.6	22.3	0.9	4.8	199.8
6	8/ 9	2	48.4	.	48.4	6.5	.	0.807	5.1	5.1	1.4	.	204.9
6	10/15	6	43.3	19.3	62.6	17.8	2.6	0.895	13.7	16.3	1.5	6.2	221.2
6	16/17	2	46.3	.	46.3	7.9	.	0.772	5.9	5.9	2.0	.	227.1
6	18/23	6	40.4	1.9	42.3	22.4	.	0.873	13.5	13.5	8.9	18.6	240.6
6	24/25	2	28.8	1.0	29.8	6.9	.	0.680	3.3	3.3	3.6	.	244.0
6	26/28	3	26.4	46.7	73.1	9.5	9.5	0.888	.	9.5	.	.	253.5
6/7	29(6)/ 1(7)	3	63.6	.	63.6	9.7	3.6	0.901	5.9	9.6	0.1	.	263.0
7	2/ 5	4	54.1	1.5	55.6	14.2	.	0.784	12.0	12.0	2.2	.	275.0

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	6/12	7	43.6	14.7	58.3	24.9	.	0.652	20.3	20.3	4.6	29.1	37.9
7	13	1	38.0	2.5	40.5	2.1	.	0.965	1.4	1.4	0.7	29.8	37.9
7	14/21	8	39.1	.	39.1	34.8	.	0.548	17.7	17.7	17.1	46.9	37.9
7	22/25	4	21.4	52.4	73.8	17.2	13.8	0.943	3.4	17.2	.	46.9	37.9
7	26/31	6	56.6	.	56.6	33.8	.	0.553	25.3	25.3	8.5	55.4	37.9
8	1/ 7	7	31.3	66.4	97.7	19.8	19.8	.	.	19.8	.	55.4	37.9
8	8/10	3	77.9	2.8	80.7	6.9	6.9	.	.	6.9	.	55.4	37.9
8	11/15	5	73.8	2.5	76.3	15.2	15.2	.	.	15.2	.	55.4	37.9
8	16/21	6	61.1	23.0	84.1	20.5	20.5	.	.	20.5	.	55.4	37.9
8	22/24	3	63.6	6.5	70.1	8.2	8.2	.	.	8.2	.	55.4	37.9
8	25/28	4	61.9	7.6	69.5	12.3	9.5	0.953	2.8	12.3	.	55.4	37.9
8/9	29(8)/ 3(9)	6	57.2	6.3	63.5	14.2	3.5	0.834	10.0	13.5	0.7	56.1	37.9
9	4/ 6	3	50.0	4.3	54.3	4.8	.	0.922	4.2	4.2	0.6	56.7	37.9
9	7/12	6	50.1	2.3	52.4	10.8	.	0.833	8.8	8.8	2.0	58.7	37.9
9	13/15	3	43.6	.	43.6	4.0	.	0.935	2.8	2.8	1.2	59.9	37.9
9	16/22	7	40.8	1.8	42.6	13.7	.	0.793	8.8	8.8	4.9	64.8	37.9
9	23	1	33.8	19.5	53.3	0.9	.	0.985	0.8	0.8	0.1	64.9	37.9
9	24/27	4	52.5	11.3	63.8	6.0	3.8	0.963	2.2	6.0	.	64.9	37.9
9	28/29	2	57.8	.	57.8	3.0	.	0.951	2.9	2.9	0.1	65.0	37.9
9/10	30(9)/ 7(10)	8	54.9	29.7	84.6	8.4	8.4	.	.	8.4	.	65.0	37.9
10	8	1	76.2	.	76.2	1.0	1.0	.	.	1.0	.	65.0	37.9
10	9/10	2	75.2	.	75.2	1.9	1.9	.	.	1.9	.	65.0	37.9
10	11/12	2	73.3	.	73.3	3.0	3.0	.	.	3.0	.	65.0	37.9
10	13/14	2	70.3	.	70.3	2.3	2.3	.	.	2.3	.	65.0	37.9
10	15/16	2	68.0	.	68.0	2.0	2.0	.	.	2.0	.	65.0	37.9
10	17	1	66.0	1.3	67.3	0.8	0.8	.	.	0.8	.	65.0	37.9
10	18/19	2	66.5	.	66.5	1.8	1.8	.	.	1.8	.	65.0	37.9
10	20/21	2	64.7	.	64.7	1.9	1.9	.	.	1.9	.	65.0	37.9
10	22/23	2	62.8	.	62.8	2.0	2.0	.	.	2.0	.	65.0	37.9
10	24/26	3	60.8	.	60.8	1.9	0.8	0.982	1.1	1.9	.	65.0	37.9
10	27/29	3	58.9	.	58.9	1.2	.	0.980	1.2	1.2	.	65.0	37.9
10/11	30(10)/ 6(11)	8	57.8	28.9	86.7	5.6	5.6	.	.	5.6	.	65.0	37.9
11	7/ 8	2	81.1	2.5	83.6	1.9	1.9	.	.	1.9	.	65.0	37.9
11	9/12	4	81.7	30.8	112.5	5.4	5.4	.	.	5.4	.	65.0	37.9
11	13/14	2	100.0	17.2	117.2	0.6	0.6	.	.	0.6	.	65.0	37.9
11	15/21	7	100.0	63.6	163.6	5.2	5.2	.	.	5.2	.	65.0	37.9
11	22/23	2	100.0	.	100.0	1.2	1.2	.	.	1.2	.	65.0	37.9
11	24/26	3	98.8	11.1	109.9	2.2	2.2	.	.	2.2	.	65.0	37.9

B O U R G E S - 1 9 6 3

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

albedo = 25
Réserve utile = 100 mm
Réserve facilement utilisable = 40 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
3	21/25	5	100.0	3.7	103.7	7.7	7.7	.	.	7.4	.	.	7.7
3	26/29	4	96.0	24.0	120.0	4.9	4.9	.	.	4.9	.	15.1	13.7
3/4	30(3)/ 6(4)	8	100.0	13.0	113.0	12.5	12.5	.	.	12.5	.	0.5	25.1
4	7/11	5	100.0	10.5	110.5	9.7	9.7	.	.	9.7	.	0.8	34.8
4	12/13	2	100.0	3.7	103.7	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	39.5
4	14/22	9	99.0	11.0	110.0	25.8	25.8	.	.	25.8	.	16.4	65.3
4	23/24	2	84.2	9.6	93.8	4.4	4.4	.	.	4.4	.	16.4	69.7
4	25/27	3	89.4	.	89.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	16.4	74.4
4/5	28(4)/ 2(5)	5	84.7	8.9	93.6	14.0	14.0	.	.	14.0	.	16.4	88.4
5	3/ 6	4	79.6	0.9	80.5	10.1	10.1	.	.	10.1	.	16.4	98.5
5	7/ 8	2	70.4	2.5	72.9	8.4	8.4	.	.	8.4	.	16.4	106.9
5	9/10	2	64.5	4.9	69.4	5.5	5.5	.	.	5.5	.	16.4	112.4
5	11/12	2	63.9	.	63.9	7.0	3.9	0.948	3.1	7.0	.	16.4	119.4
5	13/14	2	56.9	11.2	68.1	5.6	5.6	.	.	5.6	.	16.4	125.0
5	15/17	3	62.5	0.3	62.8	9.5	2.8	0.891	6.5	9.3	0.2	16.4	134.3
5	18/19	2	53.5	.	53.5	5.7	.	0.907	5.0	5.0	0.7	16.4	139.3
5	20/23	4	48.5	27.8	76.3	9.5	9.5	.	0.6	9.5	.	16.4	148.8
5	24/25	2	66.8	.	66.8	7.4	6.8	0.990	.	7.4	.	16.4	156.2
5	26/29	4	59.4	29.0	88.4	11.8	11.8	.	.	11.8	.	16.4	168.0
5	30/31	2	76.6	.	76.6	6.9	6.9	.	.	6.9	.	16.4	174.9
6	1/ 7	7	69.7	5.8	75.5	27.2	15.5	0.818	10.9	26.5	0.7	16.4	201.3
6	8/ 9	2	49.1	.	49.1	6.6	.	0.893	5.2	5.2	1.4	16.4	206.6
6	10/15	6	43.8	9.1	52.9	16.9	.	0.763	12.6	12.6	3.3	16.4	219.2
6	16/17	2	40.3	.	40.3	8.4	.	0.865	5.5	5.5	2.9	16.4	224.6
6	18/23	6	34.9	4.9	39.8	24.0	.	0.661	13.5	13.5	10.5	16.4	236.1
6	24/25	2	26.3	10.2	36.5	8.6	.	0.862	5.0	5.0	3.6	16.4	243.1
6	26/28	3	31.3	24.6	56.1	10.5	.	0.835	9.2	9.2	1.3	16.4	252.4
6/7	29(6)/ 1(7)	3	46.8	1.9	48.7	11.3	.	0.823	8.6	8.6	2.7	16.4	261.0
7	2/ 5	4	40.1	26.5	66.6	15.2	6.6	0.862	8.3	14.9	0.3	16.4	275.9

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	k	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETT
7	6/12	7	51.7	5.6	57.3	26.5	.	0.634	21.0	21.0	5.5	33.1	296.9
7	13	1	36.3	3.6	39.9	2.4	.	0.960	1.6	1.6	0.8	33.9	298.5
7	14/21	8	38.3	.	38.3	34.5	.	0.551	17.2	17.2	17.3	51.2	315.7
7	22/25	4	21.1	8.9	30.0	18.5	.	0.726	8.2	8.2	10.3	61.5	323.9
7	26/31	6	21.8	.	21.8	32.7	.	0.565	9.5	9.5	23.2	84.7	333.4
8	1/7	7	12.3	80.5	92.8	18.7	18.7	.	.	18.7	.	84.7	352.1
8	8/10	3	74.1	2.9	77.0	6.8	6.8	.	.	6.8	.	84.7	358.9
8	11/15	5	70.2	9.6	79.8	14.6	14.6	.	.	14.6	.	84.7	373.5
8	16/21	6	65.2	24.2	89.4	20.1	20.1	.	.	20.1	.	84.7	393.6
8	22/24	3	69.3	6.8	76.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	84.7	401.2
8	25/28	4	68.5	1.8	70.3	12.3	10.3	0.966	2.0	12.3	.	84.7	413.5
8/9	29(8)/ 3(9)	6	58.0	4.1	62.1	16.4	2.1	0.783	13.0	15.1	1.3	86.0	428.6
9	4/6	3	47.0	4.6	51.6	4.3	.	0.930	3.6	3.6	0.7	86.7	432.2
9	7/12	6	48.0	1.7	49.7	10.2	.	0.842	7.9	7.9	2.3	89.0	440.1
9	13/15	3	41.8	.	41.8	3.8	.	0.938	2.6	2.6	1.2	90.2	442.7
9	16/22	7	39.2	.	39.2	13.4	.	0.797	8.0	8.0	5.4	95.7	450.6
9	23	1	31.3	.	31.3	1.2	.	0.980	0.6	0.6	0.6	96.2	451.3
9	24/27	4	30.6	8.0	38.6	6.7	.	0.893	4.1	4.1	2.6	98.8	455.4
9	28/29	2	34.5	.	34.5	2.9	.	0.952	1.6	1.6	1.3	100.0	457.0
9/10	30(9)/ 7(10)	8	32.8	18.0	50.8	8.6	.	0.865	6.8	6.8	1.8	101.8	463.9
10	8	1	44.0	.	44.0	0.7	.	0.988	0.5	0.5	0.2	102.0	464.4
10	9/10	2	43.5	.	43.5	2.2	.	0.964	1.6	1.6	0.6	102.6	466.0
10	11/12	2	41.9	.	41.9	2.4	.	0.960	1.7	1.7	0.7	103.3	467.6
10	13/14	2	40.2	.	40.2	2.2	.	0.964	1.5	1.5	0.7	104.1	469.1
10	15/16	2	38.8	.	38.8	2.2	.	0.964	1.4	1.4	0.8	104.9	470.5
10	17	1	37.4	0.5	37.9	1.1	.	0.982	0.7	0.7	0.4	105.3	471.2
10	18/19	2	37.2	.	37.2	2.1	.	0.965	1.3	1.3	0.8	106.1	472.5
10	20/21	2	35.9	.	35.9	2.2	.	0.964	1.3	1.3	0.9	107.0	473.6
10	22/23	2	34.6	.	34.6	1.8	.	0.970	1.0	1.0	0.8	107.8	474.8
10	24/26	3	33.6	.	33.6	2.7	.	0.956	1.5	1.5	1.2	109.0	476.3
10	27/29	3	32.1	.	32.1	1.0	.	0.983	0.5	0.5	0.5	109.4	476.9
10/11	30(10)/ 6(11)	8	31.5	56.1	87.6	6.2	6.2	.	.	6.2	.	109.4	483.1
11	7/8	2	81.4	0.6	82.0	2.5	2.5	.	.	2.5	.	109.4	485.6
11	9/12	4	79.5	13.3	93.3	4.9	4.9	.	.	.	.	109.4	490.5
11	13/14	2	88.4	17.9	106.3	1.2	1.2	.	.	1.2	.	109.4	491.7
11	15/21	7	100.0	10.4	110.4	4.8	4.8	.	.	4.8	.	109.4	496.5
11	22/23	2	100.0	.	100.0	1.1	1.1	.	.	1.1	.	109.4	497.6
11	24/26	3	98.9	10.6	109.5	1.6	1.6	.	.	1.6	.	109.4	499.2

TABEAU 45 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

NEVERS - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

albedo = 25
Réserve utile = 100 mm
Réserve facilement utilisable = 40 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
3	21/25	5	100.0	2.7	102.7	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	7.9
3	26/29	4	94.8	23.1	117.9	5.2	5.2	.	.	5.2	.	12.7	13.1
3/4	30(3)/ 6(4)	8	100.0	29.3	129.3	10.9	10.9	.	.	10.9	.	18.4	24.0
4	7/11	5	100.0	17.7	117.7	8.6	8.6	.	.	8.6	.	9.1	32.6
4	12/13	2	100.0	5.8	105.8	3.7	3.7	.	.	3.7	.	2.1	36.3
4	14/22	9	100.0	18.1	118.1	21.8	21.8	.	.	21.8	.	.	58.1
4	23/24	2	96.3	4.3	100.6	3.9	3.9	.	.	3.9	.	.	62.0
4	25/27	3	96.7	.	96.7	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	67.6
4/5	28(4)/ 2(5)	5	91.1	6.8	97.9	12.6	12.6	.	.	12.6	.	.	80.2
5	3/ 6	4	85.3	0.5	85.8	9.3	9.3	.	.	9.3	.	.	89.5
5	7/ 8	2	76.5	6.7	83.2	7.3	7.3	.	.	7.3	.	.	96.8
5	9/10	2	75.9	3.1	79.0	4.8	4.8	.	.	4.8	.	.	101.6
5	11/12	2	74.2	.	74.2	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	108.0
5	13/14	2	67.8	13.6	81.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	112.7
5	15/17	3	76.7	0.3	77.0	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	120.6
5	18/19	2	69.1	.	69.1	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	125.9
5	20/23	4	63.8	30.4	94.2	10.0	10.0	.	.	10.0	.	.	135.9
5	24/25	2	84.2	.	84.2	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	142.6
5	26/29	4	77.5	35.0	112.5	11.6	11.6	.	.	11.6	.	0.9	154.2
5	30/31	2	100.0	.	100.0	7.7	7.7	.	.	7.7	.	.	161.9
6	1/ 7	7	92.3	19.3	111.6	24.1	24.1	.	.	24.1	.	.	186.0
6	8/ 9	2	87.5	.	87.5	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	191.5
6	10/15	6	82.0	29.4	111.4	13.7	13.7	.	.	13.7	.	.	205.2
6	16/17	2	97.7	.	97.7	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	211.6
6	18/23	6	91.3	2.9	94.2	20.8	20.8	.	.	20.8	.	.	232.4
6	24/25	2	73.4	15.0	88.4	7.1	7.1	.	.	7.1	.	.	239.5
6	26/28	3	81.3	27.7	109.0	9.9	9.9	.	.	9.9	.	.	249.4
6/7	29(6)/ 1(7)	3	99.1	17.6	116.7	10.0	10.0	.	.	10.0	.	6.7	259.4
7	2/ 5	4	100.0	3.2	103.2	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	270.8

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	6/12	7	91.8	17.8	109.6	26.1	26.1	.	.	26.1	.	49.9	296.9
7	13	1	83.5	5.3	88.8	2.7	2.7	.	.	2.7	.	49.9	299.6
7	14/21	8	86.1	.	86.1	34.7	26.1	0.862	8.3	34.4	0.3	49.9	334.0
7	22/25	4	51.7	0.9	52.6	15.8	.	0.762	12.5	12.5	3.3	49.9	346.5
7	26/31	6	40.1	.	40.1	25.4	.	0.645	14.2	14.2	11.2	49.9	360.8
8	1/ 7	7	25.8	92.8	118.6	18.5	18.5	.	.	18.5	0.1	50.0	379.3
8	8/10	3	100.0	4.5	104.5	6.0	6.0	.	.	6.0	14.7	50.0	385.3
8	11/15	5	98.5	6.1	104.6	12.4	12.4	.	.	12.4	14.7	50.0	397.7
8	16/21	6	92.2	29.0	121.2	16.4	16.4	.	.	16.4	14.7	54.8	414.1
8	22/24	3	100.0	9.8	109.8	7.6	7.6	.	.	7.6	14.7	57.0	421.7
8	25/28	4	100.0	2.8	102.8	10.1	10.1	.	.	10.1	14.7	57.0	431.8
8/9	29(8)/ 3(9)	6	92.7	4.6	97.3	15.5	15.5	.	.	15.5	14.7	57.0	447.3
9	4/ 6	3	81.8	5.9	87.7	4.6	4.6	.	.	4.6	14.7	57.0	451.9
9	7/12	6	83.1	.	83.1	10.7	10.7	.	.	10.7	14.7	57.0	462.6
9	13/15	3	72.4	.	72.4	4.2	4.2	.	.	4.2	14.7	57.0	466.8
9	16/22	7	68.2	.	68.2	12.4	8.2	0.931	4.1	12.3	0.1	57.0	479.1
9	23	1	55.9	7.0	62.9	1.4	1.4	.	.	1.4	14.8	57.0	480.5
9	24/27	4	61.5	20.1	81.6	5.5	5.5	.	.	5.5	14.8	57.0	486.0
9	28/29	2	76.1	.	76.1	2.5	2.5	.	.	2.5	14.8	57.0	488.5
9/10	30(9)/ 7(10)	8	73.6	20.6	94.2	7.4	7.4	.	.	7.4	14.8	57.0	495.9
10	8	1	86.8	.	86.8	0.8	0.8	.	.	0.8	14.8	57.0	496.7
10	9/10	2	86.0	.	86.0	1.2	1.2	.	.	1.2	14.8	57.0	497.9
10	11/12	2	84.8	.	84.8	1.8	1.8	.	.	1.8	14.8	57.0	499.7
10	13/14	2	83.0	0.2	83.2	1.9	1.9	.	.	1.9	14.8	57.0	501.6
10	15/16	2	81.3	.	81.3	1.4	1.4	.	.	1.4	14.8	57.0	503.0
10	17	1	79.9	0.4	80.3	0.7	0.7	.	.	0.7	14.8	57.0	503.7
10	18/19	2	79.6	.	79.6	1.4	1.4	.	.	1.4	14.8	57.0	505.1
10	20/21	2	78.2	.	78.2	1.8	1.8	.	.	1.8	14.8	57.0	506.9
10	22/23	2	76.4	.	76.4	1.5	1.5	.	.	1.5	14.8	57.0	508.4
10	24/26	3	74.9	.	74.9	1.5	1.5	.	.	1.5	14.8	57.0	509.9
10	27/29	3	73.4	.	73.4	1.0	1.0	.	.	1.0	14.8	57.0	510.9
10/11	30(10)/ 6(11)	8	72.4	32.0	104.4	5.4	5.4	.	.	5.4	14.8	57.0	516.3
11	7/ 8	2	99.0	3.8	102.8	2.0	2.0	.	.	2.0	14.8	57.8	518.3
11	9/12	4	100.0	20.9	120.9	3.6	3.6	.	.	3.6	14.8	75.1	521.9
11	13/14	2	100.0	19.0	119.0	1.0	1.0	.	.	1.0	14.8	93.1	522.9
11	15/21	7	100.0	21.5	121.5	4.8	4.8	.	.	4.8	14.8	109.8	527.7
11	22/23	2	100.0	.	100.0	0.6	0.6	.	.	0.6	14.8	109.8	528.3
11	24/26	3	99.4	12.7	112.1	1.8	1.8	.	.	1.8	14.8	120.1	530.1

TABLEAU 46 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1964

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

albedo = 25
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 40mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
3	22/25	4	100.0	32.1	132.1	5.2	5.2	.	.	5.2	.	26.9	5.2
3/4	26(3)/ 1(4)	7	100.0	3.8	103.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	26.9	14.6
4	2/ 6	5	94.4	16.0	110.4	7.0	7.0	.	.	7.0	.	3.4	21.6
4	7/12	6	100.0	1.5	101.5	13.8	13.8	.	.	13.8	.	30.3	35.4
4	13/14	2	87.7	0.5	88.2	4.9	4.9	.	.	4.9	.	30.3	40.3
4	15/16	2	83.3	0.5	83.8	6.4	6.4	.	.	6.4	.	30.3	46.7
4	17/19	3	77.4	57.8	135.2	3.7	3.7	.	.	3.7	.	31.5	50.4
4	20.21	2	100.0	8.4	108.4	5.0	5.0	.	.	5.0	.	3.4	55.4
4	22/23	2	100.0	22.4	122.4	4.1	4.1	.	.	4.1	.	18.3	59.5
4	24/27	4	100.0	.	100.0	12.8	12.8	.	.	12.8	.	83.5	72.3
4	28/29	2	87.2	1.0	88.2	5.5	5.5	.	.	5.5	.	83.5	77.8
4/5	30(4)/ 2(5)	3	82.7	.	82.7	9.7	9.7	.	.	9.7	.	83.5	87.5
5	3/ 5	3	73.0	18.3	91.3	6.6	6.6	.	.	6.6	.	83.5	94.1
5	6/ 8	3	84.7	.	84.7	9.7	9.7	.	.	9.7	.	83.5	103.8
5	9/12	4	75.0	.	75.0	15.0	.	0.973	1.6	16.6	.	83.5	120.4
5	13/14	2	58.4	.	58.4	5.6	.	0.909	5.3	5.3	0.3	83.5	125.8
5	15/17	3	53.0	.	53.0	14.8	.	0.773	12.0	12.0	2.8	83.5	137.8
5	18/22	5	41.0	2.3	43.3	16.6	.	0.752	10.7	10.7	5.9	83.5	148.5
5	23/27	5	32.6	12.0	44.6	8.5	.	0.866	6.0	6.0	2.5	83.5	154.5
5	28/31	4	38.6	3.2	41.8	16.4	.	0.753	10.3	10.3	6.1	83.5	164.8
6	1/ 7	7	31.5	27.6	59.1	26.3	.	0.636	21.5	21.5	4.8	83.5	186.3
6	8/11	4	37.6	.	37.6	17.8	.	0.735	10.0	10.0	7.8	83.5	196.3
6	12/14	3	27.6	8.7	36.3	10.0	.	0.842	5.7	5.7	4.3	83.5	202.0
6	15/17	3	30.6	0.2	30.8	11.0	.	0.828	5.3	5.3	5.7	83.5	207.3
6	18/20	3	25.5	.	25.5	9.8	.	0.845	3.9	3.9	5.9	83.5	211.3
6	21/25	5	21.5	.	21.5	23.2	.	0.669	7.1	7.1	16.1	83.5	218.4
6	26/27	2	14.4	.	14.4	8.0	.	0.871	1.9	1.9	6.1	83.5	220.2

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f(RFU)	K	f(Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
6	28/30	3	12.6	.	12.6	15.0	.	0.770	2.9	2.9	12.1	80.3	83.5
7	1/ 8	8	9.7	.	9.7	38.7	.	0.510	4.7	4.7	34.0	114.2	83.5
7	9/12	4	4.9	14.5	19.4	12.0	.	0.815	3.6	3.6	8.4	122.6	83.5
7	13/17	5	15.8	.	15.8	25.0	.	0.647	5.6	5.6	19.4	142.0	83.5
7	28/21	4	10.2	2.8	13.0	20.4	.	0.701	3.9	3.9	16.5	158.5	83.5
7	22/26	5	9.1	.	9.1	25.9	.	0.637	3.3	3.3	22.6	181.1	83.5
7	27/31	5	5.8	.	5.8	24.5	.	0.653	2.0	2.0	22.5	203.6	83.5
8	1/ 3	3	3.8	.	3.8	11.4	.	0.822	0.7	0.7	10.7	214.3	83.5
8	4/ 6	3	3.1	0.2	3.3	15.7	.	0.760	0.8	0.8	14.9	229.2	83.5
8	7/ 8	2	2.5	1.8	4.3	7.0	.	0.887	0.5	0.5	6.5	235.7	83.5
8	9/10	2	3.8	2.0	5.8	5.1	.	0.917	0.5	0.5	4.6	240.4	83.5
8	11/15	5	5.4	.	5.4	14.9	.	0.775	1.2	1.2	13.7	254.0	83.5
8	16/19	4	4.1	10.9	15.0	18.8	.	0.722	4.2	4.2	14.6	268.7	83.5
8	20/22	3	10.9	4.6	15.5	6.6	.	0.894	1.6	1.6	5.0	273.6	83.5
8	23/27	5	13.8	.	13.8	23.7	.	0.663	4.7	4.7	19.0	292.7	83.5
8	28/29	2	9.2	.	9.2	7.3	.	0.882	1.1	1.1	6.2	298.9	83.5
8	30/31	2	8.1	.	8.1	10.1	.	0.839	1.3	1.3	8.8	307.7	83.5
9	1/ 2	2	6.8	3.0	9.8	8.8	.	0.859	1.4	1.4	7.4	315.1	83.5
9	3/ 6	4	8.4	14.5	22.9	8.1	.	0.872	2.9	2.9	5.2	320.3	83.5
9	7/10	4	20.0	.	20.0	9.2	.	0.855	2.9	2.9	6.3	326.6	83.5
9	11/14	4	17.1	0.2	17.3	13.7	.	0.790	3.6	3.6	10.1	336.6	83.5
9	15/20	6	13.7	37.5	51.2	12.3	.	0.812	9.6	9.6	2.7	339.3	83.5
9	21/25	5	41.5	2.3	43.8	12.6	.	0.807	8.5	8.5	4.1	343.5	83.5
9	26/27	2	35.4	9.2	44.6	3.5	.	0.943	2.6	2.6	0.9	344.4	83.5
9	28/29	2	42.0	.	42.0	3.9	.	0.936	2.7	2.7	1.2	345.6	83.5
9/10	30(9)/ 6(10)	7	39.3	.	39.3	9.8	.	0.848	6.0	6.0	3.8	349.4	83.5
10	7/11	5	33.3	21.8	55.1	6.7	.	0.893	5.9	5.9	0.8	350.2	83.5
10	12/14	3	49.2	8.1	57.3	2.4	.	0.961	2.3	2.3	0.1	350.4	83.5
10	15/16	2	55.1	.	55.1	3.6	.	0.941	3.3	3.3	0.3	350.7	83.5
10	17/18	2	51.8	.	51.8	1.6	.	0.974	1.4	1.4	0.2	350.9	83.5
10	19/22	4	50.4	.	50.4	2.5	.	0.959	2.1	2.1	0.4	351.4	83.5
10	23/25	3	48.4	5.8	54.2	2.1	.	0.965	1.9	1.9	0.2	351.6	83.5
10/11	26(10)/ 2(11)	8	52.3	.	52.3	7.2	.	0.886	6.0	6.0	1.2	352.8	83.5
11	3/ 5	3	46.3	6.8	53.1	2.0	.	0.967	1.8	1.8	0.2	353.0	83.5
11	6/10	5	51.4	1.0	52.4	2.5	.	0.959	2.1	2.1	0.4	353.4	83.5
11	11/18	8	50.2	5.4	55.6	6.7	.	0.894	5.9	5.9	0.8	354.2	83.5

TABLEAU

47 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

albedo = 25
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 40mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
3	22/25	4	100.0	50.9	150.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	45.4	5.5
3/4	26(3)/ 1(4)	7	100.0	0.9	100.9	9.6	9.6	.	.	9.6	.	45.4	15.1
4	2/ 6	5	91.3	13.1	104.4	8.4	8.4	.	.	8.4	.	45.4	23.5
4	7/12	6	96.0	1.7	97.7	15.5	15.5	.	.	15.5	.	45.4	39.0
4	13/14	2	82.2	1.5	83.7	4.8	4.8	.	.	4.8	.	45.4	43.8
4	15/16	2	76.9	0.1	79.0	6.6	6.6	.	.	6.6	.	45.4	50.4
4	17/19	3	72.4	28.3	100.7	5.2	5.2	.	.	5.2	.	45.4	55.6
4	20/21	2	95.5	3.2	98.7	5.9	5.9	.	.	5.9	.	45.4	61.5
4	22/23	2	92.5	7.5	100.3	4.5	4.5	.	.	4.5	.	45.4	66.0
4	24/27	4	95.8	.	95.8	13.2	13.2	.	.	13.2	.	45.4	79.2
4	28/29	2	82.6	.	82.6	6.5	6.5	.	.	6.5	.	45.4	85.7
4/5	30(4)/ 2(5)	3	76.1	.	76.1	9.6	9.6	.	.	9.6	.	45.4	95.3
5	3/ 5	3	66.5	7.3	73.8	12.1	12.1	.	.	12.1	.	45.4	107.4
5	6/ 8	3	61.7	0.1	61.8	13.8	1.8	0.812	11.3	13.1	0.7	45.4	120.5
5	9/12	4	48.7	.	48.7	22.1	.	0.679	15.6	15.6	6.5	45.4	136.1
5	13/14	2	33.1	9.4	42.5	6.2	.	0.899	4.3	4.3	1.9	45.4	140.4
5	15/17	3	38.2	.	38.2	16.2	.	0.754	9.4	9.4	6.8	45.4	149.8
5	18/22	5	28.8	3.0	31.8	18.3	.	0.730	8.6	8.6	9.7	45.4	158.4
5	23/27	5	23.2	16.1	39.3	12.5	.	0.808	7.5	7.5	5.0	45.4	165.9
5	28/31	4	31.8	0.9	32.7	15.5	.	0.766	7.7	7.7	7.8	45.4	173.6
6	1/ 7	7	25.0	16.7	41.7	29.5	.	0.601	16.7	16.7	12.8	45.4	190.2
6	8/11	4	25.1	0.1	25.2	21.7	.	0.684	7.9	7.9	13.8	45.4	198.2
6	12/14	3	17.2	9.4	26.6	13.7	.	0.789	5.6	5.6	8.1	45.4	203.8
6	15/17	3	21.0	0.2	21.2	12.0	.	0.813	4.0	4.0	8.0	45.4	207.8
6	18/20	3	17.2	.	17.2	12.6	.	0.804	3.4	3.4	9.2	45.4	211.1
6	21/25	5	13.9	.	13.9	24.3	.	0.656	4.8	4.8	19.5	45.4	215.9
6	26/27	2	9.1	5.5	14.6	7.1	.	0.885	1.7	1.7	5.4	45.4	217.6

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
6	28/30	3	12.9	0.6	13.5	14.0	.	0.784	2.9	2.9	11.1	126.4	220.5
7	1/ 8	8	10.6	.	10.6	41.1	.	0.489	5.4	5.4	35.7	162.1	225.9
7	9/12	4	5.2	8.1	13.3	12.1	.	0.813	2.5	2.5	9.6	171.7	228.4
7	13/17	5	10.8	.	10.8	26.8	.	0.626	4.0	4.0	22.8	194.5	232.4
7	18/21	4	6.8	2.1	8.9	23.5	.	0.662	3.0	3.0	20.5	215.0	235.4
7	22/26	5	5.9	.	5.9	27.1	.	0.623	2.2	2.2	24.9	239.9	237.6
7	27/31	5	3.7	.	3.7	25.2	.	0.645	1.3	1.3	23.9	263.8	238.9
8	1/ 3	3	2.4	0.1	2.5	11.4	.	0.822	0.4	0.4	11.0	274.7	239.4
8	4/ 6	3	2.0	2.6	4.6	16.7	.	0.747	1.2	1.2	15.5	290.2	240.6
8	7/ 8	2	3.4	4.6	8.0	7.0	.	0.887	0.9	0.9	6.1	296.3	241.5
8	9/10	2	7.1	25.1	32.2	4.2	.	0.931	2.2	2.2	2.0	298.3	243.7
8	11/15	5	30.0	1.1	31.1	13.8	.	0.790	6.5	6.5	7.3	305.6	250.2
8	16/19	4	24.6	3.5	28.1	20.2	.	0.704	8.3	8.3	11.9	317.5	258.5
8	20/22	3	19.8	2.9	22.7	8.4	.	0.866	3.0	3.0	5.4	322.7	261.6
8	23/27	5	19.6	.	19.6	21.4	.	0.691	6.1	6.1	15.3	338.2	267.6
8	28/29	2	13.6	0.1	13.7	7.2	.	0.884	1.6	1.6	5.6	343.8	269.2
8	30/31	2	12.1	.	12.1	10.2	.	0.837	2.0	2.0	8.2	352.0	271.2
9	1/ 2	2	10.1	.	10.1	9.3	.	0.851	1.5	1.5	7.8	359.8	272.7
9	3/ 6	4	8.6	38.4	47.0	9.3	.	0.854	6.9	6.9	2.4	362.2	279.6
9	7/10	4	40.1	0.1	40.2	9.5	.	0.851	6.0	6.0	3.5	365.7	285.6
9	11/14	4	34.2	1.4	35.6	13.7	.	0.790	7.5	7.5	6.2	372.0	293.0
9	15/20	6	28.2	56.5	84.7	13.9	13.9	.	.	13.9	.	372.0	306.9
9	21/25	5	70.8	.	70.8	13.0	10.8	0.963	2.2	13.0	.	372.0	319.9
9	26/27	2	57.8	17.4	75.2	2.7	2.7	.	.	2.7	.	372.0	322.6
9	28/29	2	72.5	.	72.5	4.4	4.4	.	.	4.4	.	372.0	327.0
9/10	30(9)/ 6(10)	7	68.1	0.3	68.4	10.3	8.4	0.969	1.9	10.3	.	372.0	337.3
10	7/11	5	58.1	34.0	92.1	9.6	9.6	.	.	9.6	.	372.0	346.9
10	12/14	3	82.5	5.6	88.1	2.2	2.2	.	.	2.2	.	372.0	349.1
10	15/16	2	85.9	5.4	91.3	3.7	3.7	.	.	3.7	.	372.0	352.8
10	17/18	2	87.6	0.8	88.4	1.7	1.7	.	.	1.7	.	372.0	354.5
10	19/22	4	86.7	.	86.7	2.1	2.1	.	.	2.1	.	372.0	356.6
10	23/25	3	84.6	3.4	88.0	1.9	1.9	.	.	1.9	.	372.0	358.5
10/11	26(10)/ 2(11)	8	86.1	0.5	86.6	5.8	5.8	.	.	5.8	.	372.0	364.3
11	3/ 5	3	80.8	2.3	83.1	1.8	1.8	.	.	1.8	.	372.0	366.1
11	6/10	5	81.3	0.6	81.9	2.3	2.3	.	.	2.3	.	372.0	368.4
11	11/18	8	79.6	7.1	86.7	6.3	6.3	.	.	6.3	.	372.0	374.6

N E V E R S - 1 9 6 4

- 138 -

Analyse par séquences de temps

albedo = 25
 Réserve utile = 100mm
 Réserve facilement utilisable = 40mm

Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
3	22/25	4	100.0	31.0	131.0	4.7	4.7	.	.	4.7	.	26.3	4.7
3/4	26(3)/ 1(4)	7	100.0	5.2	105.2	6.9	6.9	.	.	6.9	.	26.3	11.6
4	2/ 6	5	98.3	16.3	114.6	6.5	6.5	.	.	6.5	.	8.1	18.1
4	7/12	6	100.0	2.7	102.7	12.5	12.5	.	.	12.5	.	.	30.6
4	13/14	2	90.2	2.3	92.5	4.1	4.1	.	.	4.1	.	.	34.7
4	15/16	2	88.4	0.3	88.7	5.1	5.1	.	.	5.1	.	.	39.8
4	17/19	3	83.6	32.9	116.5	4.8	4.8	.	.	4.8	.	11.7	44.6
4	20/21	2	100.0	4.8	104.8	4.4	4.4	.	.	4.4	.	0.4	49.0
4	22/23	2	100.0	8.6	108.6	3.0	3.0	.	.	3.0	.	5.6	52.0
4	24/27	4	100.0	.	100.0	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	63.0
4	28/29	2	89.0	0.1	89.1	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	68.6
4/5	30(4)/ 2(5)	3	83.5	.	83.5	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	76.6
5	3/ 5	3	75.5	15.9	91.4	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	82.8
5	6/ 8	3	85.2	0.3	85.5	8.8	8.8	.	.	8.8	.	.	91.6
5	9/12	4	76.7	.	76.7	14.1	14.1	.	.	14.1	.	.	105.7
5	13/14	2	62.6	0.5	63.1	4.7	3.1	0.973	1.6	4.7	.	.	110.4
5	15/17	3	58.4	.	58.4	12.6	.	0.804	11.4	11.4	1.2	.	121.8
5	18/22	5	47.0	3.4	50.4	16.4	.	0.755	12.3	2.3	4.1	.	134.2
5	23/27	5	38.0	41.8	79.8	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	146.1
5	28/31	4	67.9	.	67.9	15.1	7.9	0.884	7.0	14.9	0.2	.	161.0
6	1/ 7	7	53.0	15.3	68.3	25.4	8.3	0.746	15.3	23.6	1.8	.	184.6
6	8/11	4	44.7	.	44.7	16.9	.	0.747	11.3	11.3	5.6	.	195.9
6	12/14	3	33.4	36.5	69.9	12.5	9.9	0.956	2.6	12.5	.	.	208.4
6	15/17	3	57.4	.	57.4	11.3	.	0.823	10.1	10.1	1.2	.	218.6
6	18/20	3	47.2	2.3	49.5	11.3	.	0.823	8.8	8.8	2.5	.	227.3
6	21/25	5	40.8	.	40.8	16.6	.	0.752	10.1	10.1	6.5	.	237.4
6	26/27	2	30.7	.	30.7	7.1	.	0.885	3.5	3.5	3.6	.	240.9

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE	CUMUL
											partiel cumulé	partiel cumulé		
6	28/30	3	27.2	0.2	27.4	12.1	.	0.812	5.2	5.2	6.9	33.5	52.1	246.1
7	1/ 8	8	22.2	.	22.2	37.8	.	0.519	10.7	10.7	27.1	60.6	52.1	256.8
7	9/12	4	11.5	11.1	22.6	10.9	.	0.830	3.8	3.8	7.1	67.7	52.1	260.6
7	13/17	5	18.8	.	18.8	24.3	.	0.656	6.5	6.5	17.8	85.5	52.1	267.1
7	18/21	4	12.3	13.6	25.9	17.0	.	0.745	6.6	6.6	10.4	95.9	52.1	273.7
7	22/26	5	19.3	.	19.3	26.3	.	0.632	7.1	7.1	19.2	115.1	52.1	280.8
7	27/31	5	12.2	.	12.2	21.5	.	0.689	3.8	3.8	17.7	132.8	52.1	284.6
8	1/ 3	3	8.4	.	8.4	10.1	.	0.841	1.3	1.3	8.8	141.6	52.1	285.9
8	4/ 6	3	7.1	5.1	12.2	12.8	.	0.801	2.4	2.4	10.4	152.0	52.1	288.3
8	7/ 8	2	9.8	10.2	20.0	5.7	.	0.907	1.9	1.9	3.8	155.8	52.1	290.2
8	9/10	2	18.1	30.3	48.4	4.2	.	0.931	3.3	3.3	0.9	156.7	52.1	293.5
8	11/15	5	45.1	7.9	53.0	11.7	.	0.820	9.6	9.6	2.1	158.8	52.1	303.1
8	16/19	4	43.4	14.9	58.3	15.3	.	0.768	13.5	13.5	1.8	160.6	52.1	316.6
8	20/22	3	44.8	0.1	44.9	6.7	.	0.892	4.8	4.8	1.9	162.5	52.1	321.4
8	23/27	5	40.1	.	40.1	18.3	.	0.730	10.8	10.8	7.5	170.0	52.1	332.2
8	28/29	2	29.3	0.6	29.9	6.0	.	0.903	2.9	2.9	3.1	173.0	52.1	335.1
8	30/31	2	26.9	.	26.9	7.5	.	0.879	3.3	3.3	4.2	177.3	52.1	338.4
9	1/ 2	2	23.7	0.2	23.9	6.2	.	0.899	2.4	2.4	3.8	181.1	52.1	340.8
9	3/ 6	4	21.5	13.1	34.6	9.7	.	0.848	5.3	5.3	4.4	185.5	52.1	346.1
9	7/10	4	29.3	.	29.3	8.2	.	0.870	3.8	3.8	4.4	189.9	52.1	349.9
9	11/14	4	25.5	1.3	26.8	13.1	.	0.799	5.4	5.4	7.7	197.6	52.1	355.3
9	15/20	6	21.4	51.5	72.9	12.5	12.5	.	.	12.5	.	197.6	52.1	367.8
9	21/25	5	60.4	.	60.4	9.7	0.4	0.854	8.8	9.2	0.5	198.1	52.1	377.0
9	26/27	2	51.2	14.8	66.0	2.0	2.0	.	.	2.0	.	198.1	52.1	379.0
9	28/29	2	64.0	.	64.0	3.2	3.2	.	.	3.2	.	198.1	52.1	382.2
9/10	30(9)/ 6(10)	7	60.8	8.7	69.5	9.0	9.0	.	.	9.0	.	198.1	52.1	391.2
10	7/11	5	60.5	25.4	85.9	7.9	7.9	.	.	7.9	.	198.1	52.1	399.1
10	12/14	3	78.0	7.9	85.9	2.5	2.5	.	.	2.5	.	198.1	52.1	401.6
10	15/16	2	83.4	5.9	89.3	3.0	3.0	.	.	3.0	.	198.1	52.1	404.6
10	17/18	2	86.3	1.6	87.9	1.2	1.2	.	.	1.2	.	198.1	52.1	405.8
10	19/22	4	86.7	.	86.7	1.7	1.7	.	.	1.7	.	198.1	52.1	407.5
10	23/25	3	85.0	7.5	92.5	1.2	1.2	.	.	1.2	.	198.1	52.1	408.7
10/11	26(10)/ 2(11)	8	91.3	.	91.3	4.3	4.3	.	.	4.3	.	198.1	52.1	413.0
11	3/ 5	3	87.0	2.0	89.0	1.2	1.2	.	.	1.2	.	198.1	52.1	414.2
11	6/10	5	87.8	0.5	88.3	1.0	1.0	.	.	1.0	.	198.1	52.1	415.2
11	11/18	8	87.3	12.4	99.7	4.2	4.2	.	.	4.2	.	198.1	52.1	419.4





Fig. 103-104: a - Courbes de cumulation de l'ETP à Châteauroux, Bourges, Nevers, pour $\alpha=25\%$, et courbes de cumulation de l'ETR pour un modèle de sol de $RU=100\text{mm}$ et de $RFU=40\text{mm}$.
b - Evolution de la réserve d'eau du sol.






Fig. 105




Fig. 106

Fig. 105 à 110 - Bilan de l'eau des formations herbacées en Berry et en Nivernais.-Analyse par séquences de temps en 1963 et 1964,pour:

albedo = 25 %;

réserve utile du sol = 100 mm;

réserve facilement utilisable = 40 mm.

Lorsque,après épuisement de la réserve facilement utilisable,l'évapotranspiration réelle cesse d'être égale à l'évapotranspiration potentielle,l'espace intercalaire entre les deux courbes représentatives (en noir) indique la durée et l'intensité de la sécheresse.




Fig. 107





Fig. 108



Fig; 109




Fig. 110

TABEAU 49 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1963

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	100.0	18.4	118.4	30.8	30.8	.	.	30.8	.	.	30.8
4	23/24	2	87.6	5.3	92.9	5.1	5.1	.	.	5.1	.	.	35.9
4	25/27	3	87.8	.	87.8	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	42.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	81.6	9.7	91.3	16.0	16.0	.	.	16.0	.	.	58.1
5	3/ 6	4	75.3	0.3	75.6	13.2	13.2	.	.	13.2	.	.	71.3
5	7/ 8	2	62.4	3.3	65.7	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	81.1
5	9/10	2	55.9	7.1	63.0	6.9	6.9	.	.	6.9	.	.	88.0
5	11/12	2	56.1	.	56.1	7.4	7.4	0.973	1.3	7.4	.	.	95.4
5	13/14	2	48.7	10.1	58.8	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	102.1
5	15/17	3	52.1	0.2	52.3	12.3	2.3	0.811	9.4	11.7	0.6	.	113.8
5	18/19	2	40.6	.	40.6	7.0	.	0.865	5.5	5.5	1.5	.	119.3
5	20/23	4	35.1	20.3	55.4	11.7	5.4	0.878	6.1	11.5	0.2	.	130.8
5	24/25	2	43.9	2.5	46.4	8.3	.	0.841	7.4	7.4	0.9	.	138.2
5	26/29	4	39.0	4.1	43.1	13.2	.	0.761	10.3	10.3	2.9	.	148.5
5	30/31	2	32.8	.	32.8	7.6	.	0.854	4.8	4.8	2.8	.	153.3
6	1/ 7	7	28.0	28.5	56.5	26.7	6.5	0.657	17.1	23.7	3.0	.	176.9
6	8/ 9	2	32.9	.	32.9	7.6	.	0.854	4.8	4.8	2.8	.	181.8
6	10/15	6	28.0	19.3	47.3	20.8	.	0.650	16.6	16.6	4.2	.	198.3
6	16/17	2	30.8	.	30.8	9.3	.	0.823	5.5	5.5	3.8	.	203.8
6	18/23	6	25.3	1.9	27.2	25.4	.	0.588	11.2	11.2	14.2	.	215.0
6	24/25	2	16.0	1.0	17.0	7.8	.	0.850	2.5	2.5	5.3	.	217.5
6	26/28	3	14.5	46.7	61.2	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	228.2
6/7	29(6)/ 1(7)	3	50.5	.	50.5	11.0	0.5	0.803	9.8	10.3	0.7	.	238.5
7	2/ 5	4	40.2	1.5	41.7	16.6	.	0.707	12.2	12.2	4.4	.	250.7
7	6/12	7	29.5	14.7	44.2	28.6	.	0.551	19.8	19.8	8.8	.	270.6

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	13	1	24.3	2.5	26.8	2.3	.	0.954	1.2	1.2	1.1	57.2	271.8
7	14/21	8	25.6	.	25.6	40.5	.	0.426	14.7	14.7	25.8	83.0	286.5
7	22/25	4	10.9	52.4	63.3	19.5	13.3	0.878	6.1	19.4	0.1	83.1	305.9
7	26/31	6	43.9	.	43.9	39.0	.	0.434	24.8	24.8	14.2	97.2	330.8
8	1/7	7	19.0	66.4	85.4	22.4	22.4	.	.	22.4	.	97.2	353.2
8	8/10	3	63.0	2.8	65.8	7.7	7.7	.	.	7.7	.	97.2	360.9
8	11/15	5	58.1	2.5	60.6	17.3	10.6	0.871	6.5	17.1	0.2	97.4	378.0
8	16/21	6	43.5	23.0	66.5	22.9	16.5	0.876	6.2	22.7	0.2	97.6	400.7
8	22/24	3	43.8	6.5	50.3	9.3	0.3	0.830	8.5	8.8	0.5	98.1	409.5
8	25/28	4	41.5	7.6	49.1	14.3	.	0.743	12.6	12.6	1.7	99.8	422.1
8/9	29(8)/ 3(9)	6	36.5	6.3	42.8	16.1	.	0.718	12.1	12.1	4.0	103.8	434.2
9	4/6	3	30.7	4.3	35.0	5.4	.	0.896	3.7	3.7	1.7	105.6	437.8
9	7/12	6	31.4	2.3	33.7	12.7	.	0.771	7.7	7.7	5.0	110.6	445.5
9	13/15	3	26.0	.	26.0	4.4	.	0.915	2.2	2.2	2.2	112.8	447.7
9	16/22	7	23.8	1.8	25.6	15.9	.	0.722	7.1	7.1	8.8	121.6	454.8
9	23	1	18.5	19.5	38.0	1.0	.	0.980	0.8	0.8	0.2	121.8	455.6
9	24/27	4	37.2	11.3	48.5	6.5	.	0.871	6.3	6.3	0.5	122.3	461.9
9	28/29	2	42.2	.	42.2	3.7	.	0.927	3.1	3.1	0.6	123.0	464.9
9/10	30(9)/ 7(10)	8	39.2	29.7	68.9	9.2	9.2	.	.	9.2	.	123.0	474.1
10	8	1	59.7	.	59.7	1.3	1.3	.	.	1.3	.	123.0	475.4
10	9/10	2	58.4	.	58.4	2.4	2.4	.	.	2.4	.	123.0	477.8
10	11/12	2	56.0	.	56.0	3.7	3.7	.	.	3.7	.	123.0	481.5
10	13/14	2	52.3	.	52.3	2.8	2.3	0.989	0.5	2.8	.	123.0	484.3
10	15/16	2	49.5	.	49.5	2.5	.	0.951	2.4	2.4	0.1	123.1	486.8
10	17	1	47.0	1.3	48.3	1.0	.	0.980	1.0	1.0	.	123.1	487.7
10	18/19	2	47.4	.	47.4	2.3	.	0.955	2.2	2.2	0.1	123.2	489.9
10	20/21	2	45.2	.	45.2	2.5	.	0.951	2.2	2.2	0.3	123.5	492.1
10	22/23	2	43.0	.	43.0	2.7	.	0.947	2.3	2.3	0.4	123.9	494.4
10	24/26	3	40.7	.	40.7	2.6	.	0.949	2.1	2.1	0.5	124.4	496.5
10	27/29	3	38.6	.	38.6	1.5	.	0.970	1.1	1.1	0.4	124.8	497.6
10/11	30(10)/ 6(11)	8	37.5	28.9	66.4	6.8	6.8	.	.	6.8	.	124.8	504.4
11	7/8	2	59.6	2.5	62.1	2.1	2.1	.	.	2.1	.	124.8	506/5
11	9/12	4	60.0	30.8	90.8	5.8	5.8	.	.	5.8	.	124.8	512.3
11	13/14	2	85.0	17.2	102.2	0.8	0.8	.	.	0.8	.	124.8	513.1
11	15/21	7	100.0	63.6	163.6	5.6	5.6	.	.	5.6	.	124.8	518.7
												1.4	1.4
												58.0	59.4

TABLEAU 50 ; APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 3

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	100.0	11.0	111.0	29.4	29.4	.	.	29.4	.	.	29.4
4	23/24	2	81.6	9.6	91.2	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	34.3
4	25/27	3	86.3	.	86.3	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	39.5
4/5	28(4)/ 2(5)	5	81.1	8.9	90.0	16.0	16.0	.	.	16.0	.	.	55.5
5	3/ 6	4	74.0	0.9	74.9	12.4	12.4	.	.	12.4	.	.	67.9
5	7/ 8	2	62.5	2.5	65.0	9.7	9.7	.	.	9.7	.	.	77.6
5	9/10	2	55.3	4.9	60.2	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	83.8
5	11/12	2	54.0	.	54.0	8.2	4.0	0.916	4.2	8.2	.	.	92.0
5	13/14	2	45.8	11.2	57.0	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	98.2
5	15/17	3	50.3	0.3	51.1	10.8	1.1	0.818	9.1	10.2	0.6	.	108.4
5	18/19	2	40.9	.	40.9	6.5	.	0.874	5.1	5.1	1.4	.	113.6
5	20/23	4	35.7	27.8	63.5	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	124.3
5	24/25	2	52.8	.	52.8	8.5	2.8	0.888	5.6	8.4	0.1	.	132.7
5	26/29	4	44.4	29.0	73.4	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	146.1
5	30/31	2	60.0	.	60.0	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	154.1
6	1/ 7	7	52.0	5.8	57.8	31.5	7.8	0.609	19.6	27.4	4.1	6.1	181.5
6	8/ 9	2	30.4	.	30.4	7.6	.	0.854	4.5	4.5	3.1	9.3	185.9
6	10/15	6	26.0	9.1	35.1	18.0	.	0.690	10.9	10.9	7.1	16.4	196.8
6	16/17	2	24.2	.	24.2	9.8	.	0.814	4.5	4.5	5.3	21.7	201.3
6	18/23	6	19.7	4.9	24.6	27.1	.	0.567	10.7	10.7	16.4	38.1	212.0
6	24/25	2	13.9	10.2	24.1	9.5	.	0.819	4.4	4.4	5.1	43.3	216.3
6	26/28	3	19.8	24.6	44.4	11.9	.	0.780	9.7	9.7	2.2	45.4	226.1
6	26(9)/ 1(7)	3	34.6	1.9	36.5	12.9	.	0.764	8.6	8.6	4.3	49.7	234.7
7	2/ 5	4	27.9	26.5	54.4	17.0	4.4	0.768	11.6	16.0	1.0	50.7	250.7
7	6/12	7	38.4	5.6	44.0	30.4	.	0.529	20.7	20.7	9.7	60.4	271.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	13	1	23.3	3.6	26.9	2.7	.	0.946	1.5	1.5	1.2	61.6	272.9
7	14/21	8	25.4	.	25.4	39.6	.	0.434	14.4	14.4	25.2	86.9	287.2
7	22/25	4	11.1	8.9	20.0	21.2	.	0.639	7.2	7.2	14.0	100.8	294.5
7	26/31	6	12.7	.	12.7	37.4	.	0.450	7.0	7.0	30.4	131.2	301.5
8	1/ 7	7	5.7	80.5	86.2	21.1	21.1	.	.	21.1	.	131.2	322.6
8	8/10	3	65.1	2.9	68.0	7.6	7.6	.	.	7.6	.	131.2	330.2
8	11/15	5	60.4	9.6	70.0	16.7	16.7	.	.	16.7	.	131.2	346.9
8	16/21	6	53.3	24.2	77.5	22.5	22.5	.	.	22.5	.	131.2	369.4
8	22/24	3	55.0	6.8	61.8	8.6	8.6	.	.	8.6	.	131.2	378.0
8	25/28	4	53.2	1.8	55.0	14.2	5.0	0.827	8.7	13.7	0.5	131.7	391.7
8/9	29(8)/ 3(9)	6	41.3	4.1	45.4	18.9	.	0.677	14.7	14.7	4.2	136.0	406.3
9	4/ 6	3	30.8	4.6	35.4	4.9	.	0.905	3.4	3.4	1.5	137.5	409.7
9	7/12	6	32.0	1.7	33.7	11.9	.	0.784	7.3	7.3	4.6	142.1	417.0
9	13/15	3	26.4	.	26.4	4.4	.	0.915	2.3	2.3	2.1	144.3	419.3
9	16/22	7	24.2	.	24.2	15.7	.	0.725	6.6	6.6	9.1	153.3	425.9
9	23	1	17.5	.	17.5	1.2	.	0.976	0.4	0.4	0.8	154.1	426.3
9	24/27	4	17.1	8.0	25.1	7.6	.	0.856	3.6	3.6	4.0	158.1	429.9
9	28/29	2	21.5	.	21.5	3.7	.	0.927	1.6	1.6	2.1	160.2	431.5
9/10	30(9)/ 7(10)	8	19.9	18.0	37.9	9.7	.	0.822	6.8	6.8	2.9	163.2	438.2
10	8	1	31.2	.	31.2	0.8	.	0.984	0.5	0.5	0.3	163.5	438.7
10	9/10	2	30.7	.	30.7	2.7	.	0.947	1.6	1.6	1.1	164.5	440.4
10	11/12	2	29.0	.	29.0	3.0	.	0.941	1.7	1.7	1.3	165.8	442.1
10	13/14	2	27.3	.	27.3	2.7	.	0.947	1.5	1.5	1.2	167.1	443.5
10	15/16	2	25.9	.	25.9	2.7	.	0.947	1.4	1.4	1.3	168.4	444.9
10	17	1	24.5	0.5	25.0	1.2	.	0.976	0.6	0.6	0.6	169.0	445.5
10	18/19	2	24.4	.	24.4	2.5	.	0.951	1.2	1.2	1.3	170.3	446.7
10	20/21	2	23.2	.	23.2	2.7	.	0.947	1.2	1.2	1.5	171.8	447.9
10	22/23	2	22.0	.	22.0	2.4	.	0.953	1.0	1.0	1.4	173.2	449.0
10	24/26	3	20.9	.	20.9	3.3	.	0.935	1.4	1.4	1.9	175.1	450.3
10	27/29	3	19.6	.	19.6	1.3	.	0.974	0.5	0.5	0.8	175.9	450.8
10/11	30(10)/ 6(11)	8	19.1	56.1	75.2	7.6	7.6	.	.	7.6	.	175.9	458.4
11	7/ 8	2	67.6	0.6	68.2	2.7	2.7	.	.	2.7	.	175.9	461.1
11	9/12	4	65.5	13.8	79.3	5.3	5.4	.	.	5.4	.	175.9	466.5
11	13/14	2	73.9	17.9	91.8	1.4	1.4	.	.	1.4	.	175.9	467.9
11	15/21	7	90.4	10.4	100.8	5.3	5.3	.	.	5.3	.	175.9	473.2

TABEAU 51 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

NEVERS - 1963

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman
albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	100.0	18.1	118.1	25.2	25.2	.	.	25.2	.	.	25.2
4	23/24	2	92.9	4.3	97.2	4.4	4.4	.	.	4.4	.	.	29.6
4	25/27	3	92.8	.	92.8	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	35.7
4/5	28(4)/ 2(5)	5	86.7	6.8	93.5	14.5	14.5	.	.	14.5	.	.	50.2
5	3/ 6	4	79.0	0.5	79.5	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	61.2
5	7/ 8	2	68.5	6.7	75.2	8.7	8.7	.	.	8.7	.	.	69.9
5	9/10	2	66.5	3.1	69.6	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	75.5
5	11/12	2	64.0	.	64.0	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	82.9
5	13/14	2	56.6	13.6	70.2	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	88.2
5	15/17	3	64.9	0.3	65.2	8.9	8.9	.	.	8.9	.	.	97.1
5	18/19	2	56.3	.	56.3	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	103.1
5	20/23	4	50.3	30.4	80.7	12.0	12.0	.	.	12.0	.	.	115.1
5	24/25	2	68.7	.	68.7	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	123.0
5	26/29	4	60.8	35.0	95.8	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	136.4
5	30/31	2	82.4	.	82.4	9.0	9.0	.	.	9.0	.	.	145.4
6	1/ 7	7	73.4	19.3	92.7	28.0	28.0	.	.	28.0	.	.	173.4
6	8/ 9	2	64.7	.	64.7	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	179.8
6	10/15	6	58.3	29.4	87.7	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	195.4
6	16/17	2	72.1	.	72.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	203.0
6	18/23	6	64.5	2.9	67.4	23.9	17.4	0.873	6.3	23.7	0.2	.	226.7
6	24/25	2	43.7	15.0	58.7	8.2	8.2	.	.	8.2	.	.	234.9
6	26/28	3	50.5	27.7	78.2	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	246.3
6/7	29(6)/ 1(7)	3	66.8	17.6	84.4	11.6	11.6	.	.	11.6	.	.	257.9
7	2/ 5	4	72.8	3.2	76.0	15.8	15.8	.	.	15.8	.	.	273.7
7	6/12	7	60.2	17.8	78.0	30.2	28.0	0.954	2.3	30.2	.	.	304.0

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	13	1	47.7	5.3	53.0	3.0	3.0	.	.	3.0	.	.	307.0
7	14/21	8	50.0	.	50.0	40.6	.	0.425	28.8	28.8	11.8	12.0	335.8
7	22/25	4	21.2	0.9	22.1	18.3	.	0.681	7.1	7.1	11.2	23.2	342.8
7	26/31	6	15.1	.	15.1	29.7	.	0.535	7.0	7.0	22.7	45.9	349.8
8	1/ 7	7	8.1	92.8	100.9	21.6	21.6	.	.	21.6	.	45.9	371.4
8	8/10	3	79.3	4.5	83.8	6.9	6.9	.	.	6.9	.	45.9	378.3
8	11/15	5	76.9	6.1	83.0	14.3	14.3	.	.	14.3	.	45.9	392.6
8	16/21	6	68.7	29.0	97.7	18.6	18.6	.	.	18.6	.	45.9	411.2
8	22/24	3	79.1	9.8	88.9	8.7	8.7	.	.	8.7	.	45.9	419.9
8	25/28	4	80.2	2.8	83.0	11.9	11.9	.	.	11.9	.	45.9	431.8
8/9	29(8)/ 3(9)	6	71.1	4.6	75.7	18.3	18.3	.	.	18.3	.	45.9	450.1
9	4/ 6	3	57.4	5.9	63.3	5.3	5.3	.	.	5.3	.	45.9	455.4
9	7/12	6	58.0	.	58.0	12.5	8.0	0.912	4.4	12.4	0.1	46.0	467.8
9	13/15	3	45.6	.	45.6	4.9	.	0.905	4.3	4.3	0.6	46.6	472.1
9	16/22	7	41.3	.	41.3	14.7	.	0.741	10.7	10.7	4.0	50.6	482.8
9	23	1	30.6	7.0	37.6	1.7	.	0.966	0.3	1.3	0.4	51.0	484.1
9	24/27	4	36.3	20.1	56.4	6.3	6.3	.	.	6.3	.	51.0	490.4
9	28/29	2	50.1	.	50.1	3.2	0.1	0.939	3.1	3.2	.	51.0	493.6
9/10	30(9)/ 7(10)	8	46.9	20.6	67.5	8.6	8.6	.	.	8.6	.	51.0	502.2
10	8	1	58.9	.	58.9	0.9	0.9	.	.	0.9	.	51.0	503.1
10	9/10	2	58.0	.	58.0	1.6	1.6	.	.	1.6	.	51.0	504.7
10	11/12	2	56.4	.	56.4	2.4	2.4	.	.	2.4	.	51.0	507.1
10	13/14	2	54.0	0.2	54.2	2.5	2.5	.	.	2.5	.	51.0	509.6
10	15/16	2	51.7	.	51.7	1.8	1.7	0.998	0.1	1.8	.	51.0	511.4
10	17	1	49.9	0.4	50.3	0.8	0.3	0.990	0.5	0.8	.	51.0	512.2
10	18/19	2	49.5	.	49.5	1.9	.	0.962	1.9	1.9	.	51.0	514.0
10	20/21	2	47.7	.	47.7	2.4	.	0.953	2.3	2.3	0.1	51.2	516.3
10	22/23	2	45.4	.	45.4	2.1	.	0.958	1.9	1.9	0.2	51.4	518.2
10	24/26	3	43.5	.	43.5	2.1	.	0.959	1.8	1.8	0.3	51.7	520.0
10	27/29	3	41.7	.	41.7	1.7	.	0.966	1.4	1.4	0.3	52.0	521.4
10/11	30(10)/ 6(11)	8	40.3	32.0	72.3	6.7	6.7	.	.	6.7	.	52.0	528.1
11	7/ 8	2	65.6	3.8	69.4	2.1	2.1	.	.	2.1	.	52.0	530.2
11	9/12	4	67.3	20.9	88.2	4.0	4.0	.	.	4.0	.	52.0	534.2
11	13/14	2	84.2	19.0	103.2	1.2	1.2	.	.	1.2	.	52.0	535.4
11	15/21	7	100.0	21.5	121.5	5.3	5.3	.	.	5.3	.	52.0	540.7

TABLEAU 52 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1964

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman
albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	100.0	0.5	100.5	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	7.4
4	17/19	3	93.1	57.8	150.9	4.2	4.2	.	.	4.2	.	46.7	11.6
4	20/21	2	100.0	8.4	108.4	5.7	5.7	.	.	5.7	.	49.4	17.3
4	22/23	2	100.0	22.4	122.4	4.5	4.5	.	.	4.5	.	17.9	21.8
4	24/27	4	100.0	.	100.0	14.9	14.9	.	.	14.9	.	.	36.7
4	28/29	2	85.1	1.0	86.1	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	42.8
4/5	30(4)/ 2(5)	3	80.0	.	80.0	11.3	11.3	.	.	11.3	.	.	54.1
5	3/ 5	3	68.7	18.3	87.0	7.3	7.3	.	.	7.3	.	.	61.4
5	6/ 8	3	79.7	.	79.7	11.3	11.3	.	.	11.3	.	.	72.7
5	9/12	4	68.4	.	68.4	19.6	18.4	0.975	1.2	19.6	.	.	92.3
5	13/14	2	48.8	.	48.8	6.4	.	0.876	6.0	6.0	0.4	.	98.4
5	15/17	3	42.7	.	42.7	17.2	.	0.694	13.1	13.1	4.1	.	111.5
5	18/22	5	29.6	2.3	31.9	19.2	.	0.671	10.5	10.5	8.7	.	122.0
5	23/27	5	21.4	12.0	33.4	9.8	.	0.819	6.1	6.1	3.7	.	128.1
5	28/31	4	27.4	3.2	30.6	18.9	.	0.672	10.0	10.0	8.9	.	138.1
6	1/ 7	7	20.5	27.6	48.1	30.1	.	0.533	22.5	22.5	7.6	.	160.5
6	8/11	4	25.7	.	25.7	20.6	.	0.647	9.0	9.0	11.6	.	169.6
6	12/14	3	16.6	8.7	25.3	11.4	.	0.789	5.3	5.3	6.1	.	174.9
6	15/17	3	20.0	0.2	20.2	13.0	.	0.762	4.8	4.8	8.2	.	179.7
6	18/20	3	15.4	.	15.4	11.3	.	0.791	3.2	3.2	8.1	.	183.0
6	21/25	5	12.1	.	12.1	26.7	.	0.569	5.2	5.2	21.5	.	188.2
6	26/27	2	6.9	.	6.9	8.9	.	0.830	1.2	1.2	7.7	.	189.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
6	28/30	3	5.7	.	5.7	17.2	.	0.694	1.8	1.8	15.4	67.3	191.1
7	1/ 8	8	4.0	.	4.0	44.3	.	0.391	2.4	2.4	41.9	67.3	193.5
7	9/12	4	1.6	14.5	16.1	13.4	.	0.758	3.9	3.9	9.5	67.3	197.4
7	13/17	5	12.2	.	12.2	28.7	.	0.544	5.6	5.6	23.1	67.3	203.0
7	18/21	4	6.6	2.8	9.4	23.2	.	0.611	3.7	3.7	19.5	67.3	206.7
7	22/26	5	5.7	.	5.7	29.9	.	0.529	2.7	2.7	27.2	67.3	209.4
7	27/31	5	3.0	.	3.0	28.9	.	0.550	1.4	1.4	26.8	67.3	210.7
8	1/ 3	3	1.7	.	1.7	12.7	.	0.767	0.4	0.4	12.3	67.3	211.1
8	4/ 6	3	1.3	0.2	1.5	17.7	.	0.686	0.5	0.5	17.2	67.3	211.6
8	7/ 8	2	1.0	1.8	2.8	7.8	.	0.850	0.4	0.4	7.4	67.3	212.0
8	9/10	2	2.4	2.0	4.4	5.7	.	0.889	0.5	0.5	5.2	67.3	212.5
8	11/15	5	3.9	.	3.9	17.1	.	0.702	1.2	1.2	15.9	67.3	213.7
8	16/19	4	2.7	10.9	13.6	20.8	.	0.645	4.8	4.8	16.0	67.3	218.5
8	20/22	3	8.8	4.6	13.4	7.8	.	0.852	2.0	2.0	5.8	67.3	220.5
8	23/27	5	11.4	.	11.4	27.4	.	0.560	5.0	5.0	22.4	67.3	225.5
8	28/29	2	6.4	.	6.4	8.2	.	0.843	1.0	1.0	7.2	67.3	226.5
8	30/31	2	5.4	.	5.4	11.5	.	0.783	1.2	1.2	10.3	67.3	227.7
9	1/ 2	2	4.2	3.0	7.2	10.0	.	0.810	1.4	1.4	8.6	67.3	229.1
9	3/ 6	4	5.8	14.5	20.3	9.2	.	0.828	3.5	3.5	5.7	67.3	232.5
9	7/10	4	16.9	.	16.9	10.8	.	0.801	3.4	3.4	7.4	67.3	235.9
9	11/14	4	13.5	0.3	13.7	15.8	.	0.720	3.8	3.8	12.0	67.3	239.7
9	15/20	6	9.9	37.5	47.4	13.8	.	0.754	11.7	11.7	2.1	67.3	251.4
9	21/25	5	35.7	2.3	38.0	15.0	.	0.734	10.1	10.1	4.9	67.3	261.5
9	26/27	2	27.9	9.2	37.1	3.9	.	0.924	2.8	2.8	1.1	67.3	264.3
9	28/29	2	34.3	.	34.3	4.7	.	0.908	3.1	3.1	1.6	67.3	267.5
9/10	30(9)/ 6(10)	7	31.1	.	31.1	11.8	.	0.787	6.6	6.6	5.2	67.3	274.1
10	7/11	5	24.5	21.8	46.3	7.3	.	0.862	6.4	6.4	0.9	67.3	280.5
10	12/14	3	39.9	8?1	48.0	2.9	.	0.943	2.7	2.7	0.2	67.3	283.2
10	15/16	2	45.3	.	45.3	4.0	.	0.922	3.5	3.5	0.5	67.3	286.8
10	17/18	2	41.7	.	41.7	1.9	.	0.962	1.6	1.6	0.3	67.3	288.4
10	19/22	4	40.1	.	40.1	3.2	.	0.938	2.5	2.5	0.7	67.3	290.9
10	23/25	3	37.6	5.8	43.4	2.5	.	0.951	2.1	2.1	0.4	67.3	293.0
10/11	26(10)/ 2(11)	8	41.3	.	41.3	8.3	.	0.846	6.4	6.4	1.9	67.3	299.4
11	3/ 5	3	34.9	6.8	41.7	2.2	.	0.957	1.8	1.8	0.4	67.3	301.2

TABLEAU 53 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	100.0	0.1	100.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	7.6
4	17/19	3	92.5	28.3	120.8	5.7	5.7	.	.	5.7	.	15.1	13.3
4	20/21	2	100.0	3.2	103.2	6.7	6.7	.	.	6.7	.	15.1	20.0
4	22/23	2	96.5	7.5	104.0	5.0	5.0	.	.	5.0	.	15.1	25.0
4	24/27	4	99.0	.	99.0	15.2	15.2	.	.	15.2	.	15.1	40.2
4	28/29	2	83.8	.	83.8	7.2	7.2	.	.	7.2	.	15.1	47.4
4/5	30(4)/ 2(5)	3	76.6	.	76.6	11.2	11.2	.	.	11.2	.	15.1	58.6
5	3/ 5	3	65.4	7.3	72.7	13.8	13.8	.	.	13.8	.	15.1	72.4
5	6/ 8	3	58.9	0.1	59.0	15.6	9.0	0.870	6.5	15.5	0.1	15.1	87.9
5	9/12	4	43.5	.	43.5	25.4	.	0.581	18.2	18.2	7.2	15.1	106.1
5	13/14	2	25.3	9.4	34.7	7.4	.	0.857	4.9	4.9	2.5	15.1	111.1
5	15/17	3	29.7	.	29.7	18.4	.	0.675	9.7	9.7	8.7	15.1	120.7
5	18/22	5	20.1	3.0	23.1	21.0	.	0.645	8.2	8.2	12.8	15.1	128.9
5	23/27	5	14.9	16.1	31.0	14.1	.	0.748	7.8	7.8	6.3	15.1	136.7
5	28/31	4	23.2	0.9	24.1	17.9	.	0.687	7.5	7.5	10.4	15.1	144.3
6	1/ 7	7	16.5	16.7	33.2	33.3	.	0.497	16.7	16.7	16.6	15.1	161.0
6	8/11	4	16.5	0.1	16.6	24.9	.	0.588	6.9	6.9	18.0	15.1	167.8
6	12/14	3	9.8	9.4	19.2	15.5	.	0.721	5.3	5.3	10.2	15.1	173.2
6	15/17	3	13.8	0.2	14.0	13.8	.	0.749	3.5	3.5	10.3	15.1	176.7
6	18/20	3	10.5	.	10.5	14.3	.	0.740	2.7	2.7	11.6	15.1	179.4
6	21/25	5	7.8	.	7.8	27.8	.	0.555	3.5	3.5	24.3	15.1	182.9
6	26/27	2	4.3	5.5	9.8	7.9	.	0.848	1.5	1.5	6.4	15.1	184.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
6	28/30	3	8.3	0.6	8.9	15.9	.	0.715	2.5	2.5	13.4	158.7	186.9
7	1/ 8	8	6.4	.	6.4	46.8	.	0.370	4.0	4.0	42.8	201.5	190.9
7	9/12	4	2.4	8.1	10.5	13.5	.	0.756	2.5	2.5	11.0	212.4	193.5
7	13/17	5	7.9	.	7.9	30.8	.	0.518	3.8	3.8	27.0	239.4	197.3
7	18/21	4	4.1	2.1	6.2	26.5	.	0.566	2.7	2.7	23.8	263.2	200.0
7	22/26	5	3.5	.	3.5	31.0	.	0.516	1.7	1.7	20.3	292.5	201.7
7	27/31	5	1.8	.	1.8	28.6	.	0.545	0.8	0.8	27.6	320.3	202.5
8	1/ 3	3	1.0	0.1	1.1	12.7	.	0.767	0.3	0.3	12.4	332.7	202.8
8	4/ 6	3	0.8	2.6	3.4	18.8	.	0.669	1.1	1.1	17.7	350.4	203.9
8	7/ 8	2	2.3	4.6	6.9	7.7	.	0.852	1.0	1.0	6.7	357.1	204.9
8	9/10	2	5.9	25.1	31.0	4.7	.	0.908	2.8	2.8	1.9	358.9	207.8
8	11/15	5	28.1	1.1	29.2	15.9	.	0.720	8.2	8.2	7.7	366.6	216.0
8	16/19	4	21.0	3.5	24.5	22.2	.	0.625	9.2	9.2	13.0	379.6	225.2
8	20/22	3	15.3	2.9	18.2	9.6	.	0.820	3.3	3.3	6.3	385.9	228.4
8	23/27	5	15.0	.	15.0	24.8	.	0.593	6.1	6.1	18.7	404.7	234.5
8	28/29	2	8.9	0.1	9.0	8.1	.	0.845	1.4	1.4	6.7	411.4	235.9
8	30/31	2	7.6	.	7.6	11.5	.	0.783	1.6	1.6	9.9	421.2	237.6
9	1/ 2	2	5.9	.	5.9	10.6	.	0.799	1.2	1.2	9.4	430.6	238.8
9	3/ 6	4	4.7	38.4	43.1	10.4	.	0.808	8.3	8.3	2.1	432.7	247.1
9	7/10	4	34.8	0.1	34.9	11.1	.	0.796	7.1	7.1	4.0	436.7	254.2
9	11/14	4	27.8	1.4	29.2	15.7	.	0.721	8.1	8.1	7.6	444.3	262.3
9	15/20	6	21.1	56.5	77.6	15.5	15.5	.	.	15.5	.	444.3	277.8
9	21/25	5	62.1	.	62.1	15.4	12.1	0.933	3.3	15.4	.	444.3	293.2
9	26/27	2	46.7	17.4	64.1	3.1	3.1	.	.	3.1	.	444.3	296.3
9	28/29	2	61.0	.	61.0	5.1	5.1	.	.	5.1	.	444.3	301.4
9/10	30(9)/ 6(10)	7	55.9	0.3	56.2	12.2	6.2	0.884	5.8	11.9	0.3	444.6	313.4
10	7/11	5	44.2	34.0	78.2	10.4	10.4	.	.	10.4	.	444.6	323.8
10	12/14	3	67.8	5.6	73.4	2.7	2.7	.	.	2.7	.	444.6	326.5
10	15/16	2	70.7	5.4	76.1	4.0	4.0	.	.	4.0	.	444.6	330.5
10	17/18	2	72.1	0.8	72.9	2.0	2.0	.	.	2.0	.	444.6	332.5
10	19/22	4	70.9	.	70.9	2.9	2.9	.	.	2.9	.	444.6	335.4
10	23/25	3	66.0	3.4	71.4	2.3	2.3	.	.	2.3	.	444.6	337.7
10/11	26(10)/ 2(11)	8	69.1	0.5	69.6	6.7	6.7	.	.	6.7	.	444.6	344.4
11	3/ 5	3	62.9	2.3	65.2	2.3	2.3	.	.	2.3	.	444.6	346.7

TABLEAU 54 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

NEVERS - 1964

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
4	15/16	2	100.0	0.3	100.3	5.9	5.9	.	.	5.9	.	.	5.9
4	17/19	3	94.4	32.9	127.3	5.3	5.3	.	.	5.3	.	22.0	11.2
4	20/21	2	100.0	4.8	104.8	5.1	5.1	.	.	5.1	.	22.0	16.3
4	22/23	2	99.7	8.6	108.3	3.4	3.4	.	.	3.4	.	4.9	19.7
4	24/27	4	100.0	.	100.0	13.0	13.0	.	.	13.0	.	26.9	32.7
4	28/29	2	87.0	0.1	87.1	6.3	6.3	.	.	6.3	.	26.9	39.0
4/5	30(4)/ 2(5)	3	80.8	.	80.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	26.9	48.4
5	3/ 5	3	71.4	15.9	87.3	7.0	7.0	.	.	7.0	.	26.9	55.4
5	6/ 8	3	80.3	0.3	80.6	10.2	10.2	.	.	10.2	.	26.9	65.6
5	9/12	4	70.4	.	70.4	16.7	16.7	.	.	16.7	.	26.9	82.3
5	13/14	2	53.7	0.5	54.2	5.3	4.2	0.978	1.1	5.3	.	26.9	87.6
5	15/17	3	48.9	.	48.9	14.8	.	0.732	13.1	13.1	1.7	26.9	100.7
5	18/22	5	35.8	3.4	39.2	19.1	.	0.672	12.9	12.9	6.2	26.9	113.6
5	23/27	5	26.3	41.8	68.1	13.6	13.6	.	.	13.6	.	26.9	127.2
5	28/31	4	54.5	.	54.5	17.7	4.5	0.759	12.0	16.6	1.1	26.9	143.7
6	1/ 7	7	38.0	15.3	53.3	29.1	3.3	0.583	20.9	24.1	5.0	26.9	167.9
6	8/11	4	29.1	.	29.1	19.7	.	0.660	9.9	9.9	9.8	26.9	177.7
6	12/14	3	19.3	36.5	55.8	14.3	5.8	0.836	8.2	14.0	0.3	26.9	191.7
6	15/17	3	41.8	.	41.8	13.2	.	0.759	10.1	10.1	3.1	26.9	201.8
6	18/20	3	31.7	2.3	34.0	12.9	.	0.764	8.0	8.0	4.9	26.9	209.8
6	21/25	5	26.0	.	26.0	18.9	.	0.675	8.4	8.4	10.5	26.9	218.2
6	26/27	2	17.5	.	17.5	8.2	.	0.843	2.8	2.8	5.4	26.9	221.0

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
6	28/30	3	14.8	0.2	15.0	13.9	.	0.747	3.8	3.8	10.1	58.2	224.8
7	1/ 8	8	11.2	.	11.2	43.5	.	0.398	6.7	6.7	36.8	94.9	231.6
7	9/12	4	4.4	11.1	15.5	12.5	.	0.772	3.	3.5	9.0	103.9	235.1
7	13/17	5	12.0	.	12.0	28.3	.	0.548	5.4	5.4	22.9	126.8	240.5
7	18/21	4	6.6	13.6	20.2	19.5	.	0.663	6.8	6.8	12.7	139.5	247.3
7	22/26	5	13.4	.	13.4	30.6	.	0.521	6.4	6.4	24.2	163.7	253.7
7	27/31	5	7.0	.	7.0	24.9	.	0.592	2.8	2.8	22.1	185.7	256.6
8	1/ 3	3	4.1	.	4.1	11.3	.	0.791	0.9	0.9	10.4	196.2	257.4
8	4/ 6	3	3.3	5.1	8.4	14.8	.	0.726	2.3	2.3	12.5	208.7	259.7
8	7/ 8	2	6.1	10.2	16.3	6.4	.	0.876	2.0	2.0	4.4	213.1	261.7
8	9/10	2	14.3	30.3	44.6	4.8	.	0.906	4.2	4.2	0.6	213.7	265.9
8	11/15	5	40.4	7.9	48.7	13.7	.	0.754	11.9	11.9	1.8	215.5	277.8
8	16/19	4	36.4	14.9	51.3	17.4	1.3	0.714	14.3	15.6	1.8	217.3	293.4
8	20/22	3	35.7	0.1	35.8	7.8	.	0.852	5.3	5.3	2.5	219.8	298.7
8	23/27	5	30.5	.	30.5	21.7	.	0.635	11.1	11.1	10.6	230.4	305.8
8	28/29	2	19.4	0.6	20.0	6.9	.	0.867	2.7	2.7	4.2	234.6	312.5
8	30/31	2	17.3	.	17.3	8.8	.	0.832	2.9	2.9	5.9	240.5	315.4
9	1/ 2	2	14.4	0.2	14.6	7.4	.	0.857	2.1	2.1	5.3	245.8	317.5
9	3/ 6	4	12.5	13.1	25.6	11.0	.	0.797	5.2	5.2	5.8	251.6	322.7
9	7/10	4	20.4	.	20.4	9.6	.	0.821	3.6	3.6	6.0	257.6	326.3
9	11/14	4	16.8	1.3	18.1	15.2	.	0.729	4.9	4.9	10.3	267.9	331.2
9	15/20	6	13.2	51.5	64.7	14.0	14.0	.	.	14.0	.	267.9	345.2
9	21/25	5	50.7	.	50.7	12.1	0.7	0.792	10.4	11.1	1.0	268.9	356.3
9	26/27	2	39.6	14.8	54.4	2.4	2.4	.	.	2.4	.	268.9	358.7
9	28/29	2	52.0	.	52.0	4.0	2.0	0.960	2.0	4.0	.	268.9	362.7
9/10	30(9)/ 6(10)	7	48.0	8.7	56.7	11.3	6.7	0.911	4.5	11.2	0.1	269.0	373.9
10	7/11	5	45.5	25.4	70.9	8.8	8.8	.	.	8.8	.	269.0	382.7
10	12/14	3	62.1	7.9	70.0	3.0	3.0	.	.	3.0	.	269.0	385.7
10	15/16	2	67.0	5.9	72.9	3.3	3.3	.	.	3.3	.	269.0	389.0
10	17/18	2	69.6	1.6	71.2	1.5	1.5	.	.	1.5	.	269.0	390.5
10	19/22	4	69.7	.	69.7	2.4	2.4	.	.	2.4	.	269.0	392.9
10	23/25	3	67.3	7.5	74.8	1.7	1.7	.	.	1.7	.	269.0	394.6
10/11	26(10)/ 2(11)	8	73.1	.	73.1	5.0	5.0	.	.	5.0	.	269.0	399.6
11	3/ 5	3	68.1	2.0	70.1	1.4	1.4	.	.	1.4	.	269.0	401.0

TABLEAU 55 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	18.4	268.4	30.8	30.8	.	.	30.8	.	.	30.8
4	23/24	2	237.6	5.3	242.9	5.1	5.1	.	.	5.1	.	.	35.9
4	25/27	3	237.8	.	237.8	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	42.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.6	9.7	241.3	16.0	16.0	.	.	16.0	.	.	58.1
5	3/ 6	4	225.3	0.3	225.6	13.2	13.2	.	.	13.2	.	.	71.3
5	7/ 8	2	212.4	3.3	215.7	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	81.1
5	9/10	2	205.9	7.1	213.0	6.9	6.9	.	.	6.9	.	.	88.0
5	11/12	2	206.1	.	206.1	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	95.4
5	13/14	2	198.7	10.1	208.8	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	102.1
5	15/17	3	202.1	0.2	202.3	12.3	12.3	.	.	12.3	.	.	114.4
5	18/19	2	190.0	.	190.0	7.0	7.0	.	.	7.0	.	.	121.4
5	20/23	4	183.0	20.3	203.3	11.7	11.7	.	.	11.7	.	.	133.1
5	24/25	2	191.6	2.5	194.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	141.4
5	26/29	4	185.8	4.1	189.9	13.2	13.2	.	.	13.2	.	.	154.6
5	30/31	2	176.7	.	176.7	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	162.2
6	1/ 7	7	169.1	28.5	197.6	26.7	26.7	.	.	26.7	.	.	188.9
6	8/ 9	2	170.9	.	170.9	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	196.5
6	10/15	6	163.3	19.3	182.6	20.8	20.8	.	.	20.8	.	.	217.3
6	17/17	2	161.8	.	161.8	9.3	9.3	.	.	9.3	.	.	226.6
6	18/23	6	152.5	1.9	154.4	25.4	14.4	0.923	10.7	25.1	0.3	0.3	251.7
6	24/25	2	129.3	1.0	130.3	7.8	.	0.945	7.2	7.2	0.6	0.9	258.9
6	26/28	3	123.1	46.7	169.8	10.7	10.7	.	.	10.7	.	0.9	269.6
6/7	29(6)/ 1(7)	3	159.1	.	159.1	11.0	11.0	.	.	11.0	.	0.9	280.6
7	2/ 5	4	148.1	1.5	149.6	16.6	9.6	0.951	6.9	16.5	0.1	1.0	297.1
7	6/12	7	133.1	14.7	147.8	28.6	7.8	0.860	19.6	27.4	1.2	2.2	324.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	13	1	120.4	2.5	122.9	2.3	.	0.984	2.0	2.0	0.3	.	326.5
7	14/21	8	120.9	.	120.9	40.5	.	0.745	30.8	30.8	9.7	.	357.4
7	22/25	4	90.0	52.4	142.4	19.5	2.4	0.883	16.3	18.7	0.8	.	376.1
7	26/31	6	123.7	.	123.7	39.0	.	0.752	30.7	30.7	8.3	.	406.8
8	1/7	7	93.0	66.4	159.4	22.4	19.4	0.978	3.0	22.4	.	.	429.2
8	8/10	3	137.0	2.8	139.8	7.7	.	0.946	7.5	7.5	0.2	.	436.8
8	11/15	5	132.2	2.5	134.7	17.3	.	0.882	15.8	15.8	1.5	.	452.6
8	16/21	6	118.9	23.0	141.9	22.9	1.9	0.859	19.8	21.6	1.3	.	474.3
8	22/24	3	120.2	6.5	126.7	9.3	.	0.935	8.2	8.2	1.1	.	482.5
8	25/28	4	118.5	7.6	126.1	14.3	.	0.902	12.4	12.4	1.9	.	494.9
8/9	29(8)/ 3(9)	6	113.7	6.3	120.0	16.1	.	0.890	13.2	13.2	2.9	.	508.1
9	4/6	3	106.8	4.3	111.1	5.4	.	0.962	4.2	4.2	1.2	.	512.3
9	7/12	6	106.9	2.3	109.2	12.7	.	0.913	9.5	9.5	3.2	.	521.8
9	13/15	3	99.7	.	99.7	4.4	.	0.969	3.1	3.1	1.3	.	524.9
9	16/22	7	96.6	1.8	98.4	15.9	.	0.892	10.6	10.6	5.3	.	535.6
9	23	1	87.7	19.5	107.2	1.0	.	0.993	0.8	0.8	0.2	.	536.3
9	24/27	3	106.5	11.3	117.6	6.8	.	0.952	5.6	5.6	1.2	.	542.0
9	28/29	2	112.1	.	112.1	3.7	.	0.974	2.9	2.9	0.8	.	544.9
9/10	30(9)/ 7(10)	8	109.2	29.7	138.9	9.2	.	0.936	8.9	8.9	0.3	.	553.8
10	8	1	130.0	.	130.0	1.3	.	0.991	1.2	1.2	0.1	.	555.0
10	9/10	2	128.8	.	128.8	2.4	.	0.983	2.2	2.2	0.2	.	557.2
10	11/12	2	126.6	.	126.6	3.7	.	0.974	3.3	3.3	0.4	.	560.5
10	13/14	2	123.3	.	123.3	2.8	.	0.980	2.5	2.5	0.3	.	562.9
10	15/16	2	120.8	.	120.8	2.5	.	0.982	2.1	2.1	0.4	.	565.1
10	17	1	118.7	1.3	120.0	1.0	.	0.993	0.9	0.9	0.1	.	566.0
10	18/19	2	119.1	.	119.1	2.3	.	0.984	1.9	1.9	0.4	.	567.9
10	20/21	2	117.2	.	117.2	2.5	.	0.982	2.1	2.1	0.4	.	570.0
10	22/23	2	115.1	.	115.1	2.7	.	0.981	2.2	2.2	0.5	.	572.2
10	24/26	3	112.9	.	112.9	2.6	.	0.982	2.1	2.1	0.5	.	574.3
10	27/29	3	110.8	.	110.8	1.5	.	0.989	1.2	1.2	0.3	.	575.5
10/11	30(10)/ 6(11)	8	109.6	28.9	138.5	6.8	.	0.952	6.6	6.6	0.2	.	582.1
11	7/8	2	131.9	2.5	134.4	2.1	5.8	0.985	2.0	2.0	0.1	.	584.1
11	9/12	4	132.4	30.8	163.2	5.8	.	.	.	5.8	.	.	589.9
11	13/14	2	157.4	17.2	174.6	0.8	0.8	.	.	0.8	.	.	590.7
11	15/21	7	173.8	63.6	237.4	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	596.3

TABLEAU 56 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 3

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	11.0	261.0	29.4	29.4	.	.	29.4	.	.	29.4
4	23/24	2	231.6	9.6	241.2	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	34.3
4	25/27	3	236.3	.	236.3	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	39.5
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.1	8.9	240.0	16.0	16.0	.	.	16.0	.	.	55.5
5	3/ 6	4	224.0	0.9	224.9	12.4	12.4	.	.	12.4	.	.	67.9
5	7/ 8	2	212.5	2.5	215.0	9.7	9.7	.	.	9.7	.	.	77.6
5	9/10	2	205.3	4.9	210.2	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	83.8
5	11/12	2	204.0	.	204.0	8.2	8.2	.	.	8.2	.	.	92.0
5	13/14	2	195.8	11.2	207.0	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	98.2
5	15/17	3	200.8	0.3	201.1	10.8	10.8	.	.	10.8	.	.	109.0
5	18/19	2	190.3	.	190.3	6.5	6.5	.	.	6.5	.	.	115.5
5	20/23	4	183.8	27.8	211.6	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	126.2
5	24/25	2	200.9	.	200.9	8.5	8.5	.	.	8.5	.	.	134.7
5	26/29	4	192.4	29.0	221.4	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	148.1
5	30/31	2	208.0	.	208.0	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	156.1
6	1/ 7	7	200.0	5.8	205.8	31.5	31.5	.	.	31.5	.	.	187.6
6	8/ 9	2	174.3	.	174.3	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	195.2
6	10/15	6	166.7	9.1	175.8	18.0	18.0	.	.	18.0	.	.	213.2
6	16/17	2	157.8	.	157.8	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	223.0
6	18/23	6	148.0	4.9	152.9	27.1	12.9	0.902	13.7	26.6	0.5	.	249.6
6	24/25	2	126.3	10.2	136.5	9.5	.	0.933	9.1	9.1	0.4	.	258.7
6	26/28	3	127.4	24.6	152.0	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	270.6
6/7	29(6)/ 1(7)	3	140.1	1.9	142.0	12.9	2.0	0.924	10.7	12.6	0.3	.	283.3
7	2/ 5	4	129.3	26.5	155.8	17.0	15.8	0.992	1.2	17.0	.	.	300.3
7	6/12	7	138.8	5.6	144.4	30.4	4.4	0.828	24.0	28.4	2.0	.	328.7

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	partiel cumulé	DRAINAGE	CUMUL
													Et
7	13	1	116.0	3.6	119.6	2.7	.	0.981	2.3	2.3	0.4	3.4	331.1
7	14/21	8	117.2	.	117.2	39.6	.	0.750	29.3	29.3	10.3	13.7	360.4
7	22/25	4	87.9	8.9	96.8	21.2	.	0.857	13.8	13.8	7.4	21.1	374.2
7	26/31	6	83.0	.	83.0	37.4	.	0.761	19.8	19.8	17.6	38.6	394.1
8	1/7	7	63.1	80.5	143.6	21.1	3.6	0.881	16.6	20.2	0.9	39.5	414.3
8	8/10	3	123.4	2.9	126.3	7.6	.	0.947	6.7	6.7	0.9	40.4	421.0
8	11/15	5	119.6	9.6	129.2	16.7	.	0.886	14.7	14.7	2.0	42.4	435.7
8	16/21	6	114.5	24.2	138.7	22.5	.	0.850	20.8	20.8	1.7	44.0	446.6
8	22/24	3	117.8	6.8	124.6	8.6	.	0.940	7.5	7.5	1.1	45.1	464.1
8	25/28	4	117.1	1.8	118.9	14.2	.	0.902	11.6	11.6	2.6	47.7	475.7
8/9	29(8)/ 3(9)	6	107.3	4.1	111.4	18.9	.	0.872	14.2	14.2	4.7	52.4	489.9
9	4/ 6	3	97.2	4.6	101.8	4.9	.	0.965	3.5	3.5	1.4	53.8	493.4
9	7/12	6	98.3	1.7	100.0	11.9	.	0.918	8.2	8.2	3.7	57.5	501.6
9	13/15	3	91.8	.	91.8	4.4	.	0.969	2.9	2.9	1.5	59.0	504.5
9	16/22	7	88.9	.	88.9	15.7	.	0.893	9.5	9.5	6.2	65.2	514.0
9	23	1	79.4	.	79.4	1.2	.	0.991	0.7	0.7	0.5	65.7	514.7
9	24/27	4	78.7	8.0	86.7	7.6	.	0.947	4.6	4.6	3.0	68.7	519.3
9	28/29	/	82.1	.	82.1	3.7	.	0.974	2.2	2.2	1.5	70.3	521.4
9/10	30(9)/ 7(10)	8	80.0	18.0	98.0	9.7	.	0.933	6.6	6.6	3.1	73.4	528.0
10	8	1	91.4	.	91.4	0.8	.	0.994	0.5	0.5	0.3	73.7	528.5
10	9/10	2	90.9	.	90.9	2.7	.	0.981	1.7	1.7	1.0	74.7	530.3
10	11/12	2	89.1	.	89.1	3.0	.	0.979	1.9	1.9	1.1	75.7	532.2
10	13/14	2	87.2	.	87.2	2.7	.	0.981	1.7	1.7	1.0	76.7	533.9
10	15/16	2	85.5	.	85.5	2.7	.	0.981	1.6	1.6	1.1	77.8	535.5
10	17	1	83.9	0.5	84.4	1.2	.	0.991	0.7	0.7	0.5	78.3	536.2
10	18/19	2	83.7	.	83.7	2.5	.	0.982	1.5	1.5	1.0	79.3	537.7
10	20/21	2	82.2	.	82.2	2.7	.	0.981	1.6	1.6	1.1	80.4	539.3
10	22/23	2	80.6	.	80.6	2.4	.	0.983	1.4	1.4	1.0	81.4	540.7
10	24/26	3	79.2	.	79.2	3.3	.	0.977	1.9	1.9	1.4	82.9	542.5
10	27/29	3	77.4	.	77.4	1.3	.	0.991	0.7	0.7	0.6	83.5	543.2
10/11	30(10)/ 6(11)	8	76.7	56.1	132.8	7.6	.	0.947	7.0	7.0	0.6	84.0	550.3
11	7/ 8	2	125.7	0.6	126.3	2.7	.	0.981	2.4	2.4	0.3	84.3	552.7
11	9/12	4	123.9	13.8	137.7	5.4	.	0.962	5.2	5.2	0.2	84.5	557.9
11	13/14	2	132.5	17.9	150.4	1.4	1.4	.	1.4	1.4	.	84.5	559.3
11	15/21	7	149.0	10.4	159.4	5.3	5.3	.	.	5.3	.	84.5	564.6

TABEAU 57 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

NEVERS - 1963

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	18.1	268.1	25.2	25.2	.	.	25.2	.	.	25.2
4	23/24	2	242.9	4.3	247.2	4.4	4.4	.	.	4.4	.	.	29.6
4	25/27	3	242.8	.	242.8	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	35.7
4/5	28(4)/ 2(5)	5	236.7	6.8	243.5	14.5	14.5	.	.	14.5	.	.	50.2
5	3/ 6	4	229.0	0.5	229.5	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	61.2
5	7/ 8	2	218.5	6.7	225.2	8.7	8.7	.	.	8.7	.	.	69.9
5	9/10	2	216.5	3.1	219.6	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	75.5
5	11/12	2	214.0	.	214.0	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	82.9
5	13/14	2	206.6	13.6	220.2	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	88.2
5	15/17	3	214.9	0.3	215.2	8.9	8.9	.	.	8.9	.	.	97.1
5	18/19	2	206.3	.	206.3	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	103.1
5	20/23	4	200.3	30.4	230.7	12.0	12.0	.	.	12.0	.	.	115.1
5	24/25	2	218.7	.	218.7	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	123.0
5	26/29	4	210.8	35.0	245.8	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	136.4
5	30/31	2	232.4	.	232.4	9.0	9.0	.	.	9.0	.	.	145.4
6	1/ 7	7	223.4	19.3	242.7	28.0	28.0	.	.	28.0	.	.	173.4
6	8/ 9	2	214.7	.	214.7	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	179.8
6	10/15	6	208.3	29.4	237.7	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	195.4
6	16/17	2	222.1	.	222.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	203.0
6	18/23	6	214.5	2.9	217.4	23.9	23.9	.	.	23.9	.	.	226.9
6	24/25	2	193.5	15.0	208.5	8.2	8.2	.	.	8.2	.	.	235.1
6	26/28	3	200.3	27.7	228.0	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	246.5
6/7	29(6)/ 1(7)	3	216.6	17.6	234.2	11.6	11.6	.	.	11.6	.	.	258.1
7	2/ 5	4	222.6	3.2	225.8	15.8	15.8	.	.	15.8	.	.	273.9
7	6/12	7	210.0	17.8	227.8	30.2	30.2	.	.	30.2	.	.	304.1

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	13	1	197.6	5.3	202.9	3.0	3.0	.	.	3.0	.	.	307.1
7	14/21	8	199.9	.	199.9	40.6	40.6	.	.	40.6	.	.	347.7
7	22/25	4	159.3	0.9	160.2	18.3	18.3	.	.	18.3	.	.	366.0
7	26/31	6	141.9	.	141.9	29.7	1.9	0.817	25.6	27.5	2.2	.	393.5
8	1/ 7	7	114.4	92.8	207.2	21.6	21.6	.	.	21.6	.	.	415.1
8	8/10	3	185.6	4.5	190.1	6.9	6.9	.	.	6.9	.	.	422.0
8	11/15	5	183.2	6.1	189.3	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	436.3
8	16/21	6	175.0	29.0	204.0	18.6	18.6	.	.	18.6	.	.	454.9
8	22/24	3	185.4	9.8	195.2	8.7	8.7	.	.	8.7	.	.	463.6
8	25/28	4	186.5	2.8	189.3	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	475.5
8/9	29(8)/ 3(9)	6	177.4	4.6	182.0	18.3	18.3	.	.	18.3	.	.	493.8
9	4/ 6	3	163.7	5.9	169.6	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	499.1
9	7/12	6	164.3	.	164.3	12.5	12.5	.	.	12.5	.	.	511.6
9	13/15	3	151.8	.	151.8	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	516.5
9	16/22	7	146.9	.	146.9	14.7	6.9	0.945	7.7	14.5	0.2	.	531.1
9	23	1	132.3	7.0	139.3	1.7	.	0.988	1.7	1.7	.	.	532.8
9	24/27	4	137.6	20.1	157.7	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	539.1
9	28/29	2	151.4	.	151.4	3.2	3.2	.	.	3.2	.	.	542.3
9/10	30(9)/ 7(10)	8	148.2	20.6	168.8	8.6	8.6	.	.	8.6	.	.	550.9
10	8	1	160.2	.	160.2	0.9	0.9	.	.	0.9	.	.	551.8
10	9/10	2	159.3	.	159.3	1.6	1.6	.	.	1/6	.	.	553.4
10	11/12	2	157.7	.	157.7	2.4	2.4	.	.	2.4	.	.	555.8
10	13/14	2	155.3	0.2	155.5	2.5	2.5	.	.	2.5	.	.	558.3
10	15/16	2	153.0	.	153.0	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	560.1
10	17	1	151.2	0.4	151.6	0.8	0.8	.	.	0.8	.	.	560.9
10	18/19	2	150.8	.	150.8	1.9	1.9	.	.	1.9	.	.	562.8
10	20/21	2	148.9	.	148.9	2.4	2.4	.	.	2.4	.	.	565.2
10	22/23	2	146.5	.	146.5	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	567.3
10	24/26	3	144.4	.	144.4	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	569.4
10	27/29	3	142.3	.	142.3	1.7	1.7	.	.	1.7	.	.	571.1
10/11	30(10)/ 6(11)	8	140.6	32.0	172.6	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	577.8
11	7/ 8	2	165.9	3.8	169.7	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	579.9
11	9/12	4	167.6	20.9	188.5	4.0	4.0	.	.	4.0	.	.	583.9
11	13/14	2	184.5	19.0	203.5	1.2	1.2	.	.	1.2	.	.	585.1
11	15/21	7	202.3	21.5	223.8	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	590.4

TABLEAU 58 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1964

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	0.5	250.5	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	7.4
4	17/19	3	243.1	57.8	300.9	4.2	4.2	.	.	4.2	.	46.7	11.6
4	20/21	2	250.0	8.4	258.4	5.7	5.7	.	.	5.7	.	2.7	17.3
4	22/23	2	250.0	22.4	272.4	4.5	4.5	.	.	4.5	.	17.9	21.8
4	24/27	4	250.0	.	250.0	14.9	14.9	.	.	14.9	.	.	36.7
4	28/29	2	235.1	1.0	236.1	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	42.8
4/5	30(4)/ 2(5)	3	230.0	.	230.0	11.3	11.3	.	.	11.3	.	.	54.1
5	3/ 5	3	218.7	18.3	237.0	7.3	7.3	.	.	7.3	.	.	61.4
5	6/ 8	3	229.7	.	229.7	11.3	11.3	.	.	11.3	.	.	72.7
5	9/12	4	218.4	.	218.4	19.6	19.6	.	.	19.6	.	.	92.3
5	13/14	2	198.8	.	198.8	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	98.7
5	15/17	3	192.4	.	192.4	17.2	17.2	.	.	17.2	.	.	115.9
5	18/22	5	175.2	2.3	177.5	19.2	19.2	.	.	19.2	.	.	135.1
5	23/27	5	158.3	12.0	170.3	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	144.9
5	28/31	4	160.5	3.2	163.7	18.9	18.9	.	.	18.9	.	.	163.8
6	1/ 7	7	144.8	27.6	172.4	30.1	30.1	.	.	30.1	.	.	193.9
6	8/11	4	142.3	.	142.3	20.6	2.3	0.875	17.5	19.8	0.8	.	213.7
6	12/14	3	122.5	8.7	131.2	11.4	.	0.921	10.4	10.4	1.0	.	224.1
6	15/17	3	120.8	0.2	121.0	13.0	.	0.910	10.9	10.9	2.1	.	235.0
6	18/20	3	110.1	.	110.1	11.3	.	0.921	8.7	8.7	2.6	.	243.6
6	21/25	5	101.5	.	101.5	26.7	.	0.823	17.9	17.9	8.8	.	261.5
6	26/27	2	83.6	.	83.6	8.9	.	0.937	5.2	5.2	3.7	.	266.8

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE		CUMUL
											partiel cumulé	partiel cumulé	partiel cumulé	partiel cumulé	Et
6	28/30	3	78.3	.	78.3	17.2	.	0.882	9.2	9.2	8.0	27.0	.	67.3	276.0
7	1/ 8	8	69.1	.	69.1	44.3	.	0.724	19.1	19.1	25.2	52.2	.	67.3	295.1
7	9/12	4	50.0	14.5	64.5	13.4	.	0.908	6.0	6.0	7.4	59.7	.	67.3	301.0
7	13/17	5	58.6	.	58.6	28.7	.	0.811	11.1	11.1	17.6	77.3	.	67.3	312.1
7	18/21	4	47.5	2.8	50.3	23.2	.	0.844	7.8	7.8	15.4	92.7	.	67.3	319.9
7	22/26	5	42.5	.	42.5	29.9	.	0.804	8.3	8.3	21.6	114.2	.	67.3	328.3
7	27/31	5	34.1	.	34.1	28.2	.	0.814	6.3	6.3	21.9	136.1	.	67.3	334.6
8	1/ 3	3	27.8	.	27.8	12.7	.	0.912	2.4	2.4	10.3	146.4	.	67.3	337.0
8	4/ 6	3	25.4	.	25.4	17.7	.	0.879	3.1	3.1	14.6	161.0	.	67.3	340.1
8	7/ 8	2	22.5	1.8	24.3	7.8	.	0.945	1.3	1.3	6.5	167.4	.	67.3	341.5
8	9/10	2	22.9	2.0	24.9	5.7	.	0.960	1.0	1.0	4.7	172.1	.	67.3	342.5
8	11/15	5	23.9	.	23.9	17.1	.	0.884	2.8	2.8	14.3	186.4	.	67.3	345.3
8	16/19	4	21.1	10.9	32.0	20.8	.	0.860	4.5	4.5	16.3	202.7	.	67.3	349.8
8	20/22	3	27.5	4.5	32.1	7.8	.	0.945	1.8	1.8	6.0	208.8	.	67.3	351.5
8	23/27	5	30.4	.	30.4	27.4	.	0.819	5.5	5.5	21.9	230.7	.	67.3	357.0
8	28/29	2	24.9	.	24.9	8.2	.	0.942	1.4	1.4	6.8	237.4	.	67.3	358.5
8	30/31	2	23.4	.	23.4	11.5	.	0.920	1.9	1.9	9.6	247.1	.	67.3	360.3
9	1/ 2	2	21.6	3.0	24.6	10.0	.	0.930	1.7	1.7	8.3	255.3	.	67.3	362.1
9	3/ 6	4	22.8	14.5	37.3	9.2	.	0.936	2.4	2.4	6.8	262.1	.	67.3	364.5
9	7/10	4	34.9	.	34.9	10.8	.	0.925	2.6	2.6	8.2	270.3	.	67.3	367.1
9	11/14	4	32.3	0.2	32.5	15.8	.	0.892	3.5	3.5	12.3	282.6	.	67.3	370.6
9	15/20	6	29.0	37.5	66.5	13.8	.	0.905	6.3	6.3	7.5	290.1	.	67.3	376.9
9	21/25	5	60.2	2.3	62.5	15.0	.	0.897	6.4	6.4	8.6	298.7	.	67.3	383.3
9	26/27	2	56.1	9.2	65.3	3.9	.	0.972	1.8	1.8	2.1	300.8	.	67.3	385.1
9	28/29	2	63.5	.	63.5	4.7	.	0.967	2.1	2.1	2.6	303.4	.	67.3	387.2
9/10	30(9)/ 6(10)	7	61.4	.	61.4	11.8	.	0.919	5.0	5.0	6.8	310.2	.	67.3	392.2
10	7/11	5	56.4	21.8	78.2	7.3	.	0.949	4.0	4.0	3.3	313.5	.	67.3	396.2
10	12/14	3	74.2	8.1	82.3	2.9	.	0.979	1.7	1.7	1.2	314.7	.	67.3	397.9
10	15/16	2	80.6	.	80.6	4.0	.	0.972	2.3	2.3	1.7	316.4	.	67.3	400.2
10	17/18	2	78.3	.	78.3	1.9	.	0.986	1.1	1.1	0.8	317.3	.	67.3	401.2
10	19/22	4	77.3	.	77.3	3.2	.	0.977	1.8	1.8	1.4	318.7	.	67.3	403.0
10	23/25	3	75.5	5.8	81.3	2.5	.	0.982	1.4	1.4	1.1	319.8	.	67.3	404.4
10/11	26(10)/ 2(11)	8	79.9	.	79.9	8.3	.	0.947	4.6	4.6	3.7	323.4	.	67.3	409.0
11	3/ 5	3	75.2	6.8	82.0	2.2	.	0.984	1.3	1.3	0.9	324.4	.	67.3	410.3

TABLEAU 59 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

albedo = 15.
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	0.1	250.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	7.6
4	17/19	3	242.5	28.3	270.8	5.7	5.7	.	.	5.7	.	15.1	13.3
4	20/21	2	250.0	3.2	253.2	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	20.0
4	22/23	2	246.5	7.5	254.0	5.0	5.0	.	.	5.0	.	.	25.0
4	24/27	4	249.0	.	249.0	15.2	15.2	.	.	15.2	.	.	40.2
4	28/29	2	233.8	.	233.8	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	47.4
4/5	30(4)/ 2(5)	3	226.6	.	226.6	11.2	11.2	.	.	11.2	.	.	58.6
5	3/ 5	3	215.4	7.3	222.7	13.8	13.8	.	.	13.8	.	.	72.4
5	6/ 8	3	208.9	0.1	209.0	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	88.0
5	9/12	4	193.4	.	193.4	25.4	25.4	.	.	25.4	.	.	113.4
5	13/14	2	168.0	9.4	177.4	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	120.8
5	15/17	3	170.0	.	170.0	18.4	18.4	.	.	18.4	.	.	139.2
5	18/22	5	151.6	3.0	154.6	21.0	14.6	0.955	6.3	20.9	0.1	.	160.1
5	23/27	5	133.7	16.1	149.8	14.1	9.8	0.969	4.3	14.1	.	.	174.2
5	28/31	4	135.7	0.9	136.6	17.9	.	0.878	16.6	16.6	1.3	.	190.9
6	1/ 7	7	119.9	16.7	136.6	33.3	.	0.785	29.4	29.4	3.9	.	220.2
6	8/11	4	107.3	0.1	107.4	24.9	.	0.834	17.9	17.9	7.0	.	238.1
6	12/14	3	89.5	9.4	98.9	15.5	.	0.893	10.6	10.6	4.9	.	248.6
6	15/17	3	88.4	0.2	88.6	13.8	.	0.905	8.4	8.4	5.4	.	257.1
6	18/20	3	80.1	.	80.1	14.3	.	0.901	7.9	7.9	6.4	.	265.0
6	21/25	5	72.2	.	72.2	27.8	.	0.817	13.2	13.2	14.6	.	278.2
6	26/27	2	59.0	5.5	64.5	7.9	.	0.944	3.6	3.6	4.3	.	281.8

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE		CUMUL
											partiel cumulé	partiel cumulé	partiel cumulé	partiel cumulé	ETt
6	28/30	3	60.9	0.6	61.5	15.9	.	0.891	6.7	6.7	9.2	57.1	.	15.1	288.5
7	1/ 8	8	54.8	.	54.8	46.8	.	0.711	15.8	15.8	31.0	88.0	.	15.1	304.4
7	9/12	4	38.9	8.1	47.0	13.5	.	0.907	4.4	4.4	9.1	97.1	.	15.1	308.8
7	13/17	5	42.6	.	42.6	30.8	.	0.799	8.6	8.6	22.2	119.4	.	15.1	317.3
7	18/21	4	34.1	2.1	36.2	26.5	.	0.824	6.4	6.4	20.1	139.5	.	15.1	323.7
7	22/26	5	29.8	.	29.8	31.0	.	0.797	6.0	6.0	25.0	164.4	.	15.1	329.8
7	27/31	5	23.7	.	23.7	28.5	.	0.812	4.5	4.5	24.1	188.6	.	15.1	334.2
8	1/ 3	3	19.3	0.1	19.4	12.7	.	0.912	1.7	1.7	11.0	199.6	.	15.1	335.9
8	4/ 6	3	17.7	2.6	20.3	16.8	.	0.872	2.6	2.6	16.2	215.8	.	15.1	338.5
8	7/ 8	2	17.7	4.6	22.3	7.7	.	0.946	1.2	1.2	6.5	222.3	.	15.1	339.7
8	9/10	2	21.1	25.1	46.2	4.7	.	0.967	1.5	1.5	3.2	225.4	.	15.1	341.3
8	11/15	5	44.6	1.1	45.7	15.9	.	0.891	5.0	5.0	10.9	235.4	.	15.1	346.2
8	16/19	4	40.8	3.5	44.3	22.2	.	0.851	6.6	6.6	15.6	251.9	.	15.1	352.8
8	20/22	3	37.6	2.9	40.5	9.6	.	0.933	2.7	2.7	6.9	258.8	.	15.1	355.6
8	23/27	5	37.8	.	37.8	24.8	.	0.835	6.2	6.2	18.6	277.4	.	15.1	361.8
8	28/29	2	31.6	0.1	31.7	8.1	.	0.943	1.8	1.8	6.3	283.7	.	15.1	363.6
8	30/31	2	29.9	.	29.9	11.5	.	0.920	2.4	2.4	9.1	292.8	.	15.1	366.0
9	1/ 2	2	27.5	.	27.5	10.6	.	0.926	2.0	2.0	8.6	301.3	.	15.1	368.1
9	3/ 6	4	25.4	38.4	63.8	10.4	.	0.928	4.6	4.6	5.8	307.1	.	15.1	372.7
9	7/10	4	59.2	0.1	59.3	11.1	.	0.923	4.6	4.6	6.5	313.7	.	15.1	377.2
9	11/14	4	54.8	1.4	56.2	15.7	.	0.892	6.0	6.0	9.7	323.3	.	15.1	383.3
9	15/20	6	50.1	56.5	106.6	15.5	.	0.894	11.3	11.3	4.2	327.5	.	15.1	394.5
9	20/25	5	95.3	.	95.3	15.4	.	0.895	10.0	10.0	5.4	332.9	.	15.1	404.6
9	26/27	2	85.3	17.4	102.7	3.1	.	0.978	2.3	2.3	0.8	333.7	.	15.1	406.8
9	28/29	2	100.4	.	100.4	5.1	.	0.964	3.6	3.6	1.5	335.2	.	15.1	410.5
9/10	30(9)/ 6(10)	7	96.8	0.3	97.1	12.2	.	0.916	8.2	8.2	4.0	339.3	.	15.1	418.6
10	7/11	5	89.0	34.0	123.0	10.4	.	0.928	8.9	8.9	1.5	340.8	.	15.1	427.5
10	12/14	3	114.1	5.6	119.7	2.7	.	0.981	2.3	2.3	0.4	341.2	.	15.1	429.8
10	15/16	2	117.4	5.4	122.8	4.0	.	0.972	3.5	3.5	0.5	341.7	.	15.1	433.3
10	17/18	2	119.3	0.8	120.1	2.0	.	0.986	1.7	1.7	0.3	342.0	.	15.1	435.0
10	19/22	4	118.4	.	118.4	2.9	.	0.979	2.4	2.4	0.5	342.5	.	15.1	437.4
10	23/25	3	116.0	3.4	119.4	2.3	.	0.984	2.0	2.0	0.3	342.8	.	15.1	439.4
10/11	26(10)/ 2(11)	8	117.4	0.5	117.9	6.7	.	0.953	5.5	5.5	1.2	344.0	.	15.1	444.9
11	3/ 5	3	112.4	2.3	114.7	2.3	.	0.984	1.9	1.9	0.4	344.4	.	15.1	446.8

TABLEAU 60 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

N E V E R S - 1 9 6 4

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	0.3	250.3	5.9	5.9	.	.	5.9	.	.	5.9
4	17/19	3	244.4	32.9	277.3	5.3	5.3	.	.	5.3	.	22.0	11.2
4	20/21	2	250.0	4.8	254.8	5.1	5.1	.	.	5.1	.	.	16.3
4	22/23	2	249.7	8.6	258.3	3.4	3.4	.	.	3.4	.	4.9	19.7
4	24/27	4	250.0	.	250.0	13.0	13.0	.	.	13.0	.	.	32.7
4	28/29	2	237.0	0.1	237.1	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	39.0
4/5	30(4): 2(5)	3	230.8	.	230.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	.	48.4
5	3/ 5	3	221.4	15.9	237.3	7.0	7.0	.	.	7.0	.	.	55.4
5	6/ 8	3	230.3	0.3	230.6	10.2	10.2	.	.	10.2	.	.	65.6
5	9/12	4	220.4	.	220.4	16.7	16.7	.	.	16.7	.	.	82.3
5	13/14	2	203.7	0.5	204.2	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	87.6
5	15/17	3	198.9	.	198.9	14.8	14.8	.	.	14.8	.	.	102.4
5	18/22	5	184.1	3.4	187.5	19.1	19.1	.	.	19.1	.	.	121.5
5	23/27	5	168.4	41.8	210.2	13.6	13.6	.	.	13.6	.	.	135.1
5	28/31	4	196.6	.	196.6	17.7	17.7	.	.	17.7	.	.	152.8
6	1/ 7	7	178.9	15.3	194.2	29.1	29.1	.	.	29.1	.	.	181.9
6	8/11	4	165.1	.	165.1	19.7	19.7	.	.	19.7	.	.	201.6
6	12/14	3	145.4	36.5	181.9	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	215.9
6	15/17	3	167.6	.	167.6	13.2	13.2	.	.	13.2	.	.	229.1
6	18/20	3	154.4	2.3	156.7	12.9	12.9	.	.	12.9	.	.	242.0
6	21/25	5	143.8	.	143.8	18.9	3.8	0.896	14.5	18.3	0.6	.	260.3
6	26/27	2	125.5	.	125.5	8.2	.	0.942	7.2	7.2	1.0	.	267.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
6	28/30	3	118.3	0.2	118.5	13.9	.	0.904	11.4	11.4	2.5	4.1	278.9
7	1/ 8	8	107.1	.	107.1	43.5	.	0.728	29.1	29.1	14.4	18.5	308.0
7	9/12	4	78.0	11.1	89.1	12.5	.	0.914	7.7	7.7	4.8	23.3	315.7
7	13/17	5	81.4	.	81.4	28.3	.	0.814	15.2	15.2	13.1	36.4	330.9
7	18/21	4	66.2	13.6	79.8	19.5	.	0.868	10.6	10.6	8.9	45.4	341.4
7	22/26	5	69.3	.	69.3	30.6	.	0.800	13.9	13.9	16.7	62.1	355.3
7	27/31	5	55.4	.	55.4	24.9	.	0.834	9.2	9.2	15.7	77.8	364.5
8	1/ 3	3	46.2	.	46.2	11.3	.	0.921	3.6	3.6	7.7	85.5	368.1
8	4/ 6	3	42.6	5.1	47.7	14.8	.	0.897	4.9	4.9	9.9	95.4	373.0
8	7/ 8	2	42.8	10.2	53.0	6.4	.	0.955	2.4	2.4	4.0	99.4	375.4
8	9/10	2	50.6	30.3	80.9	4.8	.	0.966	2.7	2.7	2.1	101.4	378.2
8	11/15	5	78.1	7.9	86.0	13.7	.	0.906	8.1	8.1	5.6	107.0	386.3
8	16/19	4	77.9	14.9	92.8	17.4	.	0.881	11.0	11.0	6.4	113.4	397.3
8	20/22	3	81.8	0.1	81.9	7.8	.	0.945	4.5	4.5	3.3	116.8	401.7
8	23/27	5	77.5	.	77.5	21.7	.	0.854	11.3	11.3	10.4	127.2	413.0
8	28/29	2	66.2	0.6	66.8	6.9	.	0.951	3.3	3.3	3.6	130.8	416.3
8	30/31	2	63.5	.	63.5	8.8	.	0.938	3.9	3.9	4.9	135.7	420.2
9	1/ 2	2	59.6	0.2	59.8	7.4	.	0.948	3.1	3.1	4.3	140.0	423.3
9	3/ 6	4	56.7	13.1	69.8	11.0	.	0.924	5.3	5.3	5.7	145.6	428.7
9	7/10	4	64.4	.	64.4	9.6	.	0.933	4.3	4.3	5.3	150.9	433.0
9	11/14	4	60.1	1.3	61.4	15.2	.	0.896	6.4	6.4	8.8	159.7	439.4
9	15/20	6	55.0	51.5	106.5	14.0	.	0.904	10.2	10.2	3.8	163.5	449.6
9	21/25	5	96.3	.	96.3	12.1	.	0.916	8.0	8.0	4.1	167.6	457.6
9	26/27	2	88.3	14.8	103.1	2.4	.	0.983	1.8	1.8	0.6	168.2	459.4
9	28/29	2	101.3	.	101.3	4.0	.	0.972	2.9	2.9	1.1	169.3	462.3
9/10	30(9)/ 6(10)	7	98.4	8.7	107.1	11.3	.	0.922	8.4	8.4	2.9	172.2	470.7
10	7/11	5	98.7	25.4	124.1	8.8	.	0.939	7.6	7.6	1.2	173.4	478.3
10	12/14	3	116.5	7.9	124.4	3.0	.	0.979	2.6	2.6	0.4	173.8	480.9
10	15/16	2	121.8	5.9	127.7	3.3	.	0.977	2.9	2.9	0.4	174.2	483.8
10	17/18	2	124.8	1.6	126.4	1.5	.	0.989	1.4	1.4	0.1	174.3	485.2
10	19/22	4	125.0	.	125.0	2.4	.	0.983	2.1	2.1	0.3	174.6	487.3
10	23/25	3	122.9	7.5	130.4	1.7	.	0.988	1.6	1.6	0.1	174.7	488.9
10/11	26(10)/ 2(11)	8	128.8	.	128.8	5.0	.	0.965	4.5	4.5	0.5	175.2	493.4
11	3/ 5	3	124.3	2.0	126.3	1.4	.	0.990	1.3	1.3	0.1	175.3	494.7

TABLEAU 61 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1963

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman
albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	18.4	268.4	30.8	30.8	.	.	30.8	.	.	30.8
4	23/24	2	237.6	5.3	242.9	5.1	5.1	.	.	5.1	.	.	35.9
4	25/27	3	237.8	.	237.8	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	42.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.6	9.7	241.3	16.0	16.0	.	.	16.0	.	.	58.1
5	3/ 6	4	225.3	0.3	225.6	13.2	13.2	.	.	13.2	.	.	71.3
5	7/ 8	2	212.4	3.3	215.7	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	81.1
5	9/10	2	205.9	7.1	213.0	6.9	6.9	.	.	6.9	.	.	88.0
5	11/12	2	206.1	.	206.1	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	95.4
5	13/14	2	198.7	10.1	208.8	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	102.1
5	15/17	3	202.1	0.2	202.3	12.3	12.3	.	.	12.3	.	.	114.4
5	18/19	2	190.0	.	190.0	7.0	7.0	.	.	7.0	.	.	121.4
5	20/23	4	183.0	20.3	203.3	11.7	11.7	.	.	11.7	.	.	133.1
5	24/25	2	191.6	2.5	194.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	141.4
5	26/29	4	185.8	4.1	189.9	13.2	13.2	.	.	13.2	.	.	154.6
5	30/31	2	176.7	.	176.7	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	162.2
6	1/ 7	7	169.1	28.5	197.6	26.7	26.7	.	.	26.7	.	.	188.9
6	8/ 9	2	170.9	.	170.9	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	196.5
6	10/15	6	163.3	19.3	182.6	20.8	20.8	.	.	20.8	.	.	217.3
6	16/17	2	161.8	.	161.8	9.3	9.3	.	.	9.3	.	.	226.6
6	18/23	6	152.5	1.9	154.4	25.4	25.4	.	.	25.4	.	.	252.0
6	24/25	2	129.0	1.0	130.0	7.8	7.8	.	.	7.8	.	.	259.8
6	26/28	3	122.2	46.7	168.9	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	270.5
6/7	29(6)/ 1(7)	3	158.2	.	158.2	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	281.5
7	2/ 5	4	147.2	1.5	148.7	16.6	16.6	.	.	16.6	.	.	298.1
7	6/12	7	132.1	14.7	146.8	28.6	28.6	.	.	28.6	.	.	326.7

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	13	1	118.2	2.5	120.7	2.3	2.3	.	28.4	2.3	.	.	329.0
7	14/21	8	118.4	.	118.4	40.5	8.4	0.742	.	36.8	3.7	.	365.8
7	22/25	4	81.6	52.4	134.0	19.5	19.5	.	.	19.5	3.7	.	385.3
7	26/31	6	114.5	.	114.5	39.0	4.5	0.724	30.4	34.9	4.1	.	420.2
8	1/ 7	7	79.6	66.4	146.0	22.4	22.4	.	.	22.4	7.8	.	442.6
8	8/10	3	123.6	2.8	126.4	7.7	7.7	.	.	7.7	7.8	.	450.3
8	11/15	5	118.7	2.5	121.2	17.3	11.2	0.945	6.0	17.2	0.1	.	467.5
8	16/21	6	104.0	23.0	127.0	22.9	17.0	0.947	5.9	22.8	0.1	.	490.4
8	22/24	3	104.1	6.5	110.6	9.3	0.6	0.923	8.4	9.0	0.2	.	499.4
8	25/28	4	101.6	7.6	109.2	14.3	.	0.876	13.5	13.5	0.8	.	513.0
8/9	29(8)/ 3(9)	6	95.6	6.3	101.9	16.1	.	0.862	14.0	14.0	2.1	.	527.0
9	4/ 6	3	87.9	4.3	92.2	5.4	.	0.952	4.5	4.5	0.9	.	531.4
9	7/12	6	87.7	2.3	90.0	12.7	.	0.890	9.9	9.9	2.8	.	541.4
9	13/15	3	80.1	.	80.1	4.4	.	0.961	3.2	3.2	1.2	.	544.5
9	16/22	7	77.0	1.8	78.8	15.9	.	0.864	10.7	10.7	5.2	.	555.2
9	23	1	68.1	19.5	87.6	1.0	.	0.991	0.8	0.8	0.2	.	556.0
9	24/27	4	86.8	11.3	98.1	6.8	.	0.940	5.9	5.9	0.9	.	561.9
9	28/29	2	92.2	.	92.2	8.7	.	0.967	3.1	3.1	0.6	.	565.0
9/10	30(9)/ 7(10)	8	89.1	29.7	118.8	9.2	8.8	0.996	0.4	9.2	.	.	574.2
10	8	1	109.6	.	109.6	1.3	.	0.988	1.3	1.3	.	.	575.5
10	9/10	2	108.3	.	108.3	2.4	.	0.978	2.3	2.3	0.1	.	577.9
10	11/12	2	105.9	.	105.9	3.7	.	0.967	3.5	3.5	0.2	.	581.4
10	13/14	2	102.4	.	102.4	2.8	.	0.975	2.6	2.6	0.2	.	584.0
10	15/16	2	99.8	.	99.8	2.5	.	0.977	2.3	2.3	0.2	.	586.2
10	17	1	97.6	1.3	98.9	1.0	.	0.991	0.9	0.9	0.1	.	587.1
10	18/19	2	98.0	.	98.0	2.3	.	0.979	2.0	2.0	0.3	.	589.2
10	20/21	2	95.9	.	95.9	2.5	.	0.977	2.2	2.2	0.3	.	591.3
10	22/23	2	93.7	.	93.7	72.7	.	0.976	2.3	2.3	0.4	.	593.6
10	24/26	3	91.5	.	91.5	2.6	.	0.977	2.1	2.1	0.5	.	595.8
10	27/29	3	89.3	.	89.3	1.5	.	0.986	1.2	1.2	0.3	.	597.0
10/11	30(10)/ 6(11)	8	88.1	28.9	117.0	6.8	6.8	.	.	6.8	.	.	603.8
11	7/ 8	2	110.2	2.5	112.7	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	605.9
11	9/12	4	110.6	30.8	141.4	5.8	5.8	.	.	5.8	.	.	611.7
11	13/14	2	135.6	17.2	152.8	0.8	0.8	.	.	0.8	.	.	612.5
11	15/21	7	152.0	63.6	215.6	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	618.1

TABLEAU 62 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 3

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	11.0	261.0	29.4	29.4	.	.	29.4	.	.	29.4
4	23/24	2	231.6	9.6	241.2	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	34.3
4	25/27	3	236.3	.	236.3	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	39.5
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.1	8.9	240.0	16.0	16.0	.	.	16.0	.	.	55.5
5	3/ 6	4	224.0	0.9	224.9	12.4	12.4	.	.	12.4	.	.	67.9
5	7/ 8	2	212.5	2.5	215.0	9.7	9.7	.	.	9.7	.	.	77.6
5	9/10	2	205.3	4.9	210.2	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	83.8
5	11/12	2	204.0	.	204.0	8.2	8.2	.	.	8.2	.	.	92.0
5	13/14	2	195.8	11.2	207.0	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	98.2
5	15/17	3	200.8	0.3	201.1	10.8	10.8	.	.	10.8	.	.	109.0
5	18/19	2	190.3	.	190.3	6.5	6.5	.	.	6.5	.	.	115.5
5	20/23	4	183.8	27.8	211.6	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	126.2
5	24/25	2	200.9	.	200.9	8.5	8.5	.	.	8.5	.	.	134.7
5	26/29	4	192.4	29.0	221.4	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	148.1
5	30/31	2	208.0	.	208.0	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	156.1
6	1/ 7	7	200.0	5.8	205.8	31.5	31.5	.	.	31.5	.	.	187.6
6	8/ 9	2	174.3	.	174.3	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	195.2
6	10/15	6	166.7	9.1	175.8	18.0	18.0	.	.	18.0	.	.	213.2
6	16/17	2	157.8	.	157.8	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	223.0
6	18/23	6	148.0	4.9	152.9	27.1	27.1	.	.	27.1	.	.	250.1
6	24/25	2	125.8	10.2	136.0	9.5	9.5	.	.	9.5	.	.	259.6
6	26/28	3	126.5	24.6	151.1	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	271.5
6/7	29(6)/ 1(7)	3	139.2	1.9	141.1	12.9	12.9	.	.	12.9	.	.	284.4
7	2/ 5	4	128.2	26.5	154.7	17.0	17.0	.	.	17.0	.	.	301.4
7	6/12	7	137.7	5.6	143.3	30.4	30.4	.	.	30.4	.	.	331.8

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	13	1	112.9	3.6	116.5	2.7	2.7	.	.	2.7	.	.	334.5
7	14/21	8	113.8	.	113.8	39.6	3.8	0.717	31.2	35.0	4.6	.	369.5
7	22/25	4	78.8	8.9	87.7	21.2	.	0.821	15.7	15.7	5.5	.	385.2
7	26/31	6	72.0	.	72.0	37.4	.	0.705	21.3	21.3	16.1	.	406.5
8	1/ 7	7	50.7	80.5	131.2	21.1	21.1	.	.	21.1	.	.	427.6
8	8/10	3	110.1	2.9	113.0	7.6	3.0	0.959	4.5	7.6	26.2	.	435.1
8	11/15	5	105.5	9.6	115.1	16.7	5.1	0.898	11.2	16.3	0.4	.	451.4
8	16/21	6	98.8	24.2	123.0	22.5	13.0	0.916	9.2	22.3	0.2	.	473.6
8	22/24	3	100.8	6.8	107.6	8.6	.	0.924	8.2	8.2	0.4	.	481.8
8	25/28	4	99.4	1.8	101.2	14.2	.	0.877	12.4	12.4	1.8	.	494.3
8/9	29(8)/ 3(9)	6	88.7	4.1	92.8	18.9	.	0.840	14.9	14.9	4.0	.	509.1
9	4/ 6	3	78.0	4.6	82.6	4.9	.	0.956	3.6	3.6	1.3	.	512.7
9	7/12	6	79.0	1.7	80.7	11.9	.	0.897	8.3	8.3	3.6	.	521.1
9	13/15	3	72.3	.	72.3	4.4	.	0.961	2.9	2.9	1.5	.	523.9
9	16/22	7	69.5	.	69.5	15.7	.	0.866	9.3	9.3	6.4	.	533.3
9	23	1	60.1	.	60.1	1.2	.	0.989	0.7	0.7	0.5	.	533.9
9	24/27	4	59.5	8.0	67.5	7.6	.	0.933	4.5	4.5	3.1	.	538.5
9	28/29	2	62.9	.	62.9	3.7	.	0.967	2.1	2.1	1.6	.	540.6
9/10	30(9)/ 7(10)	8	60.8	18.0	78.8	9.7	.	0.915	6.7	6.7	3.0	.	547.3
10	8	1	72.1	.	72.1	0.8	.	0.993	0.5	0.5	0.3	.	547.8
10	9/10	2	71.6	.	71.6	2.7	.	0.976	1.7	1.7	1.0	.	549.5
10	11/12	2	69.9	.	69.9	3.0	.	0.973	1.9	1.9	1.1	.	551.4
10	13/14	2	68.0	.	68.0	2.7	.	0.976	1.7	1.7	1.0	.	553.1
10	15/16	2	66.3	.	66.3	2.7	.	0.976	1.6	1.6	1.1	.	554.7
10	17	1	64.7	0.5	65.2	1.2	.	0.989	0.7	0.7	0.5	.	555.4
10	18/19	2	64.5	.	64.5	2.5	.	0.977	1.5	1.5	1.0	.	556.9
10	20/21	2	63.0	.	63.0	2.7	.	0.976	1.5	1.5	1.2	.	558.4
10	22/23	2	61.5	.	61.5	2.4	.	0.978	1.3	1.3	1.1	.	559.7
10	24/26	3	60.2	.	60.2	3.3	.	0.970	1.8	1.8	1.5	.	561.5
10	27/29	3	58.4	.	58.4	1.3	.	0.988	0.7	0.7	0.1	.	562.2
10/11	30(10)/ 6(11)	8	57.7	56.1	113.8	7.6	3.8	0.966	3.8	7.6	64.5	.	569.8
11	7/ 8	2	106.2	0.6	106.8	2.7	.	0.976	2.6	2.6	0.1	.	572.4
11	9/12	4	104.2	13.8	118.0	5.4	5.4	.	.	5.4	.	.	577.8
11	13/14	2	112.6	17.9	130.5	1.4	1.4	.	.	1.4	.	.	579.2
11	15/21	7	129.1	10.4	139.5	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	584.5

TABLEAU 63 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

N E V E R S - 1 9 6 3

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	f ETP	(RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	18.1	268.1	25.2	25.2	.	.	25.2	.	.	25.2
4	23/24	2	242.9	4.3	247.2	4.4	4.4	.	.	4.4	.	.	29.6
4	25/27	3	242.8	.	242.8	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	35.7
4/5	28(4)/ 2(5)	5	236.7	6.8	243.5	14.5	14.5	.	.	14.5	.	.	50.2
5	3/ 6	4	229.0	0.5	229.5	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	61.2
5	7/ 8	2	218.5	6.7	225.2	8.7	8.7	.	.	8.7	.	.	69.9
5	9/10	2	216.5	3.1	219.6	5.6	5.6	.	.	5.6	.	.	75.5
5	11/12	2	214.0	.	214.0	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	82.9
5	13/14	2	206.6	13.6	220.2	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	88.2
5	15/17	3	214.9	0.3	215.2	8.9	8.9	.	.	8.9	.	.	97.1
5	18/19	2	206.3	.	206.3	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	103.1
5	20/23	4	200.3	30.4	230.7	12.0	12.0	.	.	12.0	.	.	115.1
5	24/25	2	218.7	.	218.7	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	123.0
5	26/29	4	210.8	35.0	245.8	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	136.4
5	30/31	2	232.4	.	232.4	9.0	9.0	.	.	9.0	.	.	145.4
6	1/ 7	7	223.4	19.3	242.7	28.0	28.0	.	.	28.0	.	.	173.4
6	8/ 9	2	214.7	.	214.7	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	179.8
6	10/15	6	208.3	29.4	237.7	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	195.4
6	16/17	2	222.1	.	222.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	203.0
6	18/23	6	214.5	2.9	217.4	23.9	23.9	.	.	23.9	.	.	226.9
6	24/25	2	193.5	15.0	208.5	8.2	8.2	.	.	8.2	.	.	235.1
6	28/28	3	200.3	27.7	228.0	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	246.5
6/7	29(6)/ 1(7)	3	216.6	17.6	234.2	11.6	11.6	.	.	11.6	.	.	258.1
7	2/ 5	4	222.6	3.2	225.8	15.8	15.8	.	.	15.8	.	.	273.9
7	6/12	7	210.0	17.8	227.8	30.2	30.2	.	.	30.2	.	.	304.1

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	13	1	197.6	5.3	202.9	3.0	3.0	.	.	3.0	.	.	307.1
7	14/21	8	199.9	.	199.9	40.6	40.6	.	.	40.6	.	.	347.7
7	22/25	4	159.3	0.9	160.2	18.3	18.3	.	.	18.3	.	.	366.0
7	26/31	6	141.9	.	141.9	29.7	29.7	.	.	29.7	.	.	395.7
8	1/ 7	7	112.2	92.8	205.0	21.6	21.6	.	.	21.6	.	.	417.3
8	8/10	3	183.4	4.5	187.9	6.9	6.9	.	.	6.9	.	.	424.2
8	11/15	5	181.0	6.1	187.1	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	438.5
8	16/21	6	172.8	29.0	201.8	18.6	18.6	.	.	18.6	.	.	457.1
8	22/24	3	183.2	9.8	193.0	8.7	8.7	.	.	8.7	.	.	465.8
8	25/28	4	184.3	2.8	187.1	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	477.7
8/9	29(8)/ 3(9)	6	175.2	4.6	179.8	18.3	18.3	.	.	18.3	.	.	496.0
9	4/ 6	3	161.5	5.9	167.4	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	501.3
9	7/12	6	162.1	.	162.1	12.5	12.5	.	.	12.5	.	.	513.8
9	13/15	3	149.6	.	149.6	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	518.7
9	16/22	7	144.7	.	144.7	14.7	14.7	.	.	14.7	.	.	533.4
9	23	1	130.0	7.0	137.0	1.7	1.7	.	.	1.7	.	.	535.1
9	24/27	4	135.3	20.1	155.4	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	541.4
9	28/29	2	149.1	.	149.1	3.2	3.2	.	.	3.2	.	.	544.6
9/10	30(9)/ 7(10)	8	145.9	20.6	166.5	8.6	8.6	.	.	8.6	.	.	553.2
10	8	1	157.9	.	157.9	0.9	0.9	.	.	0.9	.	.	554.1
10	9/10	2	157.0	.	157.0	1.6	1.6	.	.	1.6	.	.	555.7
10	11/12	2	155.4	.	155.4	2.4	2.4	.	.	2.4	.	.	558.1
10	13/14	2	153.0	0.2	153.2	2.5	2.5	.	.	2.5	.	.	560.6
10	15/16	2	150.7	.	150.7	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	562.4
10	17	1	148.9	0.4	149.3	0.8	0.8	.	.	0.8	.	.	563.2
10	18/19	2	148.5	.	148.5	1.9	1.9	.	.	1.9	.	.	565.1
10	20/21	2	146.6	.	146.6	2.4	2.4	.	.	2.4	.	.	567.5
10	22/23	2	144.2	.	144.2	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	569.6
10	24/26	3	142.1	.	142.1	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	571.7
10	27/29	3	140.0	.	140.0	1.7	1.7	.	.	1.7	.	.	573.4
10/11	30(10)/ 6(11)	8	138.3	32.0	170.3	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	580.1
11	7/ 8	2	163.6	3.8	167.4	2.1	2.1	.	.	2.1	.	.	582.2
11	9/12	4	165.3	20.9	186.2	4.0	4.0	.	.	4.0	.	.	586.2
11	13/14	2	182.2	19.0	201.2	1.2	1.2	.	.	1.2	.	.	587.4
11	15/21	7	200.0	21.5	221.5	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	592.7

TABLEAU 64 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

CHATEAUX - 1964

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Analyse par séquences de temps

Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	0.5	250.5	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	7.4
4	17/19	3	243.1	57.8	300.9	4.2	4.2	.	.	4.2	.	46.7	11.6
4	20/21	2	250.0	8.4	258.4	5.7	5.7	.	.	5.7	.	49.4	17.3
4	22/23	2	250.0	22.4	272.4	4.5	4.5	.	.	4.5	.	67.3	21.8
4	24/27	4	250.0	.	250.0	14.9	14.9	.	.	14.9	.	67.3	36.7
4	28/29	2	235.1	1.0	236.1	6.1	6.1	.	.	6.1	.	67.3	42.8
4/5	30(4)/ 2(5)	3	230.0	.	230.0	11.3	11.3	.	.	11.3	.	67.3	54.1
5	3/ 5	3	218.7	18.3	237.0	7.3	7.3	.	.	7.3	.	67.3	61.4
5	6/ 8	3	229.7	.	229.7	11.3	11.3	.	.	11.3	.	67.3	72.7
5	9/12	4	218.4	.	218.4	19.6	19.6	.	.	19.6	.	67.3	92.3
5	13/14	2	198.8	.	198.8	6.4	6.4	.	.	6.4	.	67.3	98.7
5	15/17	3	192.4	.	192.4	17.2	17.2	.	.	17.2	.	67.3	115.9
5	18/22	5	175.2	2.3	177.5	19.2	19.2	.	.	19.2	.	67.3	135.1
5	23/27	5	158.3	12.0	170.3	9.8	9.8	.	.	9.8	.	67.3	144.9
5	28/31	4	160.5	3.2	163.7	18.9	18.9	.	.	18.9	.	67.3	163.8
6	1/ 7	7	144.8	27.6	172.4	30.1	30.1	.	.	30.1	.	67.3	193.9
6	8/11	4	142.3	.	142.3	20.6	20.6	.	.	20.6	.	67.3	214.5
6	12/14	3	121.7	8.7	130.4	11.4	11.4	.	.	11.4	.	67.3	225.9
6	15/17	3	119.0	0.2	119.2	13.0	9.2	0.965	3.8	13.0	.	67.3	238.9
6	18/20	3	106.2	.	106.2	11.3	.	0.901	10.5	10.5	0.8	67.3	249.4
6	21/25	5	95.7	.	95.7	26.7	.	0.780	21.1	21.1	5.6	67.3	270.5
6	26/27	2	74.6	.	74.6	8.9	.	0.921	5.9	5.9	3.0	67.3	276.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFL)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
6	28/30	3	68.7	.	68.7	17.2	.	0.852	10.2	10.2	7.0	16.4	286.6
7	1/ 8	8	58.5	.	58.5	44.3	.	0.852	19.8	19.8	24.5	40.9	306.4
7	9/12	4	38.7	14.5	53.2	13.4	.	0.852	6.2	6.2	7.2	48.1	312.6
7	13/17	5	47.0	.	47.0	28.7	.	0.765	11.0	11.0	17.7	65.8	323.6
7	18/21	4	36.0	2.8	38.8	23.2	.	0.805	7.5	7.5	15.7	81.4	331.2
7	22/26	5	31.2	.	31.2	29.9	.	0.756	7.6	7.6	22.3	103.7	338.8
7	27/31	5	23.6	.	23.6	28.2	.	0.769	5.5	5.5	22.7	126.4	344.3
8	1/ 3	3	18.1	.	18.1	12.7	.	0.889	2.0	2.0	10.7	137.1	346.3
8	4/ 6	3	16.1	0.2	16.3	17.7	.	0.848	2.5	2.5	15.2	152.3	348.8
8	7/ 8	2	13.8	1.8	15.6	7.8	.	0.930	1.1	1.1	6.7	159.0	349.9
8	9/10	2	14.5	2.0	16.5	5.7	.	0.949	0.8	0.8	4.9	163.9	350.7
8	11/15	5	15.7	.	15.7	17.1	.	0.854	2.3	2.3	14.8	178.7	353.0
8	16/19	4	13.4	10.9	24.3	20.8	.	0.824	4.3	4.3	16.5	195.2	357.3
8	20/22	3	20.0	4.6	24.6	7.8	.	0.931	1.7	1.7	6.1	201.3	359.0
8	23/27	5	22.9	.	22.9	27.4	.	0.775	5.2	5.2	24.2	223.6	364.1
8	28/29	2	17.8	.	17.8	8.2	.	0.927	1.3	1.3	6.3	230.5	365.4
8	30/31	2	16.5	.	16.5	11.5	.	0.898	1.7	1.7	9.8	240.3	367.1
9	1/ 2	2	14.8	3.0	17.8	10.0	.	0.911	1.6	1.6	8.4	248.7	368.7
9	3/ 6	4	16.2	14.5	30.7	9.2	.	0.919	2.5	2.5	6.7	255.4	371.2
9	7/10	4	28.2	.	28.2	10.8	.	0.905	2.7	2.7	8.1	263.5	373.9
9	11/14	4	25.5	0.2	25.7	15.8	.	0.864	3.5	3.5	12.3	275.8	377.4
9	15/20	6	22.2	37.5	59.7	13.8	.	0.881	7.1	7.1	6.7	282.5	384.5
9	21/25	5	52.6	2.3	54.9	15.0	.	0.871	7.1	7.1	7.9	290.4	391.6
9	26/27	2	47.8	9.2	57.0	3.9	.	0.965	2.0	2.0	1.9	292.3	393.6
9	28/29	2	55.0	.	55.0	4.7	.	0.958	2.3	2.3	2.4	294.7	395.9
9/10	30(9)/ 6(10)	7	52.7	.	52.7	11.8	.	0.898	5.4	5.4	6.4	301.1	401.3
10	7/11	5	47.3	21.8	69.1	7.3	.	0.935	4.5	4.5	2.8	303.9	405.8
10	12/14	3	64.6	8.1	72.7	2.9	.	0.974	1.9	1.9	1.0	304.9	407.7
10	15/16	2	70.8	.	70.8	4.0	.	0.964	2.6	2.6	1.4	306.4	410.2
10	17/18	2	68.3	.	68.3	1.9	.	0.983	1.2	1.2	0.7	307.1	411.4
10	19/22	4	67.1	.	67.1	3.2	.	0.971	1.9	1.9	1.3	308.4	413.3
10	23/25	3	65.2	5.8	71.0	2.5	.	0.977	1.6	1.6	0.9	309.3	414.9
10/11	26(10)/ 2(11)	8	69.4	.	69.4	8.3	.	0.927	5.1	5.1	3.2	312.5	420.0
11	3/ 5	3	64.3	6.8	71.1	2.2	.	0.980	1.4	1.4	0.8	313.3	421.4

TABLEAU 65 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETT	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETT
4	15/16	2	250.0	0.1	250.1	7.6	7.6	.	.	7.6	.	.	7.6
4	17/19	3	242.5	28.3	270.8	5.7	5.7	.	.	5.7	.	15.1	13.3
4	20/21	2	250.0	3.2	253.2	6.7	6.7	.	.	6.7	.	.	20.0
4	22/23	2	246.5	7.5	254.0	5.0	5.0	.	.	5.0	.	.	25.0
4	24/27	4	249.0	0	249.0	15.2	15.2	.	.	15.2	.	.	40.2
4	28/29	2	233.8	.	233.8	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	47.4
4/5	30(4)/ 2(5)	3	226.6	.	226.6	11.2	11.2	.	.	11.2	.	.	58.6
5	3/ 5	3	215.4	7.3	222.7	13.8	13.8	.	.	13.8	.	.	72.4
5	6/ 8	3	208.9	0.1	209.0	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	88.0
5	9/12	4	193.4	.	193.4	25.4	25.4	.	.	25.4	.	.	113.4
5	13/14	2	168.0	9.4	177.4	7.4	7.4	.	.	7.4	.	.	120.8
5	15/17	3	170.0	.	170.0	18.4	18.4	.	.	18.4	.	.	139.2
5	18/22	5	151.6	3.0	154.6	21.0	21.0	.	.	21.0	.	.	160.2
5	23/27	5	133.6	16.1	149.7	14.1	14.1	.	.	14.1	.	.	174.3
5	28/31	4	135.6	0.9	136.5	17.9	17.9	.	.	17.9	.	.	192.2
6	1/ 7	7	118.6	16.7	135.3	33.3	25.3	0.928	7.9	33.2	0.1	0.1	225.4
6	8/11	4	102.1	0.1	102.2	24.9	.	0.792	21.2	21.2	3.7	3.8	246.6
6	12/14	3	81.0	9.4	90.4	15.5	.	0.866	12.1	12.1	3.4	7.1	258.8
6	15/17	3	78.2	0.2	78.4	13.8	.	0.880	9.4	9.4	4.4	11.5	268.2
6	18/20	3	69.0	.	69.0	14.3	.	0.876	8.6	8.6	5.7	17.2	276.8
6	21/25	5	60.4	.	60.4	27.8	.	0.772	13.8	13.8	14.0	31.2	290.6
6	26/27	2	46.6	5.5	52.1	7.9	.	0.929	3.7	3.7	4.2	35.4	294.3

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
6	28/30	3	48.4	0.6	49.0	15.9	.	0.862	6.8	6.8	9.1	44.6	15.1
7	1/ 8	8	42.3	.	42.3	46.8	.	0.646	15.0	15.0	31.8	76.4	15.1
7	9/12	4	27.3	8.1	35.4	13.5	.	0.883	4.1	4.1	9.4	85.8	15.1
7	13/17	5	31.3	.	31.3	30.8	.	0.750	7.8	7.8	23.0	108.7	15.1
7	18/21	4	23.4	2.1	25.5	26.5	.	0.780	5.6	5.6	20.9	129.6	15.1
7	22/26	5	19.9	.	19.9	31.0	.	0.748	5.0	5.0	26.0	155.6	15.1
7	27/31	5	14.9	.	14.9	28.6	.	0.766	3.5	3.5	25.1	180.7	15.1
8	1/ 3	3	11.4	0.1	11.5	12.7	.	0.889	1.3	1.3	11.4	192.1	15.1
8	4/ 6	3	10.2	2.6	12.8	18.8	.	0.839	2.1	2.1	16.7	208.9	15.1
8	7/ 8	2	10.8	4.6	15.4	7.7	.	0.931	1.1	1.1	6.6	215.5	15.1
8	9/10	2	14.3	25.1	39.4	4.7	.	0.958	1.7	1.7	3.0	218.5	15.1
8	11/15	5	37.7	1.1	38.8	15.9	.	0.864	5.3	5.3	10.6	229.1	15.1
8	16/19	4	33.5	3.5	37.0	22.2	.	0.813	6.9	6.9	15.3	244.4	15.1
8	20/22	3	30.1	2.9	33.0	9.6	.	0.915	2.8	2.8	6.8	251.2	15.1
8	23/27	5	30.2	.	30.2	24.8	.	0.794	6.2	6.2	18.6	269.8	15.1
8	28/29	2	24.0	0.1	24.1	8.1	.	0.928	1.7	1.7	6.4	276.1	15.1
8	30/31	2	22.3	.	22.3	11.5	.	0.898	2.3	2.3	9.2	285.4	15.1
9	1/ 2	2	20.1	.	20.1	10.6	.	0.906	1.9	1.9	8.7	294.1	15.1
9	3/ 6	4	18.2	38.4	56.6	10.4	.	0.909	5.2	5.2	5.2	299.3	15.1
9	7/10	4	51.4	0.1	51.5	11.1	.	0.903	5.0	5.0	6.1	305.4	15.1
9	11/14	4	46.5	1.4	47.9	15.7	.	0.865	6.5	6.5	9.2	314.6	15.1
9	15/20	6	41.4	56.5	97.9	15.5	.	0.867	13.0	13.0	2.5	317.1	15.1
9	21/25	5	84.9	.	84.9	15.4	.	0.868	11.2	11.2	4.2	321.3	15.1
9	26/27	2	73.7	17.4	91.1	3.1	.	0.972	2.5	2.5	0.6	321.8	15.1
9	28/29	2	88.5	.	88.5	5.1	.	0.954	4.1	4.1	1.0	322.9	15.1
9/10	30(9)/ 6(10)	7	84.5	0.3	84.8	12.2	.	0.894	9.0	9.0	3.2	326.1	15.1
10	7/11	5	75.8	34.0	109.8	10.4	.	0.909	10.0	10.0	0.4	326.5	15.1
10	12/14	3	99.8	5.6	105.4	2.7	.	0.976	2.6	2.6	0.1	326.6	15.1
10	15/16	2	102.8	5.4	108.2	4.0	.	0.964	3.9	3.9	0.1	326.7	15.1
10	17/18	2	104.3	0.8	105.1	2.0	.	0.982	1.9	1.9	0.1	326.8	15.1
10	19/22	4	103.2	.	103.2	2.9	.	0.974	2.7	2.7	0.2	327.0	15.1
10	23/25	3	100.5	3.4	103.9	2.3	.	0.979	2.2	2.2	0.1	327.2	15.1
10/11	26(10)/ 2(11)	8	101.8	0.5	102.3	6.7	.	0.941	6.1	6.1	0.6	327.8	15.1
11	3/ 5	3	96.2	2.3	98.5	2.3	.	0.979	2.0	2.0	0.3	328.1	15.1

TABEAU 66 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

NEVERS - 1964

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Analyse par séquences de temps
Formule de Penman

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	0.3	250.3	5.9	5.9	.	.	5.9	.	.	5.9
4	17/19	3	244.4	32.9	277.3	5.3	5.3	.	.	5.3	.	22.0	11.2
4	20/21	2	250.0	4.8	254.8	5.1	5.1	.	.	5.1	.	22.0	16.3
4	22/23	2	249.7	8.6	258.3	3.4	3.4	.	.	3.4	.	4.9	19.7
4	24/27	4	250.0	.	250.0	13.0	13.0	.	.	13.0	.	26.9	32.7
4	28/29	2	237.0	0.1	237.1	6.3	6.3	.	.	6.3	.	26.9	39.0
4/5	30(4)/ 2(5)	3	230.8	.	230.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	26.9	48.4
5	3/ 5	3	221.4	15.9	237.3	7.0	7.0	.	.	7.0	.	26.9	55.4
5	6/ 8	3	230.3	0.3	230.6	10.2	10.2	.	.	10.2	.	26.9	65.6
5	9/12	4	220.4	.	220.4	16.7	16.7	.	.	16.7	.	26.9	82.3
5	13/14	2	203.7	0.5	204.2	5.3	5.3	.	.	5.3	.	26.9	87.6
5	15/17	3	198.9	.	198.9	14.8	14.8	.	.	14.8	.	26.9	102.4
5	18/22	5	184.1	3.4	187.5	19.1	19.1	.	.	19.1	.	26.9	121.5
5	23/27	5	168.4	41.8	210.2	13.6	13.6	.	.	13.6	.	26.9	135.1
5	28/31	4	196.6	.	196.6	17.7	17.7	.	.	17.7	.	26.9	152.8
6	1/ 7	7	178.9	15.3	194.2	29.1	29.1	.	.	29.1	.	26.9	181.9
6	8/11	4	165.1	.	165.1	19.7	19.7	.	.	19.7	.	26.9	201.6
6	12/14	3	145.4	36.5	181.9	14.3	14.3	.	.	14.3	.	26.9	215.9
6	15/17	3	167.6	.	167.6	13.2	13.2	.	.	13.2	.	26.9	229.1
6	18/20	3	154.4	2.3	156.7	12.9	12.9	.	.	12.9	.	26.9	242.0
6	21/25	5	143.8	.	143.8	18.9	18.9	.	.	18.9	.	26.9	260.9
6	26/27	2	124.9	.	124.9	8.2	8.2	.	.	8.2	.	26.9	269.1

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
6	28/30	3	116.7	0.2	116.9	13.9	6.9	0.937	6.9	13.8	0.1	26.9	282.9
7	1/ 8	8	103.1	.	103.1	43.5	34.4	0.667	34.4	34.4	9.1	26.9	317.3
7	9/12	4	68.7	11.1	79.8	12.5	8.7	0.891	8.7	8.7	3.8	26.9	326.0
7	13/17	5	71.1	.	71.1	28.3	16.5	0.768	16.5	16.5	11.8	26.9	342.5
7	18/21	4	54.6	13.6	68.2	19.5	11.3	0.834	11.3	11.3	8.2	26.9	353.8
7	22/26	5	56.9	9	56.9	30.6	14.2	0.751	14.2	14.2	16.4	26.9	368.0
7	27/31	5	42.7	.	42.7	24.9	8.8	0.793	8.8	8.8	16.1	26.9	376.8
8	1/ 3	3	33.9	.	33.9	11.3	3.4	0.901	3.4	3.4	7.9	26.9	380.2
8	4/ 6	3	30.5	5.1	35.6	14.8	4.6	0.870	4.6	4.6	10.2	26.9	384.8
8	7/ 8	2	31.0	10.2	41.2	6.4	2.4	0.943	2.4	2.4	4.0	26.9	387.2
8	9/10	2	38.8	30.3	69.1	4.8	3.0	0.957	3.0	3.0	1.8	26.9	390.1
8	11/15	5	66.2	7.9	74.1	13.7	8.8	0.882	8.8	8.8	4.9	26.9	398.9
8	16/19	4	65.3	14.9	80.2	17.4	12.0	0.851	12.0	12.0	5.4	26.9	410.9
8	20/22	3	68.2	0.1	68.3	7.8	4.7	0.931	4.7	4.7	3.1	26.9	415.6
8	23/27	5	63.6	.	63.6	21.7	11.6	0.818	11.6	11.6	10.1	26.9	427.2
8	28/29	2	52.0	0.6	52.6	6.9	3.2	0.938	3.2	3.2	3.7	26.9	430.4
8	30/31	2	49.4	.	49.4	8.8	3.9	0.922	3.9	3.9	4.9	26.9	434.3
9	1/ 2	2	45.5	0.2	45.7	7.4	3.0	0.934	3.0	3.0	4.4	26.9	437.3
9	3/ 6	4	42.7	13.1	55.8	11.0	5.4	0.904	5.4	5.4	5.6	26.9	442.7
9	7/10	4	50.4	.	50.4	9.6	4.3	0.916	4.3	4.3	5.3	26.9	447.0
9	11/14	4	46.1	1.3	47.4	15.2	6.2	0.869	6.2	6.2	9.0	26.9	453.2
9	15/20	6	41.2	51.5	92.7	14.0	11.2	0.879	11.2	11.2	2.8	26.9	464.4
9	21/25	5	81.5	.	81.5	12.1	8.6	0.895	8.6	8.6	3.5	26.9	473.0
9	26/27	2	72.5	14.8	87.7	2.4	1.9	0.978	1.9	1.9	0.5	26.9	474.9
9	28/29	2	85.8	.	85.8	4.0	3.1	0.964	3.1	3.1	0.9	26.9	478.0
9/10	30(9)/ 6(10)	7	82.7	8.7	91.4	11.3	9.0	0.902	9.0	9.0	2.3	26.9	487.0
10	7/11	5	82.4	25.4	107.8	8.8	8.3	0.923	8.3	8.3	0.5	26.9	495.3
10	12/14	3	99.5	7.9	107.4	3.0	2.9	0.973	2.9	2.9	0.1	26.9	498.2
10	15/16	2	104.5	5.9	110.4	3.3	2.9	0.970	2.9	3.3	.	26.9	501.5
10	17/18	2	107.1	1.6	108.7	1.5	1.5	0.986	1.5	1.5	.	26.9	503.0
10	19/22	4	107.2	.	107.2	2.4	2.4	0.978	2.4	2.4	.	26.9	505.4
10	23/25	3	104.8	7.5	112.3	1.7	.	.	.	1.7	.	26.9	507.1
10/11	26(10)/ 2(11)	8	110.6	.	110.6	5.0	4.3	0.961	4.3	4.9	0.1	26.9	512.0
11	3/ 5	3	105.7	2.0	107.7	1.4	1.4	0.987	1.4	1.4	.	26.9	513.4




Fig. 111 - a - Courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle pour albedo = 15, à Châteauroux, Bourges, Nevers, et courbes de cumulation de l'évapotranspiration réelle pour un modèle de sol de $RU = 250\text{mm}$ et de $RFU = 140\text{mm}$, au cours de l'année 1963;

b - Evolution de la réserve d'eau du sol.




Fig. 112 - a - Courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle, pour albedo = 15, à Châteauroux, Bourges, Nevers, et courbes de cumulation de l'évapotranspiration réelle pour un modèle de sol de $RU = 250\text{mm}$ et de $RFU = 140\text{mm}$, au cours de l'année 1964.

b - Evolution de la réserve d'eau du sol.




Fig. 113 - Evapotranspiration potentielle, calculée à Nevers par séquences de temps en 1964, pour albedo = 15 et pour albedo modulé selon le stade phénologique de la végétation et selon les conditions météorologiques.





Fig. 114 et 115 - Evapotranspiration potentielle, calculée à Bourges par séquences de temps, selon la formule de Penman et selon la formule aménagée:
1 - formule de Penman;
2 - formule aménagée

TABLEAU 67

BILAN DE L' EAU DES FORMATIONS HERBACEES

TABLEAU RECAPITULATIF

Années 1963 et 1964

	CHATEAUROUX		BOURGES		NEVERS	
	1963	1964	1963	1964	1963	1964
ETP (pour albedo = 25%)	mm	mm	mm	mm	mm	mm
Période longue	603	690	609	747	545	618
Période courte	561	640	566	694	506	578
ETR	mm	mm	mm	mm	mm	mm
1° - modèle de sol:						
RU = 100mm;- RFU = 40mm						
Période longue	538	335	499	375	530	419
Période courte	496	287	458	354	491	380
2° - modèle de sol:						
RU = 100mm;- RFU = 60mm						
Période longue	552	350	512	384	537	429
Période courte	510	300	470	335	499	389
Taux de couverture des besoins en eau:	%	%	%	%	%	%
1° - modèle de sol:100 : 40 mm						
Période longue	89	49	82	50	97	68
Période courte	88	45	81	48	97	66
2° - modèle de sol:100 / 60 mm						
Période longue	92	51	84	51	99	69
Période courte	91	49	83	51	99	67



Fig. 116 - Comparaison de bilans hydriques forestiers établis en 1963, pour albedo = 15% et pour albedo modulé selon la phénoménologie et les conditions météorologiques:

- 1 - écarts cumulés entre les ETP calculées à Bourges, pour albedo = 15% et pour albedo modulé.
- 2 - écarts cumulés entre les ETR correspondantes, pour un modèle de sol de RU = 250mm et de RFU = 140mm.
- 3 - écarts cumulés pour modèle de sol de RU=100, -RFU=50.
- 4 - écart moyen par séquences de temps sur le premier terme de l'équation de Penman, calculé à Bourges pour albedo = 15% et pour albedo modulé.
- 5 - écarts cumulés entre les ETP calculées à Nevers, pour albedo = 15% et pour albedo modulé. La courbe est également valable pour les ETR correspondantes, pour un modèle de sol de RU = 250mm et de RFU = 140mm.
- 6 - écarts cumulés entre les ETR à Nevers, pour un modèle de sol de RU=100, -RFU=50.




Fig. 117 - Comparaison de bilans hydriques forestiers établis en 1964, pour albedo = 15% et pour albedo modulé selon la phénoménologie et les conditions météorologiques:

- 1 - écarts cumulés entre les ETP calculées à Bourges, pour albedo = 15% et pour albedo modulé.
- 2 - écarts cumulés entre les ETR correspondantes, pour un modèle de sol de RU = 250mm et de RFU = 140mm.
- 3 - écarts cumulés pour modèle de sol de RU=100, -RFU=50.
- 4 - écart moyen par séquences de temps sur le premier terme de l'équation de Penman, calculé à Bourges pour albedo = 15% et pour albedo modulé.
- 5 - écarts cumulés entre les ETP calculées à Nevers, pour albedo = 15% et pour albedo modulé.
- 6 - écarts cumulés entre les ETR correspondantes, pour un modèle de sol de RU = 250mm et de RFU = 140mm.
- 7 - écarts cumulés pour modèle de sol de RU=100, -RFU=50.





Fig. 118 et 119 - Courbes de cumulation de l'ETP à Bourges, pour albedo = 15%, établies d'après la formule de Penman et d'après la formule aménagée, et courbes de cumulation des ETR correspondantes pour trois modèles de sol.

TABLEAU

BILAN DE L' EAU DES FORMATIONS

ANNEES 1963

Période du 14 avril au 29 octobre 1963

	BOURGES			
	Formule de Penman		Formule aménagée	
	1963	1964	1963	1964
Evapotranspiration potentielle				
FORMATIONS HERBACEES: albedo = 25%	547	687		
FORETS:				
albedo = 15%	627	782	649	802
albedo variable	604	767	626	741
albedo et rayonnement transmis variables	592	721		
Evapotranspiration réelle	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP
FORMATIONS HERBACEES: RU=100, -RFU=40	438 80	319 46		
FORETS:				
albedo = 15% RU=100; -RFU=50	451 72	438 43	452 70	334 42
RU=250; -RFU=110	543 84	439 56	547 84	437 54
RU=250; -RFU=140	562 90	455 58	566 87	452 56
albedo variable RU=100; -RFU=50	449 74	334 44	450 72	330 45
RU=250; -RFU=110	538 89	437 57	542 87	433 58
RU=250; -RFU=140	557 92	453 59	562 90	449 61
albedo et rayonnement transmis variables				
RU=100; -RFU=50	449 76	328 45		
RU=250; -RFU=110	537 91	430 60		
RU=250; -RFU=140	555 94	446 62		

68

FORESTIERES : TABLEAU RECAPITULATIF

ET 1964

et période du 15 avril au 25 octobre 1964.

CHATEAUROUX		NEVERS		PREMERY		RAVEAU	
Formule de Penman		Formule de Penman		Formule aménagée		Formule aménagée	
1963	1964	1963	1964	1963	1964	1963	1964
542	631	489	572				
622	724	573	664	549	640	549	639
603	611	554	647	549	623	551	623
589	585	542	619				
valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP	valeur % brute ETP
477 88	279 44	475 97	374 65				
498 80	293 40	521 91	393 59	534 97	332 52	525 96	375 59
576 93	404 56	571 100	489 74	549 100	437 68	549 100	474 74
597 96	415 57	573 100	507 76	549 100	453 71	549 100	490 77
494 82	292 41	515 93	392 61	526 96	328 53	540 98	371 60
570 95	403 57	553 100	485 75	549 100	433 70	551 100	470 76
589 98	414 58	554 100	503 78	549 100	449 72	551 100	486 78
494 84	287 42	519 96	383 62				
567 96	398 58	542 100	476 77				
584 99	409 60	542 100	495 80				

TABLEAU 69 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 3

Analyse par séquences de temps
Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETT	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETT
4	14/22	9	100.0	11.0	111.0	29.1	29.1	.	.	29.1	.	.	29.1
4	23/24	2	81.9	9.6	91.5	4.3	4.3	.	.	4.3	.	.	33.4
4	25/27	3	87.2	.	87.2	5.7	5.7	.	.	5.7	.	.	39.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	81.5	8.9	90.4	17.7	17.7	.	.	17.7	.	.	56.8
5	3/ 6	4	72.7	0.9	73.6	14.6	14.6	.	.	14.6	.	.	71.4
5	7/ 8	2	59.0	2.5	51.5	10.1	10.1	.	.	10.1	.	.	81.5
5	9/10	2	51.4	4.9	56.3	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	87.6
5	11/12	2	50.2	.	50.2	8.4	0.2	0.843	7.9	8.1	0.3	.	95.7
5	13/14	2	42.1	11.2	53.3	6.2	3.3	0.942	2.9	6.2	.	.	101.9
5	15/17	3	47.1	0.3	47.4	11.0	.	0.796	9.7	9.7	1.3	.	111.6
5	18/19	2	37.7	.	37.7	7.1	.	0.863	5.2	5.2	1.9	.	116.7
5	20/23	4	32.6	27.8	60.4	10.9	10.4	0.989	0.5	10.9	.	.	127.6
5	24/25	2	49.5	.	49.5	9.4	.	0.821	8.9	8.9	0.5	.	136.5
5	26/29	4	40.6	29.0	69.6	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	149.9
5	30/31	2	56.2	.	56.2	8.3	6.2	0.957	2.1	8.3	.	.	158.3
6	1/ 7	7	47.8	5.8	53.6	32.1	3.6	0.551	22.5	26.1	6.0	.	184.4
6	8/ 9	2	27.5	.	27.5	8.3	.	0.841	4.4	4.4	3.9	.	188.8
6	10/15	6	23.1	9.1	32.2	17.4	.	0.699	9.7	9.7	7.7	.	198.5
6	16/17	2	22.5	.	22.5	10.4	.	0.803	4.4	4.4	6.0	.	202.9
6	18/23	6	18.1	4.9	23.0	27.2	.	0.565	10.0	10.0	17.2	.	212.9
6	24/25	2	13.0	10.2	23.2	9.8	.	0.814	4.3	4.3	5.5	.	217.2
6	26/28	3	18.9	24.6	43.5	11.9	.	0.780	9.5	9.5	2.4	.	226.8
6/7	(29)/ 1(7)	3	33.9	1.9	35.8	13.7	.	0.750	8.9	8.9	4.8	.	235.7

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	2/ 5	4	26.9	26.5	53.4	15.6	3.4	0.775	11.2	14.6	1.0	58.4	250.3
7	6/12	7	38.8	5.6	44.4	33.2	.	0.498	22.3	22.3	10.9	69.3	272.6
7	13	1	22.1	3.6	25.7	2.6	.	0.949	1.3	1.3	1.3	70.6	273.9
7	14/21	8	24.4	.	24.4	43.2	.	0.401	14.6	14.6	28.6	99.2	288.5
7	22/25	4	9.8	8.9	18.7	21.2	.	0.639	6.7	6.7	14.5	113.6	295.3
7	26/31	6	11.9	.	11.9	42.8	.	0.397	7.2	7.2	35.6	149.2	302.5
8	1/ 7	7	4.7	80.5	85.2	20.7	20.7	.	.	20.7	.	149.2	323.2
8	8/10	3	64.5	2.9	67.4	7.8	7.8	.	.	7.8	.	149.2	331.0
8	11/15	5	59.6	9.6	69.2	16.9	16.9	.	.	16.9	.	149.2	347.9
8	16/21	6	52.3	24.2	76.5	20.5	20.5	.	.	20.5	.	149.2	368.4
8	22/24	3	56.0	6.8	62.8	8.4	8.4	.	.	8.4	.	149.2	376.8
8	25/28	4	54.4	1.8	56.2	14.1	6.2	0.850	7.5	13.8	0.3	149.6	390.5
8/9	29(8)/ 3(9)	6	42.5	4.1	46.6	18.7	.	0.680	14.9	14.9	3.8	153.4	405.4
9	4/ 6	3	31.7	4.6	36.3	4.7	.	0.909	3.3	3.3	1.4	154.8	408.7
9	7/12	6	33.0	1.7	34.7	16.6	.	0.711	10.0	10.0	6.6	161.3	418.8
9	13/15	3	24.6	.	24.6	4.8	.	0.907	2.3	2.3	2.5	163.8	421.1
9	16/22	7	22.3	.	22.3	14.0	.	0.751	5.6	5.6	8.4	172.3	426.6
9	23	1	16.8	8.0	16.8	1.1	.	0.978	0.4	0.4	0.7	173.0	427.0
9	24/27	4	16.4	.	24.4	7.5	.	0.858	3.5	3.5	4.0	177.1	430.4
9	28/29	2	21.0	.	21.0	4.0	.	0.922	1.6	1.6	2.4	179.4	432.1
9/10	30(9)/ 7(10)	8	19.3	18.0	37.3	13.7	.	0.757	9.1	9.1	4.6	184.0	441.2
10	8	1	28.2	.	28.2	0.9	.	0.982	0.5	0.5	0.4	184.4	441.7
10	9/10	2	27.7	.	27.7	3.0	.	0.941	1.6	1.6	1.4	185.8	443.3
10	11/12	2	26.1	.	26.1	3.1	.	0.939	1.6	1.6	1.5	187.3	444.9
10	13/14	2	24.5	.	24.5	2.7	.	0.947	1.3	1.3	1.4	188.7	446.2
10	15/16	2	23.2	.	23.2	2.5	.	0.951	1.1	1.1	1.4	190.0	447.4
10	17	1	22.0	0.5	22.5	0.8	.	0.984	0.4	0.4	0.5	190.5	447.7
10	18/19	2	22.2	.	22.2	2.0	.	0.960	0.9	0.9	1.1	191.6	448.6
10	20/21	2	21.3	.	21.3	2.7	.	0.947	1.1	1.1	1.6	193.2	449.7
10	22/23	2	20.2	.	20.2	2.6	.	0.949	1.0	1.0	1.6	194.7	450.8
10	24/26	3	19.1	.	19.1	2.7	.	0.947	1.0	1.0	1.7	196.4	451.8
10	27/29	3	18.1	.	18.1	1.2	.	0.976	0.4	0.4	0.2	197.2	452.2

TABLEAU 70 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

BOURGES - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	11.0	261.0	29.1	29.1	.	.	29.1	.	.	29.1
4	23/24	2	231.9	9.6	241.5	4.3	4.3	.	.	4.3	.	.	33.4
4	25/27	3	237.2	.	237.2	5.7	5.7	.	.	5.7	.	.	39.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.5	8.9	240.4	17.7	17.7	.	.	17.7	.	.	56.8
5	3/ 6	4	222.7	0.9	223.6	14.6	14.6	.	.	14.6	.	.	71.4
5	7/ 8	2	209.0	2.5	211.5	10.1	10.1	.	.	10.1	.	.	81.5
5	9/10	2	201.4	4.9	206.3	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	87.6
5	11/12	2	200.2	.	200.2	8.4	8.4	.	.	8.4	.	.	96.0
5	13/14	2	191.8	11.2	203.0	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	102.2
5	15/17	3	196.8	0.3	197.1	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	113.2
5	18/19	2	186.1	.	186.1	7.1	7.1	.	.	7.1	.	.	120.3
5	20/23	4	179.0	27.8	206.8	10.9	10.9	.	.	10.9	.	.	131.2
5	24/25	2	195.9	.	195.9	9.4	9.4	.	.	9.4	.	.	140.6
5	26/29	4	186.5	29.0	215.5	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	154.0
5	30/31	2	202.1	.	202.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	162.3
6	1/ 7	7	193.8	5.8	199.6	32.1	32.1	.	.	32.1	.	.	194.4
6	8/ 9	2	167.5	.	167.5	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	202.7
6	10/15	6	159.2	9.1	168.3	17.4	17.4	.	.	17.4	.	.	220.1
6	16/17	2	150.9	.	150.9	10.4	10.4	.	.	10.4	.	.	230.5
6	18/23	6	140.5	4.5	145.4	27.2	5.4	0.854	20.5	25.9	1.3	.	256.4
6	24/25	2	119.5	10.2	129.7	9.8	.	0.931	8.9	8.9	0.9	.	265.3
6	26/28	3	120.8	24.6	145.4	11.9	5.4	0.954	6.5	11.8	0.1	.	277.2
6/7	29(6)/ 1(7)	3	133.5	1.9	135.4	13.7	.	0.905	12.8	12.8	0.9	.	290.0

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	2/ 5	4	122.6	26.5	149.1	15.6	9.1	0.954	6.4	15.5	0.1	3.2	305.5
7	6/12	7	133.6	5.6	139.2	33.2	.	0.786	29.8	29.8	3.4	6.5	335.4
7	13	1	109.3	3.6	112.9	2.6	.	0.982	2.1	2.1	0.5	7.0	337.4
7	14/21	8	110.9	.	110.9	43.2	.	0.730	29.9	29.9	13.3	20.3	367.4
7	22/25	4	80.9	8.9	89.8	21.2	.	0.857	12.8	12.8	8.4	28.7	380.2
7	26/31	6	77.0	.	77.0	42.8	.	0.731	20.7	20.7	22.1	50.7	400.9
8	1/ 7	7	56.2	80.5	136.7	20.7	.	0.861	19.0	19.0	1.7	52.5	419.9
8	8/10	3	117.8	2.9	120.7	7.8	.	0.945	6.6	6.6	1.2	53.7	426.5
8	11/15	5	114.1	9.6	123.7	16.9	.	0.885	14.2	14.2	2.7	56.3	440.8
8	16/21	6	109.4	24.2	133.6	20.5	.	0.862	18.4	18.4	2.1	58.4	459.2
8	22/24	3	115.2	6.8	122.0	8.4	.	0.941	7.2	7.2	1.2	59.7	466.3
8	25/28	4	114.9	1.8	116.7	14.1	.	0.903	11.3	11.3	2.8	62.4	477.7
8/9	29(8)/ 3(9)	6	105.3	4.1	109.4	18.7	.	0.874	13.8	13.8	4.9	67.3	491.5
9	4/ 6	3	95.6	4.6	100.2	4.7	.	0.967	3.3	3.3	1.4	68.7	494.8
9	7/12	6	96.9	1.7	98.6	16.6	.	0.887	11.1	11.1	5.5	74.2	505.9
9	13/15	3	87.5	.	87.5	4.8	.	0.966	3.0	3.0	1.8	76.0	508.9
9	16/22	7	84.5	.	84.5	14.0	.	0.904	8.1	8.1	5.9	81.9	517.0
9	23	1	76.4	.	76.4	1.1	.	0.992	0.6	0.6	0.5	82.4	517.6
9	24/27	4	75.8	8.0	83.8	7.5	.	0.947	4.4	4.4	3.1	85.5	522.0
9	28/29	2	79.4	.	79.4	4.0	.	0.972	2.3	2.3	1.7	87.2	524.3
9/10	30(9)/ 7(10)	8	77.1	18.0	95.1	13.7	.	0.906	8.9	8.9	4.8	92.0	533.2
10	8	1	86.2	.	86.2	0.9	.	0.994	0.6	0.6	0.3	92.3	533.7
10	9/10	2	85.7	.	85.7	3.0	.	0.979	1.8	1.8	1.2	93.5	535.6
10	11/12	2	83.8	.	83.8	3.1	.	0.978	1.8	1.8	1.3	94.8	537.4
10	13/14	2	82.0	.	82.0	2.7	.	0.981	1.6	1.6	1.1	95.9	539.0
10	15/16	2	80.4	.	80.4	2.5	.	0.982	1.4	1.4	1.1	97.0	540.4
10	17	1	79.0	0.5	79.5	0.8	.	0.994	0.5	0.5	0.3	97.3	540.9
10	18/19	2	79.0	.	79.0	2.0	.	0.986	1.1	1.1	0.9	98.2	542.0
10	20/21	2	77.9	.	77.9	2.7	.	0.981	1.5	1.5	1.2	99.4	543.5
10	22/23	2	76.4	.	76.4	2.6	.	0.982	1.4	1.4	1.2	100.6	544.9
10	24/26	3	75.0	.	75.0	2.7	.	0.981	1.4	1.4	1.3	101.9	546.3
10	27/29	3	73.6	.	73.6	1.2	.	0.991	0.6	0.6	0.6	102.4	547.0

TABLEAU 71 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 3

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	Ett	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
4	14/22	9	250.0	11.0	261.0	29.1	29.1	.	.	29.1	.	.	29.1
4	23/24	2	231.9	9.6	241.5	4.3	4.3	.	.	4.3	.	.	33.4
4	25/27	3	237.2	.	237.2	5.7	5.7	.	.	5.7	.	.	39.1
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.5	8.9	240.4	17.7	17.7	.	.	17.7	.	.	56.8
5	3/ 6	4	222.7	0.9	223.6	14.6	14.6	.	.	14.6	.	.	71.4
5	7/ 8	2	209.0	2.5	211.5	10.1	10.1	.	.	10.1	.	.	81.5
5	9/10	2	201.4	4.9	206.3	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	87.6
5	11/12	2	200.2	.	200.2	8.4	8.4	.	.	8.4	.	.	96.0
5	13/14	2	191.8	11.2	203.0	6.2	6.2	.	.	6.2	.	.	102.2
5	15/17	3	196.8	0.3	197.1	11.0	11.0	.	.	11.0	.	.	113.2
5	18/19	2	186.1	.	186.1	7.1	7.1	.	.	7.1	.	.	120.3
5	20/23	4	179.0	27.8	206.8	10.9	10.9	.	.	10.9	.	.	131.2
5	24/25	2	195.9	.	195.9	9.4	9.4	.	.	9.4	.	.	140.6
5	26/29	4	186.5	29.0	215.5	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	154.0
5	30/31	2	202.1	.	202.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	162.3
6	1/ 7	7	193.8	5.8	199.6	32.1	32.1	.	.	32.1	.	.	194.4
6	8/ 9	2	167.5	.	167.5	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	202.7
6	10/15	6	159.2	9.1	168.3	17.4	17.4	.	.	17.4	.	.	220.1
6	16/17	2	150.9	.	150.9	10.4	10.4	.	.	10.4	.	.	230.5
6	18/23	6	140.5	4.5	145.4	27.2	27.2	.	.	27.2	.	.	257.7
6	24/25	2	118.2	10.2	128.4	9.8	9.8	.	.	9.8	.	.	267.5
6	26/28	3	118.6	24.6	143.2	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	279.4
6/7	29(6)/ 1(7)	3	131.3	1.9	133.2	13.7	13.7	.	.	13.7	.	.	293.1

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	2/ 5	4	119.5	26.5	146.0	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	308.7
7	6/12	7	130.4	5.6	136.0	33.2	26.0	0.935	7.1	33.1	0.1	0.1	341.8
7	13	1	102.9	3.6	106.5	2.6	.	0.977	2.5	2.5	0.1	0.2	344.3
7	14/21	8	104.0	.	104.0	43.2	.	0.669	34.5	34.5	8.7	8.9	376.8
7	22/25	4	69.5	8.9	78.4	21.2	.	0.821	14.1	14.1	7.1	16.1	392.8
7	26/31	6	64.4	.	64.4	42.8	.	0.669	21.3	21.3	21.5	37.5	414.2
8	1/ 7	7	43.0	80.5	123.5	20.7	13.5	0.936	7.0	20.6	0.1	37.6	434.7
8	8/10	3	103.0	2.9	105.9	7.8	.	0.931	7.3	7.3	0.5	38.1	442.0
8	11/15	5	98.5	9.6	108.1	16.9	.	0.856	15.6	15.6	1.3	39.4	457.7
8	16/21	6	92.5	24.2	116.7	20.5	6.7	0.881	13.1	19.9	0.6	40.1	477.5
8	22/24	3	96.9	6.8	103.7	8.4	.	0.926	7.7	7.7	0.7	40.7	485.3
8	25/28	4	95.9	1.8	97.7	14.1	.	0.878	11.9	11.9	2.2	42.9	497.2
8/9	29(8)/ 3(9)	6	85.8	4.1	89.9	18.7	.	0.842	14.2	14.2	4.5	47.4	511.4
9	4/ 6	3	75.7	4.6	80.3	4.7	.	0.958	3.4	3.4	1.3	48.7	514.8
9	7/12	6	76.9	1.7	78.6	16.6	.	0.858	11.1	11.1	5.5	54.1	526.0
9	13/15	3	67.4	.	67.4	4.9	.	0.957	2.9	2.9	1.9	56.0	528.9
9	16/22	7	64.5	.	64.5	14.0	.	0.879	7.8	7.8	6.2	62.3	536.6
9	23	1	56.8	.	56.8	1.1	.	0.990	0.6	0.6	0.5	62.8	537.2
9	24/27	4	56.2	8.0	64.2	7.5	.	0.934	4.3	4.3	3.2	66.0	541.5
9	28/29	2	59.9	.	59.9	4.0	.	0.964	2.2	2.2	1.8	67.9	543.6
9/10	30(9)/ 7(10)	8	57.8	18.0	75.8	13.7	.	0.882	8.9	8.9	4.8	72.6	552.6
10	8	1	66.8	.	66.8	0.9	.	0.992	0.5	0.5	0.4	73.0	553.1
10	9/10	2	66.3	.	66.3	3.0	.	0.973	1.8	1.8	1.2	74.2	554.9
10	11/12	2	64.5	.	64.5	3.1	.	0.972	1.8	1.8	1.3	75.5	556.7
10	13/14	2	62.7	.	62.7	2.7	.	0.976	1.5	1.5	1.2	76.7	558.2
10	15/16	2	61.2	.	61.2	2.5	.	0.977	1.4	1.4	1.1	77.8	559.6
10	17	1	59.8	0.5	60.3	0.8	.	0.993	0.4	0.4	0.4	78.2	560.0
10	18/19	2	59.8	.	59.8	2.0	.	0.982	1.1	1.1	0.9	79.0	561.1
10	20/21	2	58.8	.	58.8	2.7	.	0.976	1.4	1.4	1.3	80.3	562.6
10	22/23	2	57.3	.	57.3	2.6	.	0.977	1.3	1.3	1.3	81.6	563.9
10	24/26	3	56.0	.	56.0	2.7	.	0.976	1.4	1.4	1.3	82.9	565.3
10	27/29	3	54.6	.	54.6	1.2	.	0.989	0.6	0.6	0.6	83.5	565.9

TABLEAU 72 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

Analyse par séquences de temps
Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	100.0	0.1	100.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	8.3
4	17/19	3	91.8	28.3	120.1	5.0	5.0	.	.	5.0	.	15.1	13.3
4	20/21	2	100.0	3.2	103.2	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	19.6
4	22/23	2	96.9	7.5	104.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	24.3
4	24/27	4	99.7	.	99.7	15.9	15.9	.	.	15.9	.	.	40.2
4	28/29	2	83.8	.	83.8	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	46.3
4/5	30(4)/ 2(5)	3	77.7	.	77.7	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	57.4
5	3/ 5	3	66.6	7.3	73.9	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	70.8
5	6/ 8	3	60.5	0.1	60.6	15.3	10.6	0.906	4.7	15.3	.	.	86.1
5	9/12	4	45.3	.	45.3	27.8	.	0.550	20.4	20.4	7.4	.	106.5
5	13/14	2	24.9	9.4	34.3	6.8	.	0.869	4.5	4.5	2.3	.	111.0
5	15/17	3	29.8	.	29.8	18.7	.	0.671	9.8	9.8	8.9	.	120.8
5	18/22	5	20.0	3.0	23.0	21.4	.	0.639	8.3	8.3	13.1	.	129.1
5	23/27	5	14.7	16.1	30.8	13.4	.	0.759	7.4	7.4	6.0	.	136.5
5	28/31	4	23.4	0.9	24.3	19.1	.	0.669	8.0	8.0	11.1	.	144.6
6	1/ 7	7	16.2	16.7	32.9	32.7	.	0.503	16.4	16.4	16.3	.	160.9
6	8/11	4	16.6	0.1	16.7	25.8	.	0.576	7.1	7.1	18.7	.	168.0
6	12/14	3	9.6	9.4	19.0	16.1	.	0.711	5.5	5.5	10.6	.	173.5
6	15/17	3	13.5	0.2	13.7	14.2	.	0.742	3.5	3.5	10.7	.	177.0
6	18/20	3	10.2	.	10.2	13.9	.	0.747	2.6	2.6	11.3	.	179.6
6	21/25	5	7.6	.	7.6	30.8	.	0.518	3.7	3.7	27.1	.	183.3
6	26/27	2	3.9	5.5	9.4	8.4	.	0.839	1.5	1.5	6.9	.	184.8
6	28/30	3	7.9	0.6	8.5	16.9	.	0.699	2.6	2.6	14.3	.	187.3

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	1/ 8	8	6.0	.	6.0	51.7	.	0.330	4.0	4.0	47.7	212.5	15.1
7	9/12	4	2.0	8.1	10.1	13.0	.	0.764	2.4	2.4	10.6	223.1	15.1
7	13/17	5	7.7	.	7.7	34.6	.	0.475	4.0	4.0	30.6	253.7	15.1
7	18/21	4	3.7	2.1	5.8	26.7	.	0.564	2.5	2.5	24.2	277.8	15.1
7	22/26	5	3.2	.	3.2	34.9	.	0.472	1.7	1.7	33.2	311.0	15.1
7	27/31	5	1.5	.	1.5	29.0	.	0.540	0.7	0.7	28.3	339.3	15.1
8	1/ 3	3	0.8	0.1	0.9	12.4	.	0.772	0.2	0.2	12.2	351.5	15.1
8	4/ 6	3	0.7	2.6	3.3	21.5	.	0.629	1.2	1.2	20.3	371.8	15.1
8	7/ 8	2	2.1	4.6	6.7	7.3	.	0.859	0.9	0.9	6.4	378.1	15.1
8	9/10	2	5.7	25.1	30.8	4.8	.	0.906	2.9	2.9	1.9	380.1	15.1
8	11/15	5	28.0	1.1	29.1	17.3	.	0.699	8.8	8.8	8.5	388.6	15.1
8	16/19	4	20.3	3.5	23.8	18.8	.	0.674	7.8	7.8	11.0	399.6	15.1
8	20/22	3	16.0	2.9	18.9	10.6	.	0.803	3.7	3.7	6.9	406.5	15.1
8	23/27	5	15.2	.	15.2	26.9	.	0.566	6.6	6.6	20.3	426.8	15.1
8	28/29	2	8.6	0.1	8.7	8.8	.	0.832	1.5	1.5	7.3	434.1	15.1
8	30/31	2	7.2	.	7.2	12.2	.	0.771	1.7	1.7	10.5	444.7	15.1
9	1/ 2	2	5.6	.	5.6	10.3	.	0.805	1.1	1.1	9.2	453.9	15.1
9	3/ 6	4	4.5	38.4	42.9	9.8	.	0.818	7.8	7.8	2.0	455.9	15.1
9	7/10	4	35.1	0.1	35.2	11.1	.	0.796	7.2	7.2	3.9	459.8	15.1
9	11/14	4	28.0	1.4	29.4	16.5	.	0.709	8.6	8.6	7.9	467.7	15.1
9	15/20	6	20.8	56.5	77.3	14.5	14.5	.	.	14.5	.	467.7	15.1
9	21/25	5	62.8	.	62.8	16.3	12.8	0.931	3.5	16.3	.	467.7	15.1
9	26/27	2	46.5	17.4	63.9	2.8	2.8	.	.	2.8	.	467.7	15.1
9	28/29	2	61.1	.	61.1	5.0	5.0	.	.	5.0	.	467.7	15.1
9/10	30(9)/ 6(10)	7	56.1	0.3	56.4	12.4	6.4	0.886	5.7	12.2	0.2	467.9	15.1
10	7/11	5	44.3	34.0	78.3	7.4	7.4	.	.	7.4	.	467.9	15.1
10	12/14	3	70.9	5.6	76.5	2.9	2.9	.	.	2.9	.	467.9	15.1
10	15/16	2	73.6	5.4	79.0	2.7	2.7	.	.	2.7	.	467.9	15.1
10	17/18	2	76.3	0.8	77.1	1.8	1.8	.	.	1.8	.	467.9	15.1
10	19/22	4	75.3	.	75.3	3.3	3.3	.	.	3.3	.	467.9	15.1
10	23/25	3	72.0	3.4	75.4	2.3	2.3	.	.	2.3	.	467.9	15.1

TABLEAU 73 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE		CUMUL ETT
											partiel	cumulé	partiel	cumulé	
4	15/16	2	250.0	0.1	250.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	.	.	8.3
4	17/19	3	241.8	28.3	270.1	5.0	5.0	.	.	5.0	.	.	15.1	15.1	13.3
4	20/21	2	250.0	3.2	253.2	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	.	15.1	19.6
4	22/23	2	246.9	7.5	254.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	.	15.1	24.3
4	24/27	4	249.7	.	249.7	15.9	15.9	.	.	15.9	.	.	.	15.1	40.2
4	28/29	2	233.8	.	233.8	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	.	15.1	46.3
4/5	30(4)/ 2(5)	3	227.7	.	227.7	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	.	15.1	57.4
5	3/ 5	3	216.6	7.3	223.9	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	.	15.1	70.8
5	6/ 8	3	210.5	0.1	210.6	15.3	15.3	.	.	15.3	.	.	.	15.1	86.1
5	9/12	4	195.3	.	195.3	27.8	27.8	.	.	27.8	.	.	.	15.1	113.9
5	13/14	2	167.5	9.4	176.9	6.8	6.8	.	.	6.8	.	.	.	15.1	120.7
5	15/17	3	170.1	.	170.1	18.7	18.7	.	.	18.7	.	.	.	15.1	139.4
5	18/22	5	151.4	3.0	154.4	21.4	14.4	0.950	6.9	21.3	0.1	0.1	.	15.1	160.7
5	23/27	5	133.1	16.1	149.2	13.4	9.2	0.970	4.2	13.4	.	0.1	.	15.1	174.1
5	28/31	4	135.8	0.9	136.7	19.1	.	0.870	17.7	17.7	1.4	1.5	.	15.1	191.8
6	1/ 7	7	119.0	16.7	135.7	32.7	.	0.789	28.7	28.7	4.0	5.5	.	15.1	220.5
6	8/11	4	107.0	0.1	107.1	25.8	.	0.828	18.4	18.4	7.4	12.9	.	15.1	238.9
6	12/14	3	88.7	9.4	98.1	16.1	.	0.889	10.9	10.9	5.2	18.1	.	15.1	249.8
6	15/17	3	87.2	0.2	87.4	14.2	.	0.902	8.6	8.6	5.6	23.8	.	15.1	258.3
6	18/20	3	78.9	.	78.9	13.9	.	0.904	7.6	7.6	6.3	30.1	.	15.1	265.9
6	21/25	5	71.3	.	71.3	30.8	.	0.799	14.4	14.4	16.4	46.5	.	15.1	280.3
6	26/27	2	56.9	5.5	62.4	8.4	.	0.941	3.7	3.7	4.7	51.2	.	15.1	284.0
6	28/30	3	58.7	0.6	59.3	16.9	.	0.884	6.9	6.9	10.0	61.3	.	15.1	290.8

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	1/ 8	8	52.5	.	52.5	51.7	.	0.685	16.5	16.5	35.2	96.4	307.4
7	9/12	4	35.9	8.1	44.0	13.0	.	0.910	3.9	3.9	9.1	105.5	311.3
7	13/17	5	40.1	.	40.1	34.6	.	0.776	9.0	9.0	25.6	131.1	320.3
7	18/21	4	31.1	2.1	33.2	26.7	.	0.822	5.9	5.9	20.8	151.9	326.2
7	22/26	5	27.3	.	27.3	34.9	.	0.774	6.2	6.2	28.7	180.7	332.3
7	27/31	5	21.2	.	21.2	20.0	.	0.809	4.0	4.0	25.0	205.6	336.4
8	1/ 3	3	17.1	0.1	17.2	12.4	0	0.914	1.5	1.5	10.9	216.5	337.9
8	4/ 6	3	15.7	2.6	18.3	21.5	.	0.854	2.7	2.7	18.8	235.4	340.5
8	7/ 8	2	15.7	4.6	20.3	7.3	.	0.949	1.0	1.0	6.3	241.6	341.6
8	9/10	2	19.2	25.1	44.3	4.8	.	0.966	1.5	1.5	3.3	244.9	343.1
8	11/15	5	42.8	1.1	43.9	17.3	.	0.882	5.2	5.2	12.1	257.1	348.2
8	16/19	4	38.8	3.5	42.3	18.8	.	0.872	5.4	5.4	13.4	270.5	353.6
8	20/22	3	36.9	2.9	39.8	10.6	.	0.926	2.9	2.9	7.7	278.1	356.6
8	23/27	5	36.8	.	36.8	26.9	.	0.822	6.6	6.6	20.3	298.5	363.1
8	28/29	2	30.3	0.1	30.4	8.8	.	0.938	1.9	1.9	6.9	305.4	365.0
8	30/31	2	28.5	.	28.5	12.2	.	0.915	2.4	2.4	9.8	315.2	367.4
9	1/ 2	2	26.1	.	26.1	10.3	.	0.928	1.9	1.9	8.4	323.6	369.3
9	3/ 6	4	24.2	38.4	62.6	9.8	.	0.932	4.3	4.3	5.5	329.1	373.6
9	7/10	4	58.3	0.1	58.4	11.1	.	0.923	4.5	4.5	6.6	335.7	378.1
9	11/14	4	53.9	1.4	55.3	16.5	.	0.887	6.2	6.2	10.3	346.0	384.3
9	15/20	6	49.1	56.5	105.6	14.5	.	0.901	10.5	10.5	4.0	350.0	394.8
9	21/25	5	95.1	.	95.1	16.3	.	0.889	10.6	10.6	5.7	355.7	405.4
9	26/27	2	84.5	17.4	101.9	2.8	.	0.980	2.0	2.0	0.8	356.5	407.4
9	28/29	2	99.9	.	99.9	5.0	.	0.965	3.5	3.5	1.5	358.0	410.9
9/10	30(9)/ 6(10)	7	96.4	0.3	96.7	12.4	.	0.915	8.2	8.2	4.2	362.1	419.2
10	7/11	5	88.4	34.0	122.4	7.4	.	0.948	6.3	6.3	1.1	363.2	425.5
10	12/14	3	116.1	5.6	121.7	2.9	.	0.979	2.5	2.5	0.4	363.6	428.0
10	15/16	2	119.2	5.4	124.6	2.7	.	0.981	2.4	2.4	0.3	363.9	430.4
10	17/18	2	122.2	0.8	123.0	1.8	.	0.987	1.6	1.6	0.2	364.1	432.0
10	19/22	4	121.4	.	121.4	3.3	.	0.977	2.8	2.8	0.5	364.6	434.8
10	23/25	3	118.6	3.4	122.0	2.3	.	0.984	2.0	2.0	0.3	364.9	436.8

TABEAU 74 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU BERRY

B O U R G E S - 1 9 6 4

Analyse par séquences de temps
Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 140mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	0.1	250.1	8.3	8.3	.	.	8.3	.	.	8.3
4	17/19	3	241.8	28.3	270.1	5.0	5.0	.	.	5.0	.	15.1	13.3
4	20/21	2	250.0	3.2	253.2	6.3	6.3	.	.	6.3	.	.	19.6
4	22/23	2	246.9	7.5	254.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	24.3
4	24/27	4	249.7	.	249.7	15.9	15.9	.	.	15.9	.	.	40.2
4	28/29	2	233.8	.	233.8	6.1	6.1	.	.	6.1	.	.	46.3
4/5	30(4)/ 2(5)	3	227.7	.	227.7	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	57.4
5	3/ 5	3	215.6	7.3	223.9	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	70.8
5	6/ 8	3	210.5	0.1	210.6	15.3	15.3	.	.	15.3	.	.	86.1
5	9/12	4	195.3	.	195.3	27.8	27.8	.	.	27.8	.	.	113.9
5	13/14	2	167.5	9.4	176.9	6.8	6.8	.	.	6.8	.	.	120.7
5	15/17	3	170.1	.	170.1	18.7	18.7	.	.	18.7	.	.	139.4
5	18/22	5	151.4	3.0	154.4	21.4	21.4	.	.	21.4	.	.	160.8
5	23/27	5	133.0	16.1	149.1	13.4	13.4	.	.	13.4	.	.	174.2
5	28/31	4	135.7	0.9	136.6	19.1	19.1	.	.	19.1	.	.	193.3
6	1/ 7	7	117.5	16.7	134.2	32.7	24.2	0.924	8.4	32.6	0.1	0.1	225.9
6	8/11	4	101.6	0.1	101.7	25.8	.	0.785	21.8	21.8	4.0	4.1	247.7
6	12/14	3	79.9	9.4	89.3	16.1	.	0.861	12.4	12.4	3.7	7.8	260.1
6	15/17	3	76.9	0.2	77.1	14.2	.	0.876	9.5	9.5	4.7	.	269.7
6	18/20	3	67.5	.	67.5	13.9	.	0.879	8.2	8.2	5.7	12.4	277.8
6	21/25	3	59.4	.	59.4	30.8	.	0.750	14.9	14.9	15.9	34.1	292.7
6	26/27	2	44.5	5.5	50.0	8.4	.	0.925	3.7	3.7	4.7	38.7	296.4
6	28/30	3	46.2	0.6	46.8	16.9	.	0.854	6.8	6.8	10.1	48.8	303.3

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	1/ 8	8	40.0	.	40.0	51.7	.	0.616	15.4	15.4	36.3	85.2	15.1
7	9/12	4	24.7	8.1	32.8	13.0	.	0.887	3.7	3.7	9.3	94.4	15.1
7	13/17	5	29.0	.	29.0	34.6	.	0.723	8.1	8.1	26.5	121.0	15.1
7	18/21	4	21.0	2.1	23.1	26.7	.	0.778	5.1	5.1	21.6	142.6	15.1
7	22/26	5	18.0	.	18.0	34.9	.	0.721	5.0	5.0	29.9	172.5	15.1
7	27/31	5	13.0	.	13.0	29.0	.	0.763	3.1	3.1	25.9	198.4	15.1
8	1/ 3	3	9.9	0.1	10.0	12.4	.	0.891	1.1	1.1	11.3	209.7	15.1
8	4/ 6	3	8.9	2.6	11.5	21.5	.	0.817	2.1	2.1	19.4	229.1	15.1
8	7/ 8	2	9.4	4.6	14.0	7.3	.	0.935	0.9	0.9	6.4	235.5	15.1
8	9/10	2	13.1	25.1	38.2	4.8	.	0.957	1.6	1.6	3.2	238.6	15.1
8	11/15	5	36.5	1.1	37.6	17.3	.	0.852	5.6	5.6	11.7	250.4	15.1
8	16/19	4	32.1	3.5	35.8	13.8	.	0.840	5.7	5.7	13.1	263.5	15.1
8	20/22	3	29.9	2.9	32.8	10.6	.	0.907	3.1	3.1	7.5	271.0	15.1
8	23/27	5	29.7	.	29.7	26.9	.	0.778	6.6	6.6	20.3	291.3	15.1
8	28/29	2	23.1	0.1	23.2	8.8	.	0.922	1.8	1.8	7.0	298.3	15.1
8	30/31	2	21.4	.	21.4	12.2	.	0.892	2.3	2.3	9.9	308.2	15.1
9	1/ 2	2	19.1	.	19.1	10.3	.	0.909	1.7	1.7	8.6	316.7	15.1
9	3/ 6	4	17.3	38.4	55.7	9.8	.	0.914	4.8	4.8	5.0	321.7	15.1
9	7/10	4	50.9	0.1	51.0	11.1	.	0.903	5.0	5.0	6.1	327.9	15.1
9	11/14	4	46.1	1.4	47.5	16.5	.	0.858	6.7	6.7	9.8	337.7	15.1
9	15/20	6	40.8	56.5	97.3	14.5	.	0.875	12.1	12.1	2.4	340.0	15.1
9	21/25	5	85.1	.	85.1	16.3	.	0.860	11.9	11.9	4.4	344.4	15.1
9	26/27	2	73.2	17.4	90.6	2.8	.	0.975	2.3	2.3	0.5	344.9	15.1
9	28/29	2	88.3	.	88.3	5.0	.	0.955	4.0	4.0	1.0	346.0	15.1
9/10	30(9)/ 6(10)	7	84.4	0.3	84.7	12.4	.	0.893	9.1	9.1	3.3	349.3	15.1
10	7/11	5	75.6	34.0	109.6	7.4	.	0.935	7.2	7.2	0.2	349.5	15.1
10	12/14	3	102.4	5.6	108.0	2.9	.	0.974	2.8	2.8	0.1	349.6	15.1
10	15/16	2	105.2	5.4	110.6	2.7	0.6	0.981	2.1	2.7	.	349.6	15.1
10	17/18	2	107.9	0.8	108.7	1.8	.	0.984	1.8	1.8	.	349.6	15.1
10	19/22	4	106.9	.	106.9	3.3	.	0.970	3.2	3.2	0.1	349.7	15.1
10	23/25	3	103.7	3.4	107.1	2.3	.	0.979	2.2	2.2	0.1	349.8	15.1

TABLEAU 75 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) - 1963

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Analyse par séquences de temps
Formule aménagée

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
4	14/22	9	100.0	15.5	115.5	24.6	24.6	.	.	24.6	.	.	24.6
4	23/24	2	90.9	3.9	94.8	3.5	3.5	.	.	3.5	.	.	28.1
4	25/27	3	91.3	.	91.3	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	33.0
4/5	28(4)/ 2(5)	5	86.4	14.1	100.5	14.8	14.8	.	.	14.8	.	.	47.8
5	3/ 6	4	85.7	0.3	86.0	11.5	11.5	.	.	11.5	.	.	59.3
5	7/ 8	2	74.5	12.8	87.3	9.6	9.6	.	.	9.6	.	.	68.9
5	9/10	2	77.7	4.7	82.4	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	74.1
5	11/12	2	77.2	.	77.2	7.3	7.3	.	.	7.3	.	.	81.4
5	13/14	2	69.9	19.6	89.5	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	86.0
5	15/17	3	84.9	0.4	85.3	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	94.0
5	18/19	2	77.3	.	77.3	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	100.0
5	20/23	4	71.3	31.6	102.9	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	111.1
5	24/25	2	91.8	.	91.8	8.4	8.4	.	.	8.4	.	.	119.5
5	26/29	4	83.4	11.0	94.4	13.1	13.1	.	.	13.1	.	.	132.6
5	30/31	2	81.3	13.2	94.5	9.2	9.2	.	.	9.2	.	.	141.8
6	1/ 7	7	85.3	9.9	95.2	27.4	27.4	.	.	27.4	.	.	169.2
6	8/ 9	2	67.8	0.6	68.4	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	175.6
6	10/15	6	62.0	31.2	93.2	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	189.9
6	16/17	2	78.9	.	78.9	7.8	7.8	.	.	7.8	.	.	197.7
6	18/23	6	71.1	7.7	78.8	22.5	22.5	.	.	22.5	.	.	220.2
6	24/25	2	56.3	14.6	70.9	7.7	7.7	.	.	7.7	.	.	227.9
6	26/28	3	63.2	34.5	97.7	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	238.6
6/7	29(6)/ 1(7)	3	87.0	11.5	98.5	11.2	11.2	.	.	11.2	.	.	249.8
7	2/ 5	4	87.3	2.9	90.2	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	265.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	partiel cumulé	DEFICIT	DRAINAGE	CUMUL
														ETt
7	6/12	7	74.6	51.3	125.9	29.0	29.0	.	.	29.0	.	.	.	294.4
7	13	1	96.9	10.9	107.8	2.5	2.5	.	.	2.5	.	.	5.3	296.9
7	14/21	8	100.0	.	100.0	40.3	40.3	.	.	40.3	.	.	5.3	337.2
7	22/25	4	59.7	1.8	61.5	17.8	11.5	0.876	6.2	17.7	0.1	0.1	5.3	354.9
7	26.31	6	43.8	.	43.8	30.0	.	0.531	20.5	20.5	9.5	9.6	5.3	375.4
8	1/ 7	7	23.3	45.0	68.3	22.3	18.3	0.920	4.0	22.3	.	9.6	5.3	397.7
8	8/10	3	46.0	7.4	53.4	6.4	3.4	0.941	3.0	6.4	.	9.6	5.3	404.1
8	11/15	5	47.0	4.6	51.6	11.1	1.6	0.824	8.8	10.4	0.7	10.3	5.3	414.5
8	16/21	6	41.2	32.2	73.4	15.0	15.0	.	.	15.0	.	10.3	5.3	429.5
8	22/24	3	58.4	17.8	76.2	7.7	7.7	.	.	7.7	.	10.3	5.3	437.2
8	25/28	4	68.5	4.8	73.3	11.7	11.7	.	.	11.7	.	10.3	5.3	448.9
8/9	29(8)/ 3(9)	6	61.6	4.2	65.8	17.1	15.8	0.974	1.3	17.1	.	10.3	5.3	466.0
9	4/ 6	3	48.7	14.0	62.7	4.6	4.6	.	.	4.6	.	10.3	5.3	470.6
9	7/12	6	58.1	.	58.1	12.3	8.1	0.918	4.1	12.2	0.1	10.4	5.3	482.6
9	13/15	3	45.9	.	45.9	4.5	.	0.913	4.0	4.0	0.5	10.9	5.3	486.8
9	16/22	7	41.9	.	41.9	14.7	.	0.741	10.9	10.9	3.8	14.7	5.3	497.7
9	23	1	31.0	13.0	44.0	1.7	.	0.966	1.5	1.5	0.2	14.9	5.3	499.2
9	24/27	4	42.5	15.7	58.2	5.7	5.7	.	.	5.7	.	14.9	5.3	504.9
9	28/29	2	52.5	.	52.5	3.4	3.4	0.982	0.9	3.4	.	14.9	5.3	508.3
9/10	30(9)/ 7(10)	8	49.1	39.2	88.3	7.2	7.2	.	.	7.2	.	14.9	5.3	515.5
10	8	1	81.1	.	81.1	1.0	1.0	.	.	1.0	.	14.9	5.3	516.5
10	9/10	2	80.1	.	80.1	1.4	1.4	.	.	1.4	.	14.9	5.3	517.9
10	11/12	2	78.7	.	78.7	2.3	2.3	.	.	2.3	.	14.9	5.3	520.2
10	13/14	2	76.4	0.5	76.9	2.2	2.2	.	.	2.2	.	14.9	5.3	522.4
10	15/16	2	74.7	.	74.7	1.8	1.8	.	.	1.8	.	14.9	5.3	524.2
10	17	1	72.9	0.5	73.4	0.8	0.8	.	.	0.8	.	14.9	5.3	525.0
10	18/19	2	72.6	.	72.6	1.8	1.8	.	.	1.8	.	14.9	5.3	526.8
10	20/21	2	70.8	.	70.8	2.2	2.2	.	.	2.2	.	14.9	5.3	529.0
10	22/23	2	68.6	.	68.6	2.2	2.2	.	.	2.2	.	14.9	5.3	531.2
10	24/26	3	66.4	.	66.4	1.8	1.8	.	.	1.8	.	14.9	5.3	533.0
10	27/29	3	64.6	.	64.6	1.1	1.1	.	.	1.1	.	14.9	5.3	534.1
10/11	30(10)/ 6(11)	8	63.5	19.5	83.0	6.0	6.0	.	.	6.0	.	14.9	5.3	540.1
11	7/ 8	2	77.0	3.0	80.0	1.2	1.2	.	.	1.2	.	14.9	5.3	541.3
11	9/12	4	78.8	41.9	120.7	2.8	2.8	.	.	2.8	.	14.9	23.2	544.1
11	13/14	2	100.0	18.7	118.7	0.7	0.7	.	.	0.7	.	14.9	41.2	544.8
11	15/21	7	100.0	40.9	140.9	2.9	2.9	.	.	2.9	.	14.9	79.2	547.7

TABLEAU 76 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 100mm
Réserve facilement utilisable = 50mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
4	14/22	9	100.0	13.4	113.4	25.1	25.1	.	.	25.1	.	.	25.1
4	23/24	2	88.3	1.8	90.1	3.7	3.7	.	.	3.7	.	.	28.8
4	25/27	3	86.4	.	86.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	33.5
4	28(4)/ 2(5)	5	81.7	11.3	93.0	14.7	14.7	.	.	14.7	.	.	48.2
5	3/ 6	4	78.3	.	78.3	11.6	11.6	.	.	11.6	.	.	59.8
5	7/ 8	2	66.7	12.5	79.2	9.6	9.6	.	.	9.6	.	.	69.4
5	9/10	2	69.6	4.3	73.9	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	74.7
5	11/12	2	68.6	.	68.6	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	81.9
5	13/14	2	61.4	14.8	76.2	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	86.5
5	15/17	3	71.6	.	71.6	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	94.4
5	18/19	2	63.7	.	63.7	5.8	5.8	.	.	5.8	.	.	100.2
5	20/23	4	57.9	31.1	89.0	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	111.6
5	24/25	2	77.6	.	77.6	8.1	8.1	.	.	8.1	.	.	119.7
5	26/29	4	69.5	12.6	82.1	13.0	13.0	.	.	13.0	.	.	132.7
5	30/31	2	69.1	3.2	72.3	8.9	8.9	.	.	8.9	.	.	141.6
6	1/ 7	7	63.4	38.1	101.5	27.9	27.9	.	.	27.9	.	.	169.5
6	8/ 9	2	73.6	0.6	74.2	6.5	6.5	.	.	6.5	.	.	176.0
6	10/15	6	67.7	41.7	109.4	14.1	14.1	.	.	14.1	.	.	190.1
6	16/17	2	95.3	.	95.3	8.1	8.1	.	.	8.1	.	.	198.2
6	18/23	6	87.2	3.6	90.8	21.4	21.4	.	.	21.4	.	.	219.6
6	24/25	2	69.4	11.0	80.4	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	227.5
6	26/28	3	72.5	47.5	120.0	10.8	10.8	.	.	10.8	9.2	9.2	238.3
6/7	29(6)/ 1(7)	3	100.0	14.2	114.2	11.3	11.3	.	.	11.3	2.9	2.9	249.6
7	2/ 5	4	100.0	1.5	101.5	15.9	15.9	.	.	15.9	.	.	265.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE		CUMUL
											partiel	cumulé	partiel	cumulé	Et
7	6/12	7	85.6	17.2	102.8	29.6	29.6	.	.	29.6	.	.	.	12.1	295.1
7	13	1	73.2	6.0	79.2	2.5	2.5	.	.	2.5	.	.	.	12.1	297.6
7	14/21	8	76.7	.	76.7	40.4	26.7	0.749	12.5	39.2	1.2	1.2	.	12.1	336.8
7	22/25	4	37.5	0.3	37.8	17.7	.	0.690	11.7	11.7	6.0	7.2	.	12.1	348.5
7	26/31	6	26.1	.	26.1	29.1	.	0.542	11.9	11.9	17.2	24.3	.	12.1	360.5
8	1/ 7	7	14.1	125.5	139.6	21.9	21.9	.	.	21.9	.	24.3	17.7	29.8	382.4
8	8/10	3	100.0	14.7	114.7	6.4	6.4	.	.	6.4	.	24.3	8.3	38.1	388.8
8	11/15	5	100.0	5.4	105.4	11.2	11.2	.	.	11.2	.	24.3	.	38.1	400.0
8	16/21	6	94.2	26.6	120.8	15.2	15.2	.	.	15.2	.	24.3	5.6	43.7	415.2
8	22/24	3	100.0	9.9	109.9	7.8	7.8	.	.	7.8	.	24.3	2.1	45.8	423.0
8	25/28	4	100.0	1.4	101.4	11.8	11.8	.	.	11.8	.	24.3	.	45.8	434.8
8/9	29(8)/ 3(9)	3	89.6	7.5	97.1	17.1	17.1	.	.	17.1	.	24.3	.	45.8	451.9
9	4/ 6	3	80.0	7.4	87.4	4.6	4.6	.	.	4.6	.	24.3	.	45.8	456.5
9	7/12	6	82.8	.	82.8	12.0	12.0	.	.	12.0	.	24.3	.	45.8	468.5
9	13/15	3	70.8	.	70.8	4.5	4.5	.	.	4.5	.	24.3	.	45.8	473.0
9	16/22	7	66.3	.	66.3	14.8	14.8	.	.	14.8	.	24.3	.	45.8	487.8
9	23	1	51.5	26.5	78.0	1.8	1.8	.	.	1.8	.	24.3	.	45.8	487.8
9	24/27	4	76.2	13.9	90.1	5.3	5.3	.	.	5.3	.	24.3	.	45.8	494.9
9	28/29	2	84.8	.	84.8	3.3	3.3	.	.	3.3	.	24.3	.	45.8	498.2
9/10	30(9)/ 7(10)	8	81.5	29.2	110.7	7.1	7.1	.	.	7.1	.	24.3	3.6	49.4	505.3
10	8	1	100.0	.	100.0	0.9	0.9	.	.	0.9	.	24.3	.	49.4	506.2
10	9/10	2	99.1	.	99.1	1.5	1.5	.	.	1.5	.	24.3	.	49.4	507.7
10	11/12	2	97.6	.	97.6	2.4	2.4	.	.	2.4	.	24.3	.	49.4	510.1
10	13/14	2	95.2	0.5	95.7	2.2	2.2	.	.	2.2	.	24.3	.	49.4	512.3
10	15/16	2	93.5	.	93.5	2.1	2.1	.	.	2.1	.	24.3	.	49.4	514.4
10	17	1	91.4	0.9	92.3	0.7	0.7	.	.	0.7	.	24.3	.	49.4	515.1
10	18/19	2	91.6	.	91.6	2.0	2.0	.	.	2.0	.	24.3	.	49.4	517.1
10	20/21	2	89.6	.	89.6	2.5	2.5	.	.	2.5	.	24.3	.	49.4	519.6
10	22/23	2	87.1	.	87.1	2.1	2.1	.	.	2.1	.	24.3	.	49.4	521.7
10	24/26	3	85.0	.	85.0	1.7	1.7	.	.	1.7	.	24.3	.	49.4	523.4
10	27/29	3	83.3	.	83.3	1.2	1.2	.	.	1.2	.	24.3	.	49.4	524.6
10/11	30(10)/6(11)	8	82.1	35.5	117.6	6.1	6.1	.	.	6.1	.	24.3	11.5	60.9	530.7
11	7/ 8	2	100.0	2.2	102.2	1.4	1.4	.	.	1.4	.	24.3	0.8	61.7	532.1
11	9/12	4	100.0	19.1	119.1	3.4	3.4	.	.	3.4	.	24.3	15.7	77.4	535.5
11	13/14	2	100.0	19.9	119.9	0.7	0.7	.	.	0.7	.	24.3	19.2	96.6	536.2
11	15/21	7	100.0	32.7	132.7	3.8	3.8	.	.	3.8	.	24.3	28.9	125.5	540.0

TABLEAU 77 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS
MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) - 1963

Analyse par séquences de temps
Formule aménagée
albedo = 15
Réserve utile = 250mm
Réserve facilement utilisable = 110mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	15.5	265.5	24.6	24.6	.	.	24.6	.	.	24.6
4	23/24	2	240.9	3.9	244.8	3.5	3.5	.	.	3.5	.	.	28.1
4	25/27	3	241.3	.	241.3	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	33.0
4/5	28(4)/ 2(5)	5	236.4	14.1	250.5	14.8	14.8	.	.	14.8	.	.	47.8
5	3/ 6	4	235.7	0.3	236.0	11.5	11.5	.	.	11.5	.	.	59.3
5	7/ 8	2	224.5	12.8	237.3	9.6	9.6	.	.	9.6	.	.	68.9
5	9/10	2	227.7	4.7	232.4	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	74.1
5	11/12	2	227.2	.	227.2	7.3	7.3	.	.	7.3	.	.	81.4
5	13/14	2	219.9	19.6	239.5	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	86.0
5	15/17	3	234.9	0.4	235.3	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	94.0
5	18/19	2	227.3	.	227.3	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	100.0
5	20/23	4	221.3	31.6	252.9	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	111.1
5	24/25	2	241.8	.	241.8	8.4	8.4	.	.	8.4	.	.	119.5
5	26/29	4	233.4	11.0	244.4	13.1	13.1	.	.	13.1	.	.	132.6
5	30/31	2	231.3	13.2	244.5	9.2	9.2	.	.	9.2	.	.	141.8
6	1/ 7	7	235.3	9.9	245.2	27.4	27.4	.	.	27.4	.	.	169.2
6	8/ 9	2	217.8	0.6	218.4	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	175.6
6	10/15	6	212.0	31.2	243.2	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	189.9
6	16/17	2	228.9	.	228.9	7.8	7.8	.	.	7.8	.	.	197.7
6	18/23	6	221.1	7.7	228.8	22.5	22.5	.	.	22.5	.	.	220.2
6	24/25	2	206.3	14.6	220.9	7.7	7.7	.	.	7.7	.	.	227.9
6	26/28	3	213.2	34.5	247.7	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	238.6
6/7	29(6)/ 1(7)	3	237.0	11.5	248.5	11.2	11.2	.	.	11.2	.	.	249.8
7	2/ 5	4	237.3	2.9	240.2	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	265.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	6/12	7	224.6	51.3	275.9	29.0	29.0	.	.	29.0	.	.	294.4
7	13	1	246.9	10.9	257.8	2.5	2.5	.	.	2.5	.	5.3	296.9
7	14/21	8	250.0	.	250.0	40.3	40.3	.	.	40.3	.	.	337.2
7	22/25	4	209.7	1.8	211.5	17.8	17.8	.	.	17.8	.	.	355.0
7	26/31	6	193.7	.	193.7	30.0	30.0	.	.	30.0	.	.	385.0
8	1/ 7	7	163.7	45.0	208.7	22.3	22.3	.	.	22.3	.	.	407.3
8	8/10	3	186.4	7.4	193.8	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	413.7
8	11/15	5	187.4	4.6	192.0	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	424.8
8	16/21	6	180.9	32.2	213.1	15.0	15.0	.	.	15.0	.	.	439.8
8	22/24	3	198.1	17.8	215.9	7.7	7.7	.	.	7.7	.	.	447.5
8	25/28	4	208.2	4.8	213.0	11.7	11.7	.	.	11.7	.	.	459.2
8/9	29(8)/ 3(10)	6	201.3	4.2	205.5	17.1	17.1	.	.	17.1	.	.	476.3
9	4/ 6	3	188.4	14.0	202.4	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	480.9
9	7/12	6	197.8	.	197.8	12.3	12.3	.	.	12.3	.	.	493.2
9	13/15	3	185.5	.	185.5	4.5	4.5	.	.	4.5	.	.	497.7
9	16/22	7	181.0	.	181.0	14.7	14.7	.	.	14.7	.	.	512.4
9	23	1	166.3	13.0	179.3	1.7	1.7	.	.	1.7	.	.	514.1
9	24/27	4	177.6	15.3	193.3	5.7	5.7	.	.	5.7	.	.	519.8
9	28/29	2	187.6	.	187.6	3.4	3.4	.	.	3.4	.	.	523.2
9/10	30(9)/ 7(10)	8	184.2	39.2	223.4	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	530.4
10	8	1	216.2	.	216.2	1.0	1.0	.	.	1.0	.	.	531.4
10	9/10	2	215.2	.	215.2	1.4	1.4	.	.	1.4	.	.	532.8
10	11/12	2	213.8	.	213.8	2.3	2.3	.	.	2.3	.	.	535.1
10	13/14	2	211.5	0.5	212.0	2.2	2.2	.	.	2.2	.	.	537.3
10	15/16	2	209.8	.	209.8	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	539.1
10	17	1	208.0	0.5	208.5	0.8	0.8	.	.	0.8	.	.	539.9
10	18/19	2	207.7	.	207.7	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	541.7
10	20/21	2	205.9	.	205.9	2.2	2.2	.	.	2.2	.	.	543.9
10	22/23	2	203.7	.	203.7	2.2	2.2	.	.	2.2	.	.	546.1
10	24/26	3	201.5	.	201.5	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	547.9
10	27/29	3	199.7	.	199.7	1.1	1.1	.	.	1.1	.	.	549.0
10/11	30(10)/ 6(11)	8	198.6	19.5	218.1	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	555.0
11	7/ 8	2	212.1	3.0	215.1	1.2	1.2	.	.	1.2	.	.	556.2
11	9/12	4	213.9	41.9	255.8	2.8	2.8	.	.	2.8	.	8.3	559.0
11	13/14	2	250.0	18.7	268.7	0.7	0.7	.	.	0.7	.	26.3	559.7
11	15/21	7	250.0	40.9	290.9	2.9	2.9	.	.	2.9	.	64.3	562.6

TABLEAU 78 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250 mm
Réserve facilement utilisable = 110 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
4	14/22	9	250.0	13.4	263.4	25.1	25.1	.	.	25.1	.	.	25.1
4	23/24	2	238.3	1.8	240.1	3.7	3.7	.	.	3.7	.	.	28.8
4	25/27	3	236.4	.	236.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	33.5
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.7	11.3	243.0	14.7	14.7	.	.	14.7	.	.	48.2
5	3/ 6	4	228.3	.	228.3	11.6	11.6	.	.	11.6	.	.	59.8
5	7/ 8	2	216.7	12.5	229.2	9.6	9.6	.	.	9.6	.	.	69.4
5	9/10	2	219.6	4.3	223.9	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	74.7
5	11/12	2	218.6	.	218.6	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	81.9
5	13/14	2	211.4	14.8	226.2	4.6	4.4	.	.	4.6	.	.	86.5
5	15/17	3	221.6	.	221.6	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	94.4
5	18/19	2	213.7	.	213.7	5.8	5.8	.	.	5.8	.	.	100.2
5	20/23	4	207.9	31.1	239.0	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	111.6
5	24/25	2	227.6	.	227.6	8.1	8.1	.	.	8.1	.	.	119.7
5	26/29	4	219.5	12.6	232.1	13.0	13.0	.	.	13.0	.	.	132.7
5	30/31	2	219.1	3.2	222.3	8.9	8.9	.	.	8.9	.	.	141.6
6	1/ 7	7	213.4	38.1	251.5	27.9	27.9	.	.	27.9	.	.	169.5
6	8/ 9	2	223.6	0.6	224.2	6.5	6.5	.	.	6.5	.	.	176.0
6	10/15	6	217.7	41.7	259.4	14.1	14.1	.	.	14.1	.	.	190.1
6	16/17	2	245.3	.	245.3	8.1	8.1	.	.	8.1	.	.	198.2
6	18/23	6	237.2	3.6	240.8	21.4	21.4	.	.	21.4	.	.	219.6
6	24/25	2	219.4	11.0	230.4	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	227.5
6	26/28	3	222.5	47.5	270.0	10.8	10.8	.	.	10.8	9.2	.	238.3
6/7	29(6)/ 1(7)	3	250.0	14.2	264.2	11.3	11.3	.	.	11.3	2.9	.	249.6
7	2/ 5	4	250.0	1.5	251.5	15.9	15.9	.	.	15.9	.	.	265.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	6/12	7	235.6	17.2	252.8	29.6	29.6	.	.	29.6	.	12.1	295.1
7	13	1	223.2	6.0	229.2	2.5	2.5	.	.	2.5	.	12.1	297.6
7	14/21	8	226.7	.	226.7	40.4	40.4	.	.	40.4	.	12.1	338.0
7	22/25	4	186.3	0.3	186.6	17.7	17.7	.	.	17.1	.	12.1	355.7
7	26/31	6	168.9	.	168.9	29.1	28.9	0.999	0.2	29.1	.	12.1	384.8
8	1/ 7	7	139.8	125.5	265.3	21.9	21.9	.	.	21.9	.	12.1	406.7
8	8/10	3	243.4	14.7	258.1	6.4	6.4	.	.	6.4	.	1.7	413.1
8	11/15	5	250.0	5.4	255.4	11.2	11.2	.	.	11.2	.	13.8	424.3
8	16/21	6	244.2	26.6	270.8	15.2	15.2	.	.	15.2	.	19.4	439.5
8	22/24	3	250.0	9.9	259.9	7.8	7.8	.	.	7.8	.	2.1	447.3
8	25/28	4	250.0	1.1	251.4	11.8	11.8	.	.	11.8	.	21.5	459.1
8/9	29(8)/ 3(9)	6	239.6	7.5	247.1	17.1	17.1	.	.	17.1	.	21.5	476.2
9	4/ 6	3	230.0	7.4	237.4	4.6	4.6	.	.	4.6	.	21.5	480.8
9	7/12	6	232.8	.	232.8	12.0	12.0	.	.	12.0	.	21.5	492.8
9	13/15	3	220.8	.	220.8	4.5	4.5	.	.	4.5	.	21.5	497.3
9	16/22	7	216.3	.	216.3	14.8	14.8	.	.	14.8	.	21.5	512.1
9	23	1	201.5	26.5	228.0	1.8	1.8	.	.	1.8	.	21.5	513.9
9	24/27	4	226.2	13.9	240.1	5.3	5.3	.	.	5.3	.	21.5	519.2
9	28/29	2	234.8	.	234.8	3.3	3.3	.	.	3.3	.	21.5	522.5
9/10	30(9)/ 7(10)	8	231.5	29.2	260.7	7.1	7.1	.	.	7.1	.	25.1	529.6
10	8	1	250.0	.	250.0	0.9	0.9	.	.	0.9	.	25.1	530.5
10	9/10	2	249.1	.	249.1	1.5	1.5	.	.	1.5	.	25.1	532.0
10	11/12	2	247.6	.	247.6	2.4	2.4	.	.	2.4	.	25.1	534.4
10	13/14	2	245.2	0.5	245.7	2.2	2.2	.	.	2.2	.	25.1	536.6
10	15/16	2	243.5	.	243.5	2.1	2.1	.	.	2.1	.	25.1	538.7
10	17	1	241.4	0.9	242.3	0.7	0.7	.	.	0.7	.	25.1	539.4
10	18/19	2	241.6	.	241.6	2.0	2.0	.	.	2.0	.	25.1	541.4
10	20/21	2	239.6	.	239.6	2.5	2.5	.	.	2.5	.	25.1	543.9
10	22/23	2	237.1	.	237.1	2.1	2.1	.	.	2.1	.	25.1	546.0
10	24/26	3	235.0	.	235.0	1.7	1.7	.	.	1.7	.	25.1	547.7
10	27/29	3	233.3	.	233.3	1.2	1.2	.	.	1.2	.	25.1	548.9
10/11	30(10)/ 6(11)	8	232.1	35.5	267.6	6.1	6.1	.	.	6.1	.	36.6	555.0
11	7/ 8	2	250.0	2.2	252.2	1.4	1.4	.	.	1.4	.	0.8	556.4
11	9/12	4	250.0	19.1	269.1	3.4	3.4	.	.	3.4	.	15.7	559.8
11	13/14	2	250.0	19.91	269.9	0.7	0.7	.	.	0.7	.	19.2	560.5
11	15/21	7	250.0	32.7	282.7	3.8	3.8	.	.	3.8	.	28.9	564.3

TABLEAU 79 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS
MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) - 1963

Analyse par séquences de temps
Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250 mm
Réserve facilement utilisable = 140 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	14/22	9	250.0	15.5	265.5	24.6	24.6	.	.	24.6	.	.	24.6
4	23/24	2	240.9	3.9	244.8	3.5	3.5	.	.	3.5	.	.	28.1
4	25/27	3	241.3	.	241.3	4.9	4.9	.	.	4.9	.	.	33.0
4/5	28(4)/ 2(5)	5	236.4	14.1	250.5	14.8	14.8	.	.	14.8	.	.	47.8
5	3/ 6	4	235.7	0.3	236.0	11.5	11.5	.	.	11.5	.	.	59.3
5	7/ 8	2	224.5	12.8	237.3	9.6	9.6	.	.	9.6	.	.	68.9
5	9/10	2	227.7	4.7	232.4	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	74.1
5	11/12	2	227.2	.	227.2	7.3	7.3	.	.	7.3	.	.	81.4
5	13/14	2	219.9	19.6	239.5	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	86.0
5	15/17	3	234.9	0.4	235.3	8.0	8.0	.	.	8.0	.	.	94.0
5	18/19	2	227.3	.	227.3	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	100.0
5	20/23	4	221.3	31.6	252.9	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	111.1
5	24/25	2	241.8	.	241.8	8.4	8.4	.	.	8.4	.	.	119.5
5	26/29	4	233.4	11.0	244.4	13.1	13.1	.	.	13.1	.	.	132.6
5	30/31	2	231.3	13.2	244.5	9.2	9.2	.	.	9.2	.	.	141.8
6	1/ 7	7	235.3	9.9	245.2	27.4	27.4	.	.	27.4	.	.	169.2
6	8/ 9	2	217.8	0.6	218.4	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	175.6
6	10/15	6	212.0	31.2	243.2	14.3	14.3	.	.	14.3	.	.	189.9
6	16/17	2	228.9	.	228.9	7.8	7.8	.	.	7.8	.	.	197.7
6	18/23	6	221.1	7.7	228.8	22.5	22.5	.	.	22.5	.	.	220.2
6	24/25	2	206.3	14.6	220.9	7.7	7.7	.	.	7.7	.	.	227.9
6	26/28	3	213.2	34.5	247.7	10.7	10.7	.	.	10.7	.	.	238.6
6/7	29(6)/ 1(7)	3	237.0	11.5	248.5	11.2	11.2	.	.	11.2	.	.	249.8
7	2/ 5	4	237.3	2.9	240.2	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	265.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	6/12	7	224.6	51.3	275.9	29.0	29.0	.	.	29.0	.	.	294.4
7	13	1	246.9	10.9	257.8	2.5	2.5	.	.	2.5	.	5.3	296.9
7	14/21	8	250.0	.	250.0	40.3	40.3	.	.	40.3	.	.	337.2
7	22/25	4	209.7	1.8	211.5	17.8	17.8	.	.	17.8	.	.	355.0
7	26/31	6	193.7	.	193.7	30.0	30.0	.	.	30.0	.	.	385.0
8	1/ 7	7	163.7	45.0	208.7	22.3	22.3	.	.	22.3	.	.	407.3
8	8/10	3	186.4	7.4	193.8	6.4	6.4	.	.	6.4	.	.	413.7
8	11/15	5	187.4	4.6	192.0	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	424.8
8	16/21	6	180.9	32.2	213.1	15.0	15.0	.	.	15.0	.	.	439.8
8	22/24	3	198.1	17.8	215.9	7.7	7.7	.	.	7.7	.	.	447.5
8	25/28	4	208.2	4.8	213.0	11.7	11.7	.	.	11.7	.	.	459.2
8/9	29(8)/ 3(9)	6	201.3	4.2	205.5	17.1	17.1	.	.	17.1	.	.	476.3
9	4/ 6	3	188.4	14.0	202.4	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	480.9
9	7/12	6	197.8	.	197.8	12.3	12.3	.	.	12.3	.	.	493.2
9	13/15	3	185.5	.	185.5	4.5	4.5	.	.	4.5	.	.	497.7
9	16/22	7	181.0	0	181.0	14.7	14.7	.	.	14.7	.	.	512.4
9	23	1	166.3	13.0	179.3	1.7	1.7	.	.	1.7	.	.	514.1
9	24/27	4	177.6	15.7	193.3	5.7	5.7	.	.	5.7	.	.	519.8
9	28/29	2	187.6	.	187.6	3.4	3.4	.	.	3.4	.	.	523.2
9/10	30(9)/ 7(10)	8	184.2	39.2	223.4	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	530.4
10	8	1	216.2	.	216.2	1.0	1.0	.	.	1.0	.	.	531.4
10	9/10	2	215.2	.	215.2	1.4	1.4	.	.	1.4	.	.	532.8
10	11/12	2	213.8	.	213.8	2.3	2.3	.	.	2.3	.	.	535.1
10	13/14	2	211.5	0.5	212.0	2.2	2.2	.	.	2.2	.	.	537.3
10	15/16	2	209.8	.	209.8	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	539.1
10	17	1	208.0	0.5	208.5	0.8	0.8	.	.	0.8	.	.	539.9
10	18/19	2	207.7	.	207.7	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	541.7
10	20/21	2	205.9	.	205.9	2.2	2.2	.	.	2.2	.	.	543.9
10	22/23	2	203.7	.	203.7	2.2	2.2	.	.	2.2	.	.	546.1
10	24/26	3	201.5	.	201.5	1.8	1.8	.	.	1.8	.	.	547.9
10	27/29	3	199.7	7	199.7	1.1	1.1	.	.	1.1	.	.	549.0
10/11	30(10)/ 6(11)	8	198.6	19.5	218.1	6.0	6.0	.	.	6.0	.	.	555.0
11	7/ 8	2	212.1	3.0	215.1	1.2	1.2	.	.	1.2	.	.	556.2
11	9/12	4	213.9	41.9	255.8	2.8	2.8	.	.	2.8	.	3.0	559.0
11	13/14	2	250.0	18.7	268.7	0.7	0.7	.	.	0.7	.	18.0	559.7
11	15/21	7	250.0	40.9	290.9	2.9	2.9	.	.	2.9	.	38.0	562.6

TABLEAU 80 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) - 1963

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250 mm
Réserve facilement utilisable = 140 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	Cumul ETt
4	14/22	9	250.0	13.4	263.4	25.1	25.1	.	.	25.1	.	.	25.1
4	23/24	2	238.3	1.8	240.1	3.7	3.7	.	.	3.7	.	.	28.8
4	25/27	3	236.4	.	236.4	4.7	4.7	.	.	4.7	.	.	33.5
4/5	28(4)/ 2(5)	5	231.7	11.3	243.0	14.7	14.7	.	.	14.7	.	.	48.2
5	3/ 6	4	228.3	.	228.3	11.6	11.6	.	.	11.6	.	.	59.8
5	7/ 8	2	216.7	12.5	229.2	9.6	9.6	.	.	9.6	.	.	69.4
5	9/10	2	219.6	4.3	223.9	5.3	5.3	.	.	5.3	.	.	74.7
5	11/12	2	218.6	.	218.6	7.2	7.2	.	.	7.2	.	.	81.9
5	13/14	2	211.4	14.8	226.2	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	86.5
5	15/17	3	221.6	.	221.6	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	94.4
5	18/19	2	213.7	.	213.7	5.8	5.8	.	.	5.8	.	.	100.2
5	20/23	4	207.9	31.1	239.0	11.4	11.4	.	.	11.4	.	.	111.6
5	24/25	2	227.6	.	227.6	8.1	8.1	.	.	8.1	.	.	119.7
5	26/29	4	219.5	12.6	232.1	13.0	13.0	.	.	13.0	.	.	132.7
5	30/31	2	219.1	3.2	222.3	8.9	8.9	.	.	8.9	.	.	141.6
6	1/ 7	7	213.4	38.1	251.5	27.9	27.9	.	.	27.9	.	.	169.5
6	8/ 9	2	223.6	0.6	224.2	6.5	6.5	.	.	6.5	.	.	176.0
6	10/15	6	217.7	41.7	259.4	14.1	14.1	.	.	14.1	.	.	190.1
6	16/17	2	245.3	.	245.3	8.1	8.1	.	.	8.1	.	.	198.2
6	18/23	6	237.2	3.6	240.8	21.4	21.4	.	.	21.4	.	.	219.6
6	24/25	2	219.4	11.0	230.4	7.9	7.9	.	.	7.9	.	.	227.5
6	26/28	3	222.5	47.5	270.0	10.8	10.8	.	.	10.8	9.2	.	238.3
6/7	29(6)/ 1(7)	3	250.0	14.2	264.2	11.3	11.3	.	.	11.3	2.9	.	249.6
7	2/ 5	4	250.0	1.5	251.5	15.9	15.9	.	.	15.9	.	.	265.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Et
7	6/12	7	235.6	17.2	252.8	29.6	29.6	.	.	29.6	.	12.1	295.1
7	13	1	223.2	6.0	229.2	2.5	2.5	.	.	2.5	.	12.1	297.6
7	14/21	8	226.7	.	226.7	40.4	40.4	.	.	40.4	.	12.1	338.0
7	22/25	4	186.3	0.3	186.6	17.7	17.7	.	.	17.7	.	12.1	355.7
7	26/31	6	168.9	.	168.9	29.1	28.9	0.999	0.2	29.1	.	12.1	384.8
8	1/ 7	7	139.8	125.5	265.3	21.9	21.9	.	.	21.9	.	12.1	406.7
8	8/10	3	243.4	14.7	258.1	6.4	6.4	.	.	6.4	.	1.7	413.1
8	11/15	5	250.0	5.4	255.4	11.2	11.2	.	.	11.2	.	13.8	424.3
8	16/21	6	244.2	26.6	270.8	15.2	15.2	.	.	15.2	.	19.4	439.5
8	22/24	3	250.0	9.9	259.9	7.8	7.8	.	.	7.8	.	21.5	447.3
8	25/28	4	250.0	1.4	251.4	11.8	11.8	.	.	11.8	.	21.5	459.1
8/9	29(8)/ 3(9)	6	239.6	7.5	247.1	17.1	17.1	.	.	17.1	.	21.5	476.2
9	4/ 6	3	230.0	7.4	237.4	4.6	4.6	.	.	4.6	.	21.5	480.8
9	7/12	6	232.8	.	232.8	12.0	12.0	.	.	12.0	.	21.5	492.8
9	13/15	3	220.8	.	220.8	4.5	4.5	.	.	4.5	.	21.5	497.3
9	16/22	7	216.3	.	216.3	14.8	14.8	.	.	14.8	.	21.5	512.1
9	23	1	201.5	26.5	228.0	1.8	1.8	.	.	1.8	.	21.5	513.9
9	24/27	4	226.2	13.9	240.1	5.3	5.3	.	.	5.3	.	21.5	519.2
9	28/29	2	234.8	.	234.8	3.3	3.3	.	.	3.3	.	21.5	522.5
9/10	30(9)/ 7(10)	8	231.5	29.2	260.7	7.1	7.1	.	.	7.1	.	25.1	529.6
10	8	1	250.0	.	250.0	0.9	0.9	.	.	0.9	.	25.1	530.5
10	9/10	2	249.1	.	249.1	1.5	1.5	.	.	1.5	.	25.1	532.0
10	11/12	2	247.6	.	247.6	2.4	2.4	.	.	2.4	.	25.1	534.4
10	13/14	2	245.2	0.5	245.7	2.2	2.2	.	.	2.2	.	25.1	536.6
10	15/16	2	243.5	.	243.5	2.1	2.1	.	.	2.1	.	25.1	538.7
10	17	1	241.4	0.9	242.3	0.7	0.7	.	.	0.7	.	25.1	539.4
10	18/19	2	241.6	.	241.6	2.0	2.0	.	.	2.0	.	25.1	541.4
10	20/21	2	239.6	.	239.6	2.5	2.5	.	.	2.5	.	25.1	543.9
10	22/23	2	237.1	.	237.1	2.1	2.1	.	.	2.1	.	25.1	546.0
10	24/26	3	235.0	.	235.0	1.7	1.7	.	.	1.7	.	25.1	547.7
10	27/29	3	233.3	.	233.3	1.2	1.2	.	.	1.2	.	25.1	548.9
10/11	30(10)/ 6(11)	8	232.1	35.5	267.6	6.1	6.1	.	.	6.1	.	36.6	555.0
11	7/ 8	2	250.0	2.2	252.2	1.4	1.4	.	.	1.4	.	37.4	556.4
11	9/12	4	250.0	19.1	269.1	3.4	3.4	.	.	3.4	.	53.1	559.8
11	13/14	2	250.0	19.9	269.9	0.7	0.7	.	.	0.7	.	72.3	560.5
11	15/21	7	250.0	32.7	282.7	3.8	3.8	.	.	3.8	.	101.2	564.3

TABLEAU 81 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) - 1964

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 100 mm
Réserve facilement utilisable = 50 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
4	15/16	2	100.0	.	100.0	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	5.5
4	17/19	3	94.5	45.9	140.4	4.2	4.2	.	.	4.2	.	36.2	9.7
4	20/21	2	100.0	3.3	103.3	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	14.9
4	22/23	2	98.1	10.1	108.2	3.3	3.3	.	.	3.3	.	4.9	18.2
4	24/27	4	100.0	0.6	100.6	12.8	12.8	.	.	12.8	.	.	31.0
4	28/29	2	87.8	0.6	88.4	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	36.5
4/5	30(4)/ 2(5)	3	82.9	.	82.9	9.7	9.7	.	.	9.7	.	.	46.2
5	3/ 5	3	73.2	22.7	95.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	51.7
5	6/ 8	3	90.4	.	90.4	10.2	10.2	.	.	10.2	.	.	61.9
5	9/12	4	80.2	.	80.2	18.2	18.2	.	.	18.2	.	.	80.1
5	13/14	2	62.0	.	62.0	5.4	5.4	.	.	5.4	.	.	85.5
5	15/17	3	56.6	.	56.6	15.6	6.6	0.827	8.7	15.3	0.3	.	100.8
5	18/22	5	41.3	.	41.3	19.1	.	0.672	13.6	13.6	5.5	.	114.3
5	23/27	5	27.8	.	27.8	12.5	.	0.774	6.3	6.3	6.2	.	120.6
5	28/31	4	21.5	.	21.5	17.9	.	0.687	6.7	6.7	11.2	.	127.3
6	1/ 7	7	14.8	27.1	41.9	27.3	.	0.566	18.2	18.2	9.1	.	145.5
6	8/11	4	23.7	.	23.7	19.5	.	0.663	8.0	8.0	11.5	.	153.5
6	12/14	3	15.7	24.1	39.8	13.6	.	0.752	9.9	9.9	3.7	.	163.3
6	15/17	3	30.0	.	30.0	12.8	.	0.765	7.0	7.0	5.8	.	170.4
6	18/20	3	22.9	1.5	24.4	11.2	.	0.792	5.1	5.1	6.1	.	175.5
6	21/25	5	19.3	.	19.3	18.9	.	0.675	6.3	6.3	12.6	.	181.7
6	26/27	2	13.1	1.0	14.1	8.3	.	0.841	2.2	2.2	6.1	.	184.0
6	28/30	3	11.8	.	11.8	13.3	.	0.757	2.9	2.9	10.4	.	186.9

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE		CUMUL
											partiel	cumulé	partiel	cumulé	ETt
7	1/ 8	8	8.9	.	8.9	41.7	.	0.414	5.2	5.2	36.5	125.1	.	41.1	192.1
7	9/12	4	3.7	14.4	18.1	11.0	.	0.797	3.7	3.7	7.3	132.4	.	41.1	195.8
7	13/17	5	14.4	.	14.4	30.6	.	0.521	6.9	6.9	23.7	156.1	.	41.1	202.7
7	18/21	4	7.5	4.0	11.5	19.8	.	0.659	3.9	3.9	15.9	172.0	.	41.1	206.6
7	22/26	5	7.6	.	7.6	31.8	.	0.506	3.7	3.7	28.1	200.0	.	41.1	210.4
7	27/31	5	3.8	.	3.8	25.4	.	0.585	1.6	1.6	23.8	223.9	.	41.1	211.9
8	1/ 3	3	2.3	.	2.3	9.9	.	0.815	0.4	0.4	9.5	233.3	.	41.1	212.4
8	4/ 6	3	1.8	0.9	2.7	15.6	.	0.719	0.8	0.8	14.8	248.2	.	41.1	213.1
8	7/ 8	2	2.0	12.5	14.5	5.2	.	0.899	1.5	1.5	3.7	251.9	.	41.1	214.6
8	9/10	2	13.0	14.8	27.8	4.4	.	0.914	2.4	2.4	2.0	253.9	.	41.1	217.0
8	11/15	5	25.4	1.7	27.1	13.9	.	0.751	6.7	6.7	7.2	261.1	.	41.1	223.7
8	16/19	4	20.4	26.7	47.1	14.5	.	0.740	12.2	12.2	2.3	263.3	.	41.1	236.0
8	20/22	3	34.8	1.5	36.3	7.9	.	0.850	5.4	5.4	2.5	265.8	.	41.1	241.4
8	23/27	5	30.9	.	30.9	22.3	.	0.627	11.5	11.5	10.8	276.6	.	41.1	252.9
8	28/29	2	19.4	3.8	23.2	6.5	.	0.874	2.9	2.9	3.6	280.1	.	41.1	255.9
8	30/31	2	20.2	.	20.2	8.2	.	0.843	3.3	3.3	5.0	285.2	.	41.1	259.0
9	1/ 2	2	17.1	.	17.1	8.0	.	0.846	2.6	2.6	5.4	290.5	.	41.1	261.7
9	3/ 6	4	14.4	17.4	31.8	9.8	.	0.818	5.8	5.8	4.0	294.5	.	41.1	267.5
9	7/10	4	26.0	.	26.0	9.3	.	0.827	4.5	4.5	4.8	299.3	.	41.1	272.0
9	11/14	4	21.5	1.1	22.6	14.5	.	0.740	5.9	5.9	8.6	307.9	.	41.1	277.9
9	15/20	6	16.7	69.4	86.1	10.4	10.4	.	.	10.4	.	307.9	.	41.1	288.3
9	21/25	5	75.7	.	75.7	12.6	12.6	.	.	12.6	.	307.9	.	41.1	300.9
9	26/27	2	63.1	14.0	77.1	2.3	2.3	.	.	2.3	.	307.9	.	41.1	303.2
9	28/29	2	74.8	.	74.8	3.9	3.9	.	.	3.9	.	307.9	.	41.1	307.1
9/10	30(9)/ 6(10)	7	70.9	11.3	82.2	10.8	10.8	.	.	10.8	.	307.9	.	41.1	317.9
10	7/11	5	71.4	41.6	113.0	5.0	5.0	.	.	5.0	.	307.9	8.0	49.1	322.9
10	12/14	3	100.0	10.7	110.7	2.5	2.5	.	.	2.5	.	307.9	8.2	57.3	325.4
10	15/16	2	100.0	12.5	112.5	1.4	1.4	.	.	1.4	.	307.9	11.1	68.4	326.8
10	17/18	2	100.0	0.7	100.7	1.4	1.4	.	.	1.4	.	307.9	.	68.4	328.2
10	19/22	4	99.3	0.3	99.6	2.0	2.0	.	.	2.0	.	307.9	.	68.4	330.2
10	23/25	3	97.6	8.0	105.6	1.5	1.5	.	.	1.5	.	307.9	4.1	72.5	331.7
10/11	26(10)/ 2(11)	8	100.0	.	100.0	4.2	4.2	.	.	4.2	.	307.9	.	72.5	335.9
11	3/ 5	3	95.8	0.5	96.3	1.5	1.5	.	.	1.5	.	307.9	.	72.5	337.4

TABLEAU 82 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) - 1964

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 100 mm
Réserve facilement utilisable = 50 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	100.0	.	100.0	6.8	6.8	.	.	6.8	.	.	6.8
4	17/19	3	93.2	31.0	124.2	4.2	4.2	.	.	4.2	.	20.0	11.0
4	20/21	2	100.0	1.5	101.5	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	15.6
4	22/23	2	96.9	9.1	106.0	3.4	3.4	.	.	3.4	.	2.6	19.0
4	24/27	4	100.0	.	100.0	13.1	13.1	.	.	13.1	.	.	32.1
4	28/29	2	86.9	2.0	88.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	37.6
4/5	30(4)/ 2(5)	3	83.4	0.4	83.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	.	47.0
5	3/ 5	3	74.4	16.8	91.2	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	52.5
5	6/ 8	3	85.7	.	85.7	10.4	10.4	.	.	10.4	.	.	62.9
5	9/12	4	75.3	.	75.3	18.5	18.5	.	.	18.5	.	.	81.4
5	13/14	2	56.8	0.1	56.9	5.0	5.0	.	.	5.0	.	.	86.4
5	15/17	3	51.9	.	51.9	15.3	1.9	0.754	12.3	14.2	1.1	.	100.6
5	18/22	5	37.7	.	37.7	19.3	.	0.669	12.5	12.5	6.8	.	113.1
5	23/27	5	25.2	57.7	82.9	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	125.0
5	28/31	4	71.0	.	71.0	17.9	17.9	.	.	17.9	.	.	142.9
6	1/ 7	7	53.1	18.0	71.1	27.2	21.1	0.881	5.9	27.1	0.1	.	169.9
6	8/11	4	44.1	.	44.1	19.3	.	0.666	14.7	14.7	4.6	.	184.6
6	12/14	3	29.4	28.1	57.5	13.5	7.5	0.881	5.9	13.4	0.1	.	198.0
6	15/17	3	44.1	.	44.1	12.8	.	0.765	10.3	10.3	2.5	.	208.4
6	18/20	3	33.7	.	33.7	11.1	.	0.794	6.9	6.9	4.2	.	215.3
6	21/25	5	26.8	.	26.8	19.1	.	0.672	8.8	8.8	10.3	.	224.1
6	26/27	2	18.0	2.2	20.2	8.2	.	0.843	3.2	3.2	5.0	.	227.3
6	28/30	3	17.0	.	17.0	13.2	.	0.759	4.1	4.1	9.1	.	231.4

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	1/ 8	8	12.9	.	12.9	41.4	.	0.417	7.5	7.5	33.9	77.7	238.9
7	9/12	4	5.4	4.8	10.2	11.1	.	0.796	2.1	2.1	9.0	86.7	241.0
7	13/17	5	8.1	.	8.1	30.8	.	0.518	3.9	3.9	26.9	113.6	244.9
7	18/21	4	4.2	9.5	13.7	19.4	.	0.665	4.6	4.6	14.8	128.4	249.5
7	22/26	5	9.1	.	9.1	30.9	.	0.517	4.4	4.4	26.5	154.9	253.9
7	27/31	5	4.7	.	4.7	26.0	.	0.577	2.0	2.0	24.0	178.9	255.9
8	1/ 3	3	2.7	.	2.7	9.9	.	0.815	0.5	0.5	9.4	188.3	256.4
8	4/ 6	3	2.2	.	2.2	15.4	.	0.723	0.6	0.6	14.8	203.1	257.0
8	7/ 8	2	1.6	8.5	10.1	5.4	.	0.895	1.1	1.1	4.3	207.4	258.1
8	9/10	2	9.0	18.0	27.0	4.4	.	0.914	2.3	2.3	2.1	209.5	260.4
8	11/15	5	24.7	8.8	33.5	13.2	.	0.762	8.0	8.0	5.2	214.8	268.3
8	16/19	4	25.6	18.9	44.5	15.1	.	0.731	12.0	12.0	3.1	217.9	280.3
8	20/22	3	32.5	3.5	36.0	8.0	.	0.848	5.5	5.5	2.5	220.4	285.8
8	23/27	5	30.5	.	30.5	23.2	.	0.614	11.8	11.8	11.4	231.9	297.5
8	28/29	2	18.8	4.5	23.3	6.4	.	0.876	2.9	2.9	3.5	235.4	300.4
8	30/31	2	20.4	.	20.4	7.8	.	0.850	3.1	3.1	4.7	240.1	303.5
9	1/ 2	2	17.3	.	17.3	7.3	.	0.859	2.4	2.4	4.9	245.0	305.9
9	3/ 6	4	14.9	11.7	26.6	9.7	.	0.820	4.8	4.8	4.9	249.9	310.7
9	7/10	4	21.8	.	21.8	9.0	.	0.832	3.7	3.7	5.3	255.2	314.4
9	11/14	4	18.1	2.1	20.2	14.8	.	0.735	5.4	5.4	9.4	264.7	319.7
9	15/20	6	14.9	56.9	71.8	11.9	11.9	.	.	11.9	.	264.7	331.6
9	21/25	5	59.9	.	59.9	12.5	9.9	0.947	2.6	12.5	.	264.7	344.1
9	26/27	2	47.4	16.5	63.9	2.3	2.3	.	.	2.3	.	264.7	346.4
9	28/29	2	61.6	.	61.6	3.9	3.9	.	.	3.9	.	264.7	350.3
9/10	30(9)/ 6(10)	7	57.7	5.3	63.0	10.7	10.7	.	.	10.7	.	264.7	361.0
10	7/11	5	52.3	31.6	83.9	5.2	5.2	.	.	5.2	.	264.7	366.2
10	12/14	3	78.7	9.5	88.2	2.3	2.3	.	.	2.3	.	264.7	368.5
10	15/16	2	85.9	13.5	99.4	1.5	1.5	.	.	1.5	.	264.7	370.0
10	17/18	2	97.9	1.8	99.7	1.2	1.2	.	.	1.2	.	264.7	371.2
10	19/22	4	98.5	.	98.5	2.0	2.0	.	.	2.0	.	264.7	373.2
10	23/25	3	96.5	5.7	102.2	1.3	1.3	.	.	1.3	.	264.7	374.5
10/11	26(10)/ 2(11)	8	100.0	.	100.0	3.9	3.9	.	.	3.9	.	264.7	378.4
11	3/ 5	3	96.1	0.8	96.9	1.3	1.3	.	.	1.3	.	264.7	379.7

TABLEAU 83 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) - 1964

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250 mm
Réserve facilement utilisable = 110 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	.	250.0	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	5.5
4	17/19	3	244.5	45.9	290.4	4.2	4.2	.	.	4.2	.	36.2	9.7
4	20/21	2	250.0	3.3	253.3	5.2	5.2	.	.	5.2	.	.	14.9
4	22/23	2	248.1	10.1	258.2	3.3	3.3	.	.	3.3	.	4.9	18.2
4	24/27	4	250.0	0.6	250.6	12.8	12.8	.	.	12.8	.	.	31.0
4	28/29	2	237.8	0.6	238.4	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	36.5
4/5	30(4)/ 2(5)	3	232.9	.	232.9	9.7	9.7	.	.	9.7	.	.	46.2
5	3/ 5	3	223.2	22.7	245.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	51.7
5	6/ 8	3	240.4	.	240.4	10.2	10.2	.	.	10.2	.	.	61.9
5	9/12	4	230.2	.	230.2	18.2	18.2	.	.	18.2	.	.	80.1
5	13/14	2	212.0	.	212.0	5.4	5.4	.	.	5.4	.	.	85.5
5	15/17	3	206.6	.	206.6	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	101.1
5	18/22	5	191.0	.	191.0	19.1	19.1	.	.	19.1	.	.	120.2
5	23/27	5	171.9	.	171.9	12.5	12.5	.	.	12.5	.	.	132.7
5	28/31	4	159.4	.	159.4	17.9	17.9	.	.	17.9	.	.	150.6
6	1/ 7	7	141.5	27.1	168.6	27.3	27.3	.	.	27.3	.	.	177.9
6	8/11	4	141.3	.	141.3	19.5	1.3	0.876	17.4	18.7	0.8	.	196.6
6	12/14	3	122.6	24.1	146.7	13.6	6.7	0.951	6.8	13.5	0.1	.	210.1
6	15/17	3	133.2	.	133.2	12.8	.	0.911	11.8	11.8	1.0	.	221.9
6	18/20	3	121.4	1.5	122.9	11.2	.	0.922	9.6	9.6	1.6	.	231.5
6	21/25	5	113.3	.	113.3	18.9	.	0.872	14.5	14.5	4.4	.	246.0
6	26/27	2	98.8	1.0	99.8	8.3	.	0.942	5.8	5.8	2.5	.	251.8
6	28/30	3	94.0	.	94.0	13.3	.	0.908	8.6	8.6	4.7	.	260.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT		DRAINAGE		CUMUL
											partiel cumulé	partiel cumulé	partiel cumulé	partiel cumulé	ETt
7	1/ 8	8	85.3	.	85.3	41.7	.	0.738	22.3	22.3	19.4	34.4	.	41.1	282.8
7	9/12	4	63.0	14.4	77.4	11.0	.	0.924	5.9	5.9	5.1	39.5	.	41.1	288.7
7	13/17	5	71.5	.	71.5	30.6	.	0.800	14.3	14.3	16.3	55.8	.	41.1	303.0
7	18/21	4	57.2	4.0	61.2	19.8	.	0.866	8.2	8.2	11.6	67.4	.	41.1	311.2
7	22/26	5	53.0	.	53.0	31.8	.	0.793	11.0	11.0	20.8	88.2	.	41.1	322.2
7	27/31	5	42.0	.	42.0	25.4	.	0.831	7.1	7.1	18.3	106.5	.	41.1	329.3
8	1/ 3	3	34.9	.	34.9	9.9	.	0.931	2.4	2.4	7.5	114.0	.	41.1	331.7
8	4/ 6	3	32.5	0.9	33.4	15.6	.	0.893	3.6	3.6	12.0	126.0	.	41.1	335.3
8	7/ 8	2	29.8	12.5	42.3	5.2	.	0.963	1.6	1.6	3.6	129.7	.	41.1	336.8
8	9/10	2	40.8	14.8	55.6	4.4	.	0.969	1.7	1.7	2.7	132.3	.	41.1	338.6
8	11/15	5	53.8	1.7	55.5	13.9	.	0.905	5.3	5.3	8.6	140.9	.	41.1	343.9
8	16/19	4	50.2	26.7	76.9	14.5	.	0.900	7.7	7.7	6.8	147.8	.	41.1	351.5
8	20/22	3	69.3	1.5	70.8	7.9	.	0.945	3.9	3.9	4.0	151.7	.	41.1	355.5
8	23/27	5	66.8	8	66.8	22.3	.	0.851	10.0	10.0	12.3	164.1	.	41.1	365.4
8	28/29	2	56.9	3.8	60.7	6.5	.	0.954	2.8	2.8	3.7	167.8	.	41.1	368.2
8	30/31	2	57.9	9	57.9	8.2	.	0.942	3.3	3.3	4.9	172.6	.	41.1	371.6
9	1/ 2	2	54.5	.	54.5	8.0	.	0.944	3.1	3.1	4.9	177.6	.	41.1	374.6
9	3/ 6	4	51.5	17.4	68.9	9.8	.	0.932	4.7	4.7	5.1	182.7	.	41.1	379.3
9	7/10	4	64.2	.	64.2	9.3	.	0.935	4.2	4.2	5.1	187.8	.	41.1	383.5
9	11/14	4	60.0	1.1	61.1	14.5	.	0.900	6.1	6.1	8.4	196.2	.	41.1	389.6
9	15/20	6	55.0	69.4	124.4	10.4	.	0.928	9.0	9.0	1.4	197.7	.	41.1	398.5
9	21/25	5	115.5	.	115.5	12.6	.	0.913	10.0	10.0	2.6	200.3	.	41.1	408.6
9	26/27	2	105.4	14.0	119.4	2.3	.	0.984	2.0	2.0	0.3	200.6	.	41.1	410.5
9	28/29	2	117.5	.	117.5	3.9	.	0.972	3.2	3.2	0.7	201.3	.	41.1	413.8
9/10	30(9)/ 6(10)	7	114.2	11.3	125.5	10.8	.	0.925	9.4	9.4	1.4	202.7	.	41.1	423.1
10	7/11	5	116.2	41.6	157.8	5.0	5.0	.	.	5.0	.	202.7	.	41.1	428.1
10	12/14	3	152.8	10.7	163.5	2.5	2.5	.	.	2.5	.	202.7	.	41.1	430.6
10	15/16	2	161.0	12.5	173.5	1.4	1.4	.	.	1.4	.	202.7	.	41.1	432.0
10	17/18	2	172.1	0.7	172.8	1.4	1.4	.	.	1.4	.	202.7	.	41.1	433.4
10	19/22	4	171.4	0.3	171.7	2.0	2.0	.	.	2.0	.	202.7	.	41.1	435.4
10	23/25	3	169.7	8.0	177.7	1.5	1.5	.	.	1.5	.	202.7	.	41.1	436.9
10/11	26(10)/ 2(11)	8	176.2	.	176.2	4.2	4.2	.	.	4.2	.	202.7	.	41.1	441.1
11	3/ 5	3	172.0	0.5	172.5	1.5	1.5	.	.	1.5	.	202.7	.	41.1	442.6

TABLEAU 84 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) - 1964

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250 mm
Réserve facilement utilisable = 110 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP f	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	.	250.0	6.8	6.8	.	.	6.8	.	.	6.8
4	17/19	3	243.2	31.0	274.2	4.2	4.2	.	.	4.2	.	20.0	11.0
4	20/21	2	250.0	1.5	251.5	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	15.6
4	22/23	2	246.9	9.1	256.0	3.4	3.4	.	.	3.4	.	2.6	19.0
4	24/27	4	250.0	.	250.0	13.1	13.1	.	.	13.1	.	.	32.1
4	28/29	2	236.9	2.0	238.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	37.6
4/5	30(4)/ 2(5)	3	233.4	0.4	233.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	.	47.0
5	3/ 5	3	224.4	16.8	241.2	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	52.5
5	6/ 8	3	235.7	.	235.7	10.4	10.4	.	.	10.4	.	.	62.9
5	9/12	4	225.3	.	225.3	18.5	18.5	.	.	18.5	.	.	81.4
5	13/14	2	206.8	0.1	206.9	5.0	5.0	.	.	5.0	.	.	86.4
5	15/17	3	201.9	.	201.9	15.3	15.3	.	.	15.3	.	.	101.7
5	18/22	5	188.6	.	186.6	19.3	19.3	.	.	19.3	.	.	121.0
5	23/27	5	167.3	57.7	225.0	11.9	11.9	.	.	11.9	.	.	132.9
5	28/31	4	213.1	.	213.1	17.9	17.9	.	.	17.9	.	.	150.8
6	1/ 7	7	195.2	18.0	213.2	27.2	27.2	.	.	27.2	.	.	178.0
6	8/11	4	186.0	.	186.0	19.3	19.3	.	.	19.3	.	.	197.3
6	12/14	3	166.7	28.1	194.8	13.5	13.5	.	.	13.5	.	.	210.8
6	15/17	3	181.3	.	181.3	12.8	12.8	.	.	12.8	.	.	223.6
6	18/20	3	168.5	.	168.5	11.1	11.1	.	.	11.1	.	.	234.7
6	21/25	5	157.4	.	157.4	19.1	17.4	0.988	1.7	19.1	.	.	253.8
6	26/27	2	138.3	2.2	140.5	8.2	0.5	0.946	7.6	8.1	0.1	.	261.9
6	28/30	3	132.4	.	132.4	13.2	.	0.909	12.1	12.1	1.1	.	274.0

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
7	1/ 8	8	120.3	.	120.3	41.4	.	0.740	31.3	31.3	10.1	11.3	22.6
7	9/12	4	89.0	4.8	93.8	11.1	.	0.923	7.2	7.2	3.9	15.2	22.6
7	13/17	5	86.6	.	86.6	30.8	.	0.799	17.4	17.4	13.4	28.5	22.6
7	18/21	4	69.1	9.5	78.6	19.4	.	0.868	10.3	10.3	9.1	37.6	22.6
7	22/26	5	68.3	.	68.3	30.9	.	0.798	13.8	13.8	17.1	54.7	22.6
7	27/31	5	54.5	.	54.5	26.0	.	0.828	9.4	9.4	16.6	71.3	22.6
8	1/ 3	3	45.1	.	45.1	9.9	.	0.931	3.1	3.1	6.8	78.1	22.6
8	4/ 6	3	42.0	.	42.0	15.4	.	0.894	4.5	4.5	10.9	89.0	22.6
8	7/ 8	2	37.5	8.5	46.0	5.4	.	0.962	1.8	1.8	3.6	92.7	22.6
8	9/10	2	44.3	18.0	62.3	4.4	.	0.969	1.9	1.9	2.5	95.1	22.6
8	11/15	5	60.3	8.8	69.1	13.2	.	0.909	6.3	6.3	6.9	102.0	22.6
8	16/19	4	62.9	18.9	81.8	15.1	.	0.896	8.5	8.5	6.6	108.7	22.6
8	20/22	3	73.3	3.5	76.8	8.0	.	0.944	4.3	4.3	3.7	112.4	22.6
8	23/27	5	72.5	.	72.5	23.2	.	0.845	11.2	11.2	12.0	124.3	22.6
8	28/29	2	61.2	4.5	65.7	6.4	.	0.955	3.0	3.0	3.4	127.8	22.6
8	30/31	2	62.8	.	62.8	7.8	.	0.945	3.4	3.4	4.4	132.1	22.6
9	1/ 2	2	59.3	.	59.3	7.3	.	0.949	3.1	3.1	4.2	136.4	22.6
9	3/ 6	4	56.3	11.7	68.0	9.7	.	0.932	4.6	4.6	5.1	141.5	22.6
9	7/10	4	63.4	.	63.4	9.0	.	0.937	4.0	4.0	5.0	146.5	22.6
9	11/14	4	59.4	2.1	61.5	14.8	.	0.898	6.2	6.2	8.6	155.1	22.6
9	15/20	6	55.3	56.9	112.2	11.9	.	0.918	9.2	9.2	2.7	157.8	22.6
9	21/25	5	103.0	.	103.0	12.5	.	0.914	8.9	8.9	3.6	161.4	22.6
9	26/27	2	94.1	16.5	110.6	2.3	.	0.984	1.8	1.8	0.5	161.9	22.6
9	28/29	2	108.8	.	108.8	3.9	.	0.972	3.0	3.0	0.9	162.8	22.6
9/10	30(9)/ 6(10)	7	105.8	5.3	111.1	10.7	.	0.926	8.2	8.2	2.5	165.2	22.6
10	7/11	5	102.8	31.6	134.4	5.2	.	0.963	4.9	4.9	0.3	165.5	22.6
10	12/14	3	129.5	9.5	139.0	2.3	.	0.984	2.3	2.3	.	165.5	22.6
10	15/16	2	136.8	13.5	150.3	1.5	1.5	.	.	1.5	.	165.5	22.6
10	17/18	2	148.8	1.8	150.6	1.2	1.2	.	.	1.2	.	165.5	22.6
10	19/22	4	149.4	.	149.4	2.0	2.0	.	.	2.0	.	165.5	22.6
10	23/25	3	147.4	5.7	153.1	1.3	1.3	.	.	1.3	.	165.5	22.6
10/11	26(10)/ 2(11)	8	151.8	.	151.8	3.9	3.9	.	.	3.9	.	165.5	22.6
11	3/ 5	3	147.9	0.8	148.7	1.3	1.3	.	.	1.3	.	165.5	22.6

TABLEAU 85 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) - 1964

Analyse par séquences de temps

albedo = 15

Réserve utile = 250 mm

Formule aménagée

Réserve facilement utilisable = 140 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	.	250.0	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	5.5
4	17/19	3	244.5	45.9	290.4	4.2	4.2	.	.	4.2	.	36.2	9.7
4	20/21	2	250.0	3.3	253.3	5.2	5.2	.	.	5.2	.	36.2	14.9
4	22/23	2	248.1	10.1	258.2	3.3	3.3	.	.	3.3	.	4.9	18.2
4	24/27	4	250.0	0.6	250.6	12.8	12.8	.	.	12.8	.	.	31.0
4	28/29	2	237.8	0.6	238.4	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	36.5
4/5	30(4)/ 2(5)	3	232.9	.	232.9	9.7	9.7	.	.	9.7	.	.	46.2
5	3/ 5	3	223.2	22.7	245.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	.	51.7
5	6/ 8	3	240.4	.	240.4	10.2	10.2	.	.	10.2	.	.	61.9
5	9/12	4	230.2	.	230.2	18.2	18.2	.	.	18.2	.	.	80.1
5	13/14	2	212.0	.	212.0	5.4	5.4	.	.	5.4	.	.	85.5
5	15/17	3	206.6	.	206.6	15.6	15.6	.	.	15.6	.	.	101.1
5	18/22	5	191.0	.	191.0	19.1	19.1	.	.	19.1	.	.	120.2
5	23/27	5	171.9	.	171.9	12.5	12.5	.	.	12.5	.	.	132.7
5	28/31	4	159.4	.	159.4	17.9	17.9	.	.	17.9	.	.	150.6
6	1/ 7	7	141.5	27.1	168.6	27.3	27.3	.	.	27.3	.	.	177.9
6	8/11	4	141.3	.	141.3	19.5	19.5	.	.	19.5	.	.	197.4
6	12/14	3	121.8	24.1	145.9	13.6	13.6	.	.	13.6	.	.	211.0
6	15/17	3	132.3	.	132.3	12.8	12.8	.	.	12.8	.	.	223.8
6	18/20	3	119.5	1.5	121.0	11.2	11.0	0.998	0.2	11.2	.	.	235.0
6	21/25	5	109.8	.	109.8	18.9	.	0.840	17.6	17.6	1.3	.	252.6
6	26/27	2	92.2	1.0	93.2	8.3	.	0.926	6.9	6.9	1.4	.	259.5
6	28/30	3	86.3	.	86.3	13.3	.	0.884	10.0	10.0	3.3	.	269.5

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt	
7	1/ 8	8	76.3	.	76.3	41.7	.	0.678	24.5	24.5	17.2	23.2	41.1	294.1
7	9/12	4	51.7	14.4	66.1	11.0	.	0.904	6.4	6.4	4.6	27.8	41.1	300.4
7	13/17	3	59.8	.	59.8	30.6	.	0.751	14.9	14.9	15.7	43.5	41.1	315.3
7	18/21	4	44.9	4.0	48.9	19.8	.	0.832	8.2	8.2	11.6	55.1	41.1	323.5
7	22/26	5	40.7	.	40.7	31.8	.	0.742	10.5	10.5	21.3	76.4	41.1	334.0
7	27/31	5	30.2	.	30.2	25.4	.	0.789	6.4	6.4	19.0	95.4	41.1	340.4
8	1/ 3	3	23.8	.	23.8	9.9	.	0.913	2.1	2.1	7.8	103.3	41.1	342.4
8	4/ 6	3	21.8	0.9	22.7	15.6	.	0.865	3.1	3.1	12.5	115.8	41.1	345.5
8	7/ 8	2	19.6	12.5	32.1	5.2	.	0.953	1.5	1.5	3.7	119.5	41.1	347.0
8	9/10	2	30.6	14.8	45.4	4.4	.	0.960	1.8	1.8	2.6	122.1	41.1	348.8
8	11/15	5	43.6	1.7	45.3	13.9	.	0.880	5.4	5.4	8.5	130.6	41.1	354.2
8	16/19	4	39.9	26.7	66.6	14.5	.	0.875	8.3	8.3	6.2	136.7	41.1	362.6
8	20/22	3	58.2	1.5	59.7	7.9	.	0.930	4.2	4.2	3.7	140.4	41.1	366.8
8	23/27	5	55.5	.	55.5	22.3	.	0.813	10.4	10.4	11.9	152.3	41.1	377.2
8	28/29	2	45.1	3.8	48.9	6.5	.	0.942	2.8	2.8	3.7	156.0	41.1	380.0
8	30/31	2	46.1	.	46.1	8.2	.	0.927	3.4	3.4	4.8	160.8	41.1	383.4
9	1/ 2	2	42.7	.	42.7	8.0	.	0.929	3.1	3.1	4.9	165.7	41.1	386.4
9	3/ 6	4	39.7	17.4	57.1	9.8	.	0.914	4.9	4.9	4.9	170.6	41.1	391.3
9	7/10	4	52.1	.	52.1	9.3	.	0.918	4.3	4.3	5.0	175.6	41.1	395.6
9	11/14	4	47.9	1.1	49.0	14.5	.	0.875	6.1	6.1	8.4	184.0	41.1	401.8
9	15/20	6	42.8	69.4	112.2	10.4	2.2	0.928	7.9	10.2	0.2	184.3	41.1	411.9
9	21/25	5	102.1	.	102.1	12.6	.	0.891	11.2	11.2	1.4	185.7	41.1	423.1
9	26/27	2	90.9	14.0	104.9	2.3	.	0.979	2.2	2.2	0.1	185.8	41.1	425.3
9	28/29	2	102.7	.	102.7	3.9	.	0.965	3.6	3.6	0.3	186.1	41.1	428.9
9/10	30(9)/ 6(10)	7	99.1	11.3	110.4	10.8	0.4	0.909	10.0	10.0	10.4	186.5	41.1	439.3
10	7/11	5	100.0	41.6	141.6	5.0	5.0	.	.	5.0	.	186.5	41.1	444.3
10	12/14	3	136.6	10.7	147.3	2.5	2.5	.	.	2.5	.	186.5	41.1	446.8
10	15/16	2	144.8	12.5	157.3	1.4	1.4	.	.	1.4	.	186.5	41.1	448.2
10	17/18	2	155.9	0.7	156.6	1.4	1.4	.	.	1.4	.	186.5	41.1	449.6
10	19/22	4	155.2	0.3	155.5	2.0	2.0	.	.	2.0	.	186.5	41.1	451.6
10	23/25	3	153.5	8.0	161.5	1.5	1.5	.	.	1.5	.	186.5	41.1	453.1
10/11	26(10)/ 2(11)	8	160.0	0	160.0	4.2	4.2	.	.	4.2	.	186.5	41.1	457.3
11	3/ 5	3	155.8	0.5	156.3	1.5	1.5	.	.	1.5	.	186.5	41.1	458.8

TABLEAU 86 : APPROCHE DU BILAN HYDRIQUE DU NIVERNAIS

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) - 1964

Analyse par séquences de temps

Formule aménagée

albedo = 15
Réserve utile = 250 mm
Réserve facilement utilisable = 140 mm

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL ETt
4	15/16	2	250.0	.	250.0	6.8	6.8	.	.	6.8	.	.	6.8
4	17/19	3	243.2	31.0	274.2	4.2	4.2	.	.	4.2	20.0	20.0	11.0
4	20/21	2	250.0	1.5	251.5	4.6	4.6	.	.	4.6	.	.	15.6
4	22/23	2	246.9	9.1	256.0	3.4	3.4	.	.	3.4	2.6	22.6	19.0
4	24/27	4	250.0	0	250.0	13.1	13.1	.	.	13.1	.	22.6	32.1
4	28/29	2	236.9	2.0	238.9	5.5	5.5	.	.	5.5	.	22.6	37.6
4/5	30(4)/ 2(5)	3	233.4	0.4	233.8	9.4	9.4	.	.	9.4	.	22.6	47.0
5	3/ 5	3	224.4	16.8	241.2	5.5	5.5	.	.	5.5	.	22.6	52.5
5	6/ 8	3	235.7	.	235.7	10.4	10.4	.	.	10.4	.	22.6	62.9
5	9/12	4	225.3	.	225.3	18.5	18.5	.	.	18.5	.	22.6	81.4
5	13/14	2	206.8	0.1	206.9	5.0	5.0	.	.	5.0	.	22.6	86.4
5	15/17	3	201.9	.	201.9	15.3	15.3	.	.	15.3	.	22.6	101.7
5	18/22	5	186.6	.	186.6	19.3	19.3	.	.	19.3	.	22.6	121.0
5	23/27	5	167.3	57.1	225.0	11.9	11.9	.	.	11.9	.	22.6	132.9
5	28/31	4	213.1	.	213.1	17.9	17.9	.	.	17.9	.	22.6	150.8
6	1/ 7	7	195.2	18.0	213.2	27.2	27.2	.	.	27.2	.	22.6	178.0
6	8/11	4	186.0	.	186.0	19.3	19.3	.	.	19.3	.	22.6	197.3
6	12/14	3	166.7	28.1	194.8	13.5	13.5	.	.	13.5	.	22.6	210.8
6	15/17	3	181.3	.	181.3	12.8	12.8	.	.	12.8	.	22.6	223.6
6	18/20	3	168.5	.	168.5	11.1	11.1	.	.	11.1	.	22.6	234.7
6	21/25	5	157.4	.	157.4	19.1	19.1	.	.	19.1	.	22.6	253.8
6	26/27	2	138.3	2.2	140.5	8.2	8.2	.	.	8.2	.	22.6	262.0
6	28/30	3	132.3	.	132.3	13.2	13.2	.	.	13.2	.	22.6	275.2

Mois	Période	NJ	RU	P	T	ETP	f (RFU)	K	f (Rs)	ETt	DEFICIT partiel cumulé	DRAINAGE partiel cumulé	CUMUL Ett
7	1/ 8	8	119.1	.	119.1	41.4	9.1	0.740	28.6	37.7	3.7	3.7	312.9
7	9/12	4	81.4	4.8	86.2	11.1	.	0.903	8.4	8.4	2.7	6.5	321.2
7	13/17	5	77.8	.	77.8	30.8	.	0.750	19.5	19.5	11.3	17.8	340.7
7	18/21	4	58.4	9.5	67.9	19.4	.	0.835	11.2	11.2	8.2	26.0	351.9
7	22/26	5	56.7	.	56.7	30.9	.	0.749	14.2	14.2	16.7	42.6	366.2
7	27/31	5	42.4	.	42.4	26.0	.	0.785	9.1	9.1	16.9	59.5	375.3
8	1/ 3	3	33.3	.	33.3	9.9	.	0.913	2.9	2.9	7.0	66.5	378.2
8	4/ 6	3	30.4	.	30.4	15.4	.	0.866	4.1	4.1	11.3	77.8	382.3
8	7/ 8	2	26.3	8.5	34.8	5.4	.	0.952	1.7	1.7	3.7	81.6	383.9
8	9/10	2	33.2	18.0	51.2	4.4	.	0.960	2.0	2.0	2.4	83.9	386.0
8	11/15	5	49.1	8.8	57.9	13.2	.	0.886	6.6	6.6	6.6	90.5	392.6
8	16/19	4	51.3	18.9	70.2	15.1	.	0.870	9.2	9.2	5.9	96.4	401.7
8	20/22	3	61.0	3.5	64.5	8.0	.	0.929	4.6	4.6	3.4	99.9	406.3
8	23/27	5	60.0	0	60.0	23.2	.	0.806	11.6	11.6	11.6	111.4	418.0
8	28/29	2	48.3	4.5	52.8	6.4	.	0.943	3.0	3.0	3.4	114.8	421.0
8	30/31	2	49.8	.	49.8	7.8	.	0.930	3.5	3.5	4.3	119.1	424.5
9	1/ 2	2	46.3	.	46.3	7.3	.	0.935	3.0	3.0	4.3	123.4	427.5
9	3/ 6	4	43.3	11.7	55.0	9.7	.	0.915	4.7	4.7	5.0	128.4	432.2
9	7/10	4	50.3	.	50.3	9.0	.	0.921	4.0	4.0	5.0	133.4	436.2
9	11/14	4	46.3	2.1	48.4	14.8	.	0.872	6.2	6.2	8.6	142.0	442.4
9	15/20	6	42.2	56.9	99.1	11.9	.	0.897	10.3	10.3	1.6	143.7	452.6
9	21/25	5	88.9	9	88.9	12.5	.	0.891	9.7	9.7	2.8	146.5	462.3
9	26/27	2	79.2	16.5	95.7	2.3	.	0.979	2.0	2.0	0.3	146.8	464.3
9	28/29	2	93.7	7	93.7	3.9	.	0.965	3.3	3.3	0.6	147.4	467.5
9/10	30(9)/ 6(10)	7	90.4	5.3	95.7	10.7	.	0.907	8.9	8.9	1.8	149.2	476.5
10	7/11	5	86.8	31.6	118.4	5.2	5.2	.	.	5.2	.	149.2	481.7
10	12/14	3	113.2	9.5	122.7	2.3	2.3	.	.	2.3	.	149.2	484.0
10	15/16	2	120.4	13.5	133.9	1.5	1.5	.	.	1.5	.	149.2	485.5
10	17/18	2	132.4	1.8	134.2	1.2	1.2	.	.	1.2	.	149.2	486.7
10	19/22	4	133.0	.	133.0	2.0	2.0	.	.	2.0	.	149.2	488.7
10	23/25	3	131.0	5.7	136.7	1.3	1.3	.	.	1.3	.	149.2	490.0
10/11	26(10)/ 2(11)	8	135.4	.	135.4	3.9	3.9	.	.	3.9	.	149.2	493.9
11	3/ 5	3	131.5	0.8	132.3	1.3	1.3	.	.	1.3	.	149.2	495.2




Fig. 120




Fig. 121

Fig. 120 et 121 - L'évapotranspiration potentielle comparée à Nevers, Prémery (le Chasnay) et Raveau (l'Usage défendu). - Courbes de cumulation pour albedo = 15 %.




Fig. 122




Fig. 123

Fig. 122 et 123 - L'évapotranspiration potentielle comparée à Nevers, Premery (le Chasnay) et Raveau (l'Usage défendu). - Valeurs moyennes par séquences de temps.





Fig. 124 à 131 - Bilan de l'eau des forêts en Berry et en Nivernais.- Analyse par séquences de temps en 1963, pour:
 albedo = 15%;
 réserve utile du sol = 250mm;
 réserve facilement utilisable = 140 ou 110mm.
 cf. note, p. 141.




Fig. 126




Fig. 127




Fig. 128






Fig. 129



Les figures 130 et 131 répondent également au modèle de sol:
 réserve utile = 250mm
 réserve facilement utilisable = 140mm.

NEVERS 1964




Fig. 132

NEVERS 1964




Fig. 133

Fig. 132 à 141 - Bilan de l'eau des forêts en Berry et en Nivernais.- Analyse par séquences de temps en 1964 pour:

- albedo = 15%;
- réserve utile du sol = 250mm;
- réserve facilement utilisable = 140 ou 110mm.

Lorsque, après épuisement de la réserve facilement utilisable, l'évapotranspiration réelle cesse d'être égale à l'évapotranspiration potentielle, l'espace intercalaire entre les deux courbes représentatives (en noir) indique la durée et l'intensité de la sécheresse.




Fig. 135




Fig. 134

BOURGES 1964

$\alpha = 15$ RU = 250 PFU = 140




Fig. 136

BOURGES 1964

$\alpha = 15$ RU = 250 PFU = 110




Fig. 137

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) 1964




Fig. 139

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) 1964




Fig. 138

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) 1964




Fig. 140

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) 1964




Fig. 141




Fig. 142




Fig. 143

Fig. 142 à 151 - Bilan de l'eau des forêts xérophiles en Berry et en Nivernais.- Analyse par séquences de temps en 1963 et 1964, pour:

albedo = 15%;

réserve utile du sol = 100mm;

réserve facilement utilisable = 50mm.

Lorsque, après épuisement de la réserve facilement utilisable, l'évapotranspiration réelle cesse d'être égale à l'évapotranspiration potentielle, l'espace intercalaire entre les deux courbes (en noir) indique la durée et l'intensité de la sécheresse.

NEVERS 1963




Fig. 144

MAISON FORESTIERE DU CHASNAY (PREMERY) 1963




Fig. 145

MAISON FORESTIERE DE L'USAGE DEFENDU (RAVEAU) 1963




Fig. 146




Fig. 147




Fig. 148




Fig. 149




Fig. 150




Fig. 151




Fig. 152




Fig. 153




Fig. 154





Fig. 152 à 156 - Bilan de l'eau des forêts xérophiles en Berry et en Nivernais. - Analyse par séquences de temps en 1963 et 1964, pour:

albedo modulé selon le stade phénologique
et les conditions météorologiques;
réserve utile du sol = 100mm;
réserve facilement utilisable = 50mm.

Lorsque, après épuisement de la réserve facilement utilisable, l'évapotranspiration réelle cesse d'être égale à l'évapotranspiration potentielle, l'espace intercalaire entre les deux courbes (en noir) indique la durée et l'intensité de la sécheresse.




Fig. 157




Fig. 158

Fig. 157 à 166 - Bilan de l'eau des forêts en Berry et en Ni-
vernais.- Analyse par séquences de temps en 1963 et 1964, pour:
albedo modulé selon le stade phénologique et les condi-
tions météorologiques;
réserve utile du sol = 250mm;
réserve facilement utilisable = 140 et 110mm.




Fig. 159




Fig. 160




Fig. 161




Fig. 162

BOURGES 1964




Fig. 164

BOURGES 1964




Fig. 163

1964

NEVERS




Fig. 165

NEVERS




Fig. 166




Fig. 167

Fig. 168

Fig. 167-168-169 - Bilan de l'eau des forêts.- Exemple, pour Châteauroux en 1963, tenant compte:
 1° de la modulation de l'albedo en fonction du stade phénologique et des conditions météorologiques;
 2° de la fraction du rayonnement transmis au sol en dehors de la période de pleine feuillaison.

Analyse par séquences de temps, pour 3 modèles de sol:
 réserve utile = 250mm, -réserve facilement utilisable = 140mm,
 réserve utile = 250mm, -réserve facilement utilisable = 110mm,
 réserve utile = 100mm, -réserve facilement utilisable = 50mm.





Fig. 169

Fig. 170 - Pluviométrie des années 1963 à 1967 à Nevers, Prémery (le Chasnay) et Raveau (l'Usage défendu):

- A - année entière,
 B - saison de végétation,
 C - mai à septembre inclus.
- 1 - moyenne de Nevers (1952-1973),
 2 - intervalle à Nevers entre moyenne + écart-type, et moyenne - écart-type,
 3 à 5 - fluctuations de la pluviométrie:
- 3 - Nevers,
 - 4 - Raveau
 - 5 - Prémery
- a - année et mai à septembre,
 b - saison de végétation,
 a - année et mai à septembre,
 b - saison de végétation.



1965




Fig. 172

Fig. 171 à 175 - Insolation et rayonnement global dans le Sud du Bassin Parisien (Bourges et Nevers):

- a - insolation;
b - rayonnement global incident.
- 1 - moyenne de Bourges (1952-1973);
 - 2 - moyenne de Nevers (1952-1973);
 - 3-4 - intervalle moyenne + écart-type, moyenne - écart-type;
 - 3 - Bourges;
 - 4 - Nevers;
 - 5 - valeurs de 1^{re} année à Bourges;
 - 6 - valeurs de 1^{re} année à Nevers.

1962




Fig. 171

1968




Fig. 175

1967




Fig. 174

1966




Fig. 173




Fig. 177 - Exemple d'analyse décadaire du bilan de l'eau des forêts, pour Châteauroux en 1963, pour: albedo = 15%; réserve utile du sol = 250mm, réserve facilement utilisable = 110mm.

(cf. la Fig. 127, p. 227, réalisée à la même échelle)











Fig. 176 - Classement des années de la période 1962 - 1968, en fonction des précipitations et du rayonnement global de la période de végétation.

Fig. 178

Valeurs décadaires de l'ETP à BOURGES

- 1 d'après la formule de —
PENMAN (albedo = 25)
- 2 d'après la formule
aménagée



TABEAU 87

EVAPOTRANSPIRATION POTENTIELLE ET EVAPOTRANSPIRATION REELLE
POUR DIVERS MODELES DE VEGETATION ET DE SOL
Analyse décadaire - Années 1962 à 1968 - Tableau récapitulatif

		CHATEAUX	BOURGES		NEVERS	PREMY	RAVEAU
			formule de Penman	formule aménagée			
		ETR %	ETR %	ETR %	ETR %	ETR %	ETR %
1962	ETP pour a = 25	638	667	697	581		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm	340	321	325	358		
	RFU = 50 mm	344	324	329	362		
	RFU = 60 mm	348	328	332	366		
	ETP pour a = 15	733	760	790	673		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm	363	343	347	382		
	RU = 250 mm RFU = 110 mm	482	467	472	494		
	RU = 250 mm RFU = 140 mm	492	476	480	507		
	ETP pour a = 25	554	540	563	492		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm	491	425	427	480		
1963	RFU = 50 mm	498	432	433	483		
	RFU = 60 mm	505	438	439	486		
	ETP pour a = 15	634	621	644	573		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm	516	440	440	535		
	RU = 250 mm, RFU = 110 mm	592	531	534	573		
	RU = 250 mm, RFU = 140 mm	613	550	552	573		
	ETP pour a = 25	655	681	702	582		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm	320	344	340	405		
	RFU = 50 mm	326	348	344	410		
	RFU = 60 mm	333	353	348	423		
1964	ETP pour a = 15	750	773	793	673		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm	334	366	361	435		
	RU = 250 mm, RFU = 110 mm	444	462	460	517		
	RU = 250 mm, RFU = 140 mm	455	479	476	543		
	ETP pour a = 25	655	681	702	582		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm	320	344	340	405		
	RFU = 50 mm	326	348	344	410		
	RFU = 60 mm	333	353	348	423		
	ETP pour a = 15	750	773	793	673		
	ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm	334	366	361	435		

1965	ETP pour a = 25 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm RFU = 50 mm RFU = 60 mm ETP pour a = 15 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm RU = 250 mm, RFU = 110 mm RU = 250 mm, RFU = 140 mm	509 430 437 444 583 461 542 561	84 86 87 79 93 96	534 497 504 513 609 537 602 609	93 94 96 88 99 100	515 479 486 494 590 520 583 590	93 94 96 88 99 100	481 440 447 454 556 489 551 556	91 93 94 88 99 100	451 380 386 392 527 426 504 517	84 86 87 81 96 98	449 370 375 381 525 415 497 510	82 84 85 78 95 97
1966	ETP pour a = 25 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm RFU = 50 mm RFU = 60 mm ETP pour a = 15 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm RU = 250 mm, RFU = 110 mm RU = 250 mm, RFU = 140 mm	596 410 413 415 676 423 526 542	69 69 70 63 78 80	608 480 486 493 693 495 590 608	79 80 81 71 85 88	595 478 484 491 679 491 586 604	80 81 83 72 86 89	546 466 467 475 625 485 566 588	85 86 87 77 91 94	503 483 489 495 589 541 588 589	96 97 98 92 100 100	497 462 469 476 584 516 578 584	93 94 96 88 99 100
1967	ETP pour a = 25 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm RFU = 50 mm RFU = 60 mm ETP pour a = 15 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm RU = 250 mm, RFU = 110 mm RU = 250 mm, RFU = 140 mm			641 386 390 395 730 405 507 526	60 61 62 55 69 72	648 384 389 393 736 403 506 524	59 60 61 55 69 71	569 346 350 355 660 365 474 491	61 62 62 55 72 74	553 364 370 376 644 387 489 505	66 67 68 60 76 78		
1968	ETP pour a = 25 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 40 mm RFU = 50 mm RFU = 60 mm ETP pour a = 15 ETR pour RU = 100 mm, RFU = 50 mm RU = 250 mm, RFU = 110 mm RU = 250 mm, RFU = 140 mm			580 525 532 538 662 559 636 651	91 92 93 84 96 98	575 518 524 530 657 551 630 645	90 91 92 84 96 98	508 454 460 466 583 500 568 580	89 91 92 86 97 99				




Fig. 179 à 184 - Bilan de l'eau des formations herbacées.- Comparaison des résultats obtenus en effectuant les calculs par séquences de temps et par décades, pour albedo = 25%, -réserve utile du sol = 100mm, -réserve facilement utilisable = 40mm.

- courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle et de l'évapotranspiration réelle:
- 1 - analyse par séquences de temps,
- 2 - analyse par séquences de temps,
- 3 - analyse par séquences de temps,
- 4 - analyse par séquences de temps,






Fig. 179 à 184 - Bilan de l'eau des formations herbacées.- Comparaison des résultats obtenus en effectuant les calculs par séquences de temps et par décades, pour albedo = 25%, -réserve utile du sol = 100mm, -réserve facilement utilisable = 40mm.

- courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle et de l'évapotranspiration réelle:
- 1 - analyse par séquences de temps,
- 2 - analyse par séquences de temps,
- 3 - analyse par séquences de temps,
- 4 - analyse par séquences de temps,






Fig. 184



Fig. 183




Fig. 185




Fig. 186

Fig. 185 à 190 - Bilan de l'eau des forêts.- Comparaison des résultats obtenus en effectuant les calculs par séquences de temps et par décades, pour:

albedo = 15%,
réserve utile du sol = 250mm,
réserve facilement utilisable = 110mm;

-courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle et de l'évapotranspiration réelle:

1- analyse par séquences de temps;
2- analyse décadaire;

-évolution de la réserve du sol

3- analyse par séquences de temps;
4- analyse décadaire.




Fig. 187



Fig. 188





Fig. 189







Fig. 191

Fig. 191 à 196 - Bilans hydriques décadaires de trois années sèches (1962-1964-1967),

pour les formations herbacées: albedo = 25%,
réserve utile du sol = 100mm,
réserve facilement utilisable = 40mm;

et pour les forêts:
albedo = 15%,
réserve utile du sol = 250mm,
réserve facilement utilisable = 110mm.






Fig. 193




Fig. 194





Fig. 195






Fig. 197 à 204 - Bilans hydriques décadaires de quatre années humides (1963-1965-1966-1968)




Fig. 198




Fig. 199




Fig. 200




Fig. 201




Fig. 202

ETP & ETR




Fig. 203




Fig. 204




Fig. 205 - L'ouragan du 21 juin 1965 en Forêt de Vincence (Nièvre)

- 1 - espaces agricoles,
- 2 - parties de la forêt dévastées dans la proportion de 80 à 100%,
- 3 - parties dévastées dans la proportion de 70 à 80%,
- 4 - parties dévastées dans la proportion de 30 à 40%;
- 5 - chablis épars,
- 6 - forêt.

LIVRE DEUXIEME

PAYSAGES FORESTIERS

DU BASSIN PARISIEN MERIDIONAL




Fig. 206 - Localisation des forêts qui font l'objet d'une monographie:

1 à 10 - les pays du Bassin Parisien méridional:

- 1 - massifs anciens;
- 2 - plateaux gréseux;
- 3 - dépressions liasiques;
- 4 - plateaux à couverture d'argile à chailles;
- 5 - plateaux calcaires (rendzines et sols bruns calcimorphes);
- 6 - plateaux à couverture d'argile à silex;
- 7 - sols hydromorphes de la formation de Brenne;
- 8 - petits causses berrichons;
- 9 - sols hydromorphes des sables d'épandage;
- 10 - Val de Loire.

- A - Mont-Martin;
- B - plateau d'Arbourse;
- C - colline de Limon;
- D - massif forestier de la Bertrange;
- E - forêt de Prémery;
- F - massif forestier de Choeurs-Bommiers-Chatin;
- G - friches de la Chapelle-Saint-Ursin-Morthomiers, bois de la Corne, bois du Palais, bois de Castelnau.




Fig. 207 - Codification des éléments phytogéographiques:

- 1 - espèces subcosmopolites;
- 2 - espèces holarctiques;
- 3 - espèces eurasiatiques;
- 4 - espèces localisées dans l'espace Europe-Asie occidentale-Afrique du Nord;
- 5 - espèces localisées en Europe.

Dans le cadre des espaces 4 et 5, la répartition est éventuellement précisée:

- 4₁ et 5₁ - espèces localisées principalement dans l'Ouest;
- 4₂ et 5₂ - espèces localisées principalement dans l'Ouest et le Sud;
- 4₃ et 5₃ - espèces localisées principalement dans le Sud;
- 4₄ et 5₄ - espèces localisées principalement dans le Sud et l'Est;
- 4₅ et 5₅ - espèces localisées principalement dans l'Est;
- 5₆ - espèces localisées principalement dans le Nord.

Nombre
de
valeurs
cumulées




Fig. 208 - Amplitude ionique de *Asarum europæum* L.

1 - valeurs optimales de pH.

Nombre
de
valeurs
cumulées




Fig. 209 - Amplitude ionique de *Peucedanum gallicum* Latourrette

1 - valeurs optimales de pH.

Nombre
de
valeurs
cumulées




Fig. 210 - Amplitude ionique de *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaud.


1 - zone de grande fréquence 2 - valeurs optimales de pH.

ANALYSE CHOROLOGIQUE DU MONT - MARTIN

GROUPES PHYTOGEOGRAPHIQUES	1			2			3			4					5					TOTAL
	1	2	3	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		

La codification des groupes phytogéographiques est donnée par la Fig. 207, p. 278.- m = montagnardes.

Fig. 211 - Spectre phytogéographique brut du Mont-Martin



1° espèces de large répartition:

1 - espèces subcosmopolites;

2 - espèces holarctiques;

3 - espèces eurasiatiques;

4 - espèces de répartition européenne, ouest-asiatique, nord-africaine;

5 - espèces de répartition européenne.

2° espèces localisées dans une partie des périmètres 4 (Europe, Asie occidentale, Afrique du Nord) ou 5 (Europe), et dessinant les affinités chorologiques du Mont-Martin:

41 et 51 - espèces localisées dans l'Ouest;

42 et 52 - espèces localisées dans l'Ouest et le Sud;

53 - espèces localisées dans le Sud;

44 et 54 - espèces localisées dans le Sud et l'Est;

45 et 55 - espèces localisées dans l'Est.

La part des montagnardes n'est pas indiquée.




Fig. 212



Fig. 213

Fig. 212 et 213 - Transects du Mont-Martin (Dornecy).

- 1 - chêne rouvre (*Quercus petraea* (Mattuschka) Lieblein)
- 2 - chêne blanc (*Quercus pubescens* Willd.)
- 3 - hêtre (*Fagus sylvatica* L.)
- 4 - charme (*Carpinus betulus* L.)
- 5 - orme champêtre (*Ulmus minor* Mill.)
- 6 - alisier blanc (*Sorbus aria* (L.) Crantz)
- 7 - alisier terminal (*Sorbus torminalis* (L.) Crantz)
- 8 - alisier de Fontainebleau (*Sorbus latifolia* (Lamb.) Pers.)
- 9 - érable champêtre (*Acer campestre* L.)
- 10 - tilleul à grandes feuilles (*Tilia platyphyllos* Scop.)
- 11 - cornouiller mâle (*Cornus mas* L.)
- 12 - nerprun purgatif (*Rhamnus catharticus* L.)
- 13 - cerisier de Sainte-Lucie (*Prunus mahaleb* L.)
- 14 - carex des bois (*Carex sylvatica* Huds.)
- 15 - luzule des bois (*Luzula sylvatica* (Huds.) Gaud.)
- 16 - canche flexueuse (*Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.)
- 17 - fétuque hétérophylle (*Festuca heterophylla* Imk.)
- 18 - pâturin des Sudètes (*Poa chaixii* Vill.)
- 19 - millet étalé (*Milium effusum* L.)
- 20 - brachypode penné (*Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv.)
- 21 - brome dressé (*Bromus erectus* Huds.)
- 22 - mélitte à feuilles de mélisse (*Melittis melissophyllum* L.)
- 23 - garance voyageuse (*Rubia peregrina* L.)
- 24 - aspérule odorante (*Asperula odorata* L.)
- 25 - mercuriale vivace (*Mercurialis perennis* L.)
- 26 - lierre (*Hedera helix* L.)
- 27 - hellébore fétide (*Helleborus foetidus* L.)
- 28 - limodore (*Limodorum abortivum* (L.) Swartz)
- 29 - céphalanthère (*Cephalanthera* sp.)
- 30 - muguet (*Convallaria majalis* L.)
- 31 - sceau de Salomon (*Polygonatum odoratum* (Mill.) Druce)
- 32 - ornithogale des Pyrénées (*Ornithogalum pyrenaicum* L.)
- 33 - gouet tacheté (*Arium maculatum* L.)
- 34 - asaret (*Asarum europaeum* L.)
- 35 - mull calcique
- 36 - mull
- 37 - moder






Fig. 214 - Esquisse de la flore et de la végétation du Mont-Martin.

- 1 - accrue récente discernable.
- 2 - forêt.
- 3 - mosaïque pelouses-fruticées.
- 4 - chêne pubescent, cornouiller mâle, herbacées baso-thermophiles.
- 5 - asaret.
- 6 - millet étalé.
- 7 - luzule des bois.
- 8 - pâturin des Sudètes.
- 9 - baguenaudier.
- 10 - aspérule odorante.




Fig. 215 - Transects de Limon.

- 1 - charme
- 2 - hêtre
- 3 - mosaïque fruticée d'arbustes neutrophiles - pelouse
- 4 - houx
- 5 à 8 - strates forestières herbacée et muscinale:
 - 5 - hygrophiles
 - 6 - neutrophiles
 - 7 - espèces à large amplitude écologique
 - 8 - acidophiles
- 9 - sols sur argiles à chailles
- 10 - argiles à chailles sur calcaire
- 11 - sols calcimorphes.





Fig. 216 - Le plateau d'Arboise:répartition des bois et des friches,propriété,localisation des transects.

1 - forêts
2 - friches


3 - plantation de résineux
4 - transects (cf. Fig. 217)

Fig. 217 - Transects à travers le plateau d'Arbourse:


- 1 - chêne rouvre, hêtre, châtaignier
- 2 - charme
- 3 - chêne blanc
- 4 - flore herbacée acídophile
- 5 - flore herbacée neutrophile
- 6 - mosaïque fruticées - pelouses
- 7 - *Luzula sylvatica*
- 8 - *Poa chaixii*
- 9 - *Rubia peregrina*















Fig. 220 - Formation historique de la Forêt domaniale de la Bertrange.
1 - Forêt domaniale de la Bertrange dans ses limites de 1957.

- 2 à 6 - anciennes propriétés ecclésiastiques:
- 2 - Prieuré de la Charité;
- 3 - Abbaye Notre-Dame de Nevers;
- 4 - Carmes déchaussés;
- 5 - Evêque de Nevers (châtellenie d'Ury);
- 6 - Chapitre de Nevers.
- 7 et 8 - anciens bois usagers:
- 7 - rentrés dans les biens d'Eglise avant la Révolution;
- 8 - réunis au domaine de l'Etat au XIXème siècle.
- 9 à 14 - anciennes propriétés particulières:
- 9 - biens de Babaud de la Chaussade, acquis par Louis XVI en 1781, remis par la Marine à l'administration forestière en 1844;
- 10 - acquisitions de la deuxième moitié du XIXème siècle:
- 11 à 13 - acquisitions de l' "entre deux guerres":
- 11 - Montifauts;
- 12 - Bois de Bizy;
- 13 - Forêt de Poiseux.
- 14 - retouches résultant d'acquisitions postérieures à l'aménagement de 1957.
- 15 - accrues identifiées.
- 16 à 18 - domaines importants achetés au cours des dernières années et constituant provisoirement la "Forêt des Grands Bois - Sauvage".
- 16 - ancienne propriété industrielle;
- 17 et 18 - anciennes propriétés nobiliaires.
- 19 - forêts communales ou sectionales.
- 20 - forêts privées.

ABREVIATIONS: - A - bois de l'Alouette; - B - taillis Baillet; - Ba - bois Barillot; - BM - bois aux Moines; - Br - les Brûlis; - C - les Côtes; - CC - Champs de la Creusotterie; - Ch - bois de Chaume; - Cl - le Cluseau; - Cm - Chamerolles; - CN - Champs de Nevers; - Co - bois de Contre; - Cy - bois de Chambray; - D - bois aux Dames; - F - bois de Faye; - G - bois Garilland; - GQ - Grand Quartier; - M - la Manche; - N - Nifond; - P - les Pâturaux; - Pj - bois Pajot; - Pr - les Prunellières; - R - les Renardières; - S - taillis Sarrahan; - Sabord Sabord; - Si - les Sionnes; - T - bois de Thurigny; - TC - Tête de Chat; - TS - taillis Serviat; - V - Vallées; - V - vallée Verrier.








Fig. 221 - Traitements appliqués dans les différentes parties de la Bertrange depuis le XVIIIème siècle.

- 1 - bois dépendant du Prieuré de la Charité en 1688.
- 2 - premier quart en réserve (1688).
- 3 - parties de la forêt rentrées dans le domaine du Prieuré avant 1739 (anciens bois usagers).
- 4 - accroissement de la réserve en 1738-39.
- 5 - réserve des anciens "Usages de Nancy".
- 6 - cantons ajoutés aux anciennes réserves en 1845 pour constituer une section de futaie.
- 7 - cantons ajoutés à cette superficie pour constituer les 4 séries de futaie de 1886.
- 8 - cantons maintenus en taillis - sous - futaie par le décret de 1888, et constituant la section de conversion de 1926.
- 9 - deuxième série de la "Forêt de Guérigny", incorporée à la Bertrange en 1955.
- 10 - anciens bois particuliers traités en taillis-sous-futaie jusqu'à la deuxième guerre mondiale.
- 11 à 14 - séries de l'aménagement de 1957:
 - 11 - 1ère série,
 - 12 - 2ème série,
 - 13 - 3ème série,
 - 14 - 4ème série.
- 15 - anciennes accrues identifiées.
- 16 - partie de la réserve du Prieuré recépée en 1764, à la suite de l'incendie de 1763.
- 17 - surfaces parcourues par l'incendie de 1929.
- 18 - marais, taillis - sous - futaie, acquis postérieurement à l'aménagement de 1957.

1957

1888

1845



ANCIENNE RESERVE du PRIEURÉ

première réserve

extension

1739

partie incendiée en 1763



A

B



NW

MONTIFAUTS

Rond
de la Bertherie

Rond
Lucien Turc



Rond
de la Réserve

Rond St-

le Rio

le Ginardeau

Maupeyronde



d'aménagement en futaie

1888

1927

1927




Fig. 222 - Premier transect à travers la Forêt de la Bertrange (A-C):

- b - groupements végétaux: 1 - aulnaie;- 2 - charmaie;- 3 - hêtraie;- 4 - hêtraie pauvre; - 5 - chênaie à *Leucobryum glaucum*.
- c - aspects physionomiques (traitement, essences dominantes): 6 - futaie;- 7 - taillis-sous-futaie;- 8 - semis, fourré; - 9 à 11 - strate arborescente supérieure: 9 - rouvre;- 10 - pédonculé;- 11 - hêtre; - 12 à 15 - strate arborescente inférieure:- 12 - charme;- 13 - hêtre;- 14 - rouvre;- 15 - pédonculé.
- d - histoire et propriété: 16 - anciens biens du Prieuré de la Charité;- 17 - anciens biens de Babaud de la Chaussade;- 18 - acquisitions du XIX^{ème} siècle; 19 - acquisitions du XX^{ème} siècle (les Montifauts);- 20 - accrues identifiées; 21 - forêts privées.

Date de la décision d'aménagement en futaie

1927



USAGES

de Soury de Raveau de Chaulgnes

"Usages"
St-Aubin






Fig. 223 - Deuxième transect à travers la forêt de la Bertrange (D-E):

b - groupements végétaux:

- 1 - charmaie
- 2 - hêtraie
- 3 - hêtraie pauvre
- 4 - chênaie à *Leucobryum glaucum*
- 5 - chênaie à bourdaine et peucedan

c - aspects physiognomiques (traitement, essences dominantes):

- 6 - futaie sur souches
- 7 - taillis-sous-futaie
- 8 à 10 - strate arborescente supérieure:
- 8 - chêne rouvre
- 9 - chêne pédonculé
- 10 - hêtre
- 11 à 14 - strate arborescente inférieure:
- 11 - charme
- 12 - hêtre
- 13 - chêne rouvre
- 14 - chêne pédonculé

d - histoire et propriété:

- 15 - anciens biens de Babaud de la Chaussée
- 16 - acquisitions du XIX^{ème} siècle
- 17 - forêts communales ou sectionales
- 18 - anciens bois usagers
- 19 - forêts privées.

TABLEAU 89

ESPECES		RELEVÉS																				écologie									
		439	807	2017	1949	2007	1766	435	436	1859	1036	434	1860	1944	1961	1850	1862	1955	1957	1956	1308	1953	175	340	124	164	1307	2003	413	343	2004
		+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+	+
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1																			

TABLEAU 89

E S P E C E S		R E L E V E S																				é c o l o g i e													
		439	807	2017	1949	2007	1766	435	436	1839	1036	1003	434	1860	1944	1961	1850	1862	1955	1957	1956	1308	1953	175	340	124	164	1307	2003	413	343	2004			
3586	<i>Galium mollugo</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
437	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2213	<i>Malus sylvestris</i> Miller	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B817	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (L.) Fl.	.	2	1	1	.	1	.	.	2	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
344	<i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
105	<i>Pinus sylvestris</i> L. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	2	2	2	2	3	2	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
438	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	1	1	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	2	2	2	2	3	2	3	1	2	1	3	1	1	1	1	1	4	1	3	1	3	
1223	<i>Euphorbia dulcis</i> L. ssp. <i>dulcis</i>	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2095	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
920	<i>Tamus communis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4020	<i>Cirsium tuberosum</i> (L.) All.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2114	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
552	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
B856	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> Wstf.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
314	<i>Poa pratensis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3564	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2230	<i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2554	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2738	<i>Euonymus europaeus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2154	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2663	<i>Geranium sanguineum</i> L.	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2092	<i>Spiraea hypericifolia</i> L. ssp. <i>obovata</i> Dost.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
670	<i>Arum maculatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2891	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2754	<i>Cornus sanguinea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3621	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3569	<i>Rubia peregrina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2133	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1987	<i>Hypericum montanum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3618	<i>Viburnum lantana</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
		.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.</						

TABLEAU 89

ESPECES	RELEVÉS																				écologie										
	439	807	2017	1949	2007	1766	435	1859	1036	1003	434	1860	1944	1961	1850	1862	1955	1957	1956	1308	1953	175	340	124	164	1307	2003	413	343	2004	
3552 <i>Vincetoxycum hirundinaria</i> Medic.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2729 <i>Rosa</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
828 <i>Acer campestre</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
91 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1648 <i>Juniperus communis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1228 <i>Berberis vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
935 <i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1945 <i>Epipactis helleborine</i> (L.) CRANTZ	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3083 <i>Viola hirta</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3904 <i>Buglossoides purpureocerulea</i> (L.) I.M. Johnst.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
509 <i>Tanacetum corymbosum</i> Schultz-Bip.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2284 <i>Carex montana</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2812 <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2959 <i>Bupleurum falcatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2750 <i>Primula veris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
847 <i>Rhamnus catharticus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
386 <i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3250 <i>Bromus erectus</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
267 <i>Melampyrum cristatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
513 <i>Avena pratensis</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4072 <i>Carex tomentosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2251 <i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) D.C.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
374p <i>Genista tinctoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2849 <i>Festuca hervieri</i> (St-Y.) Patzke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
741 <i>Seseli montanum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3730p <i>Anthericum ramosum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
4121 <i>Phyteuma tenerum</i> R. Schulz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3469 <i>Scorzonera hispanica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1909b <i>Origanum vulgare</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
288 <i>Helianthemum nummularium</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3364 <i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.				




Fig. 224 - Analyse de Czekanowski sur un échantillon de 31 relevés dans lesquels figure la sarrette des teinturiers (*Serratula tinctoria* L.)

- 1 - coefficient de Jaccard supérieur à 50%
- 2 - coefficient de Jaccard supérieur à 40%
- 3 - coefficient de Jaccard supérieur à 30%
- 4 - coefficient de Jaccard supérieur à 20%
- 5 - coefficient de Jaccard supérieur à 10%
- 6 - coefficient égal ou inférieur à 10%.

TABLEAU 90

STRUCTURE ECOLOGIQUE

DU CORTEGE FLORISTIQUE DE LA SERRATULE

SPECTRE PONDERE (%)

CLASSEMENT DES ESPECES	GROUPEMENTS VEGETAUX			
	A	B	C	D
HELIOPHILES	59	65	54	74
THERMOPHILES	2	22	36	58
BESOINS EN EAU				
<i>hygrophiles</i>	2	0,5	1	1
<i>xérophiles</i>		9	20	31
<i>régime hydrique alternant</i>	40	36	42	25
TYPE D' HUMUS				
<i>mor</i>	6	6	1	
<i>mor - moder</i>	13	4	3	1
<i>moder</i>	24	2	3	6
<i>moder - mull</i>	18	33	29	13
<i>mull</i>	8	14	16	8
<i>mull - mull calcique</i>	1	12	21	19
<i>mull calcique</i>		10	19	45
<i>indifférentes</i>	0	19	8	8

TABEAU 91

LOCALISATION GEOGRAPHIQUE DES RELEVES
constituant l'échantillon étudié pour définir
l'écologie de la sarrette des teinturiers (*Serratula tinctoria* L.)

- 124 - Bué (Sud de Sancerre).
- 164 - Sud-est de Bourges (champ de tir).
- 175 - Sud-est de Bourges (bois de Soye).
- 340 - Ouest de Dun-sur-Auron (entre Contres et Barantheaume).
- 343 - Sud de Levet (bois de Bouard).
- 413 - Sud de Levet (bois de Bouard).
- 434 - Sud de Cosne-sur-Loire (les Petites Bruyères).
- 435 - Sud de Cosne-sur-Loire (Bohème).
- 436 - Sud de Cosne-sur-Loire (Bois-Rabot).
- 439 - Sud-est de Cosne-sur-Loire (St-Laurent).
- 807 - Sud-ouest de Saint-Amand-Montroind (forêt de Bornacq).
- 1003 - Est de Châteauroux (bois de Mâron).
- 1036 - Sud d'Issoudun (massif forestier de Bonmiers-Choëurs).
- 1307 - Sud-est de Châteauneuf-sur-Cher (Chavannes).
- 1308 - Sud-est de Châteauneuf-sur-Cher (Chavannes).
- 1766 - Sud-ouest de Saint-Amand-Montroind (forêt de Bornacq).
- 1850 - Sud d'Issoudun (massif forestier de Bonmiers-Choëurs).
- 1859 - Sud d'Issoudun (massif forestier de Bonmiers-Choëurs).
- 1860 - Sud d'Issoudun (massif forestier de Bonmiers-Choëurs).
- 1862 - Sud d'Issoudun (massif forestier de Bonmiers-Choëurs).
- 1944 - Saint-Florent-sur-Cher (bois du Palais).
- 1949 - Sud-ouest de Cosne-sur-Loire (Port-Aubry).
- 1953 - Villeneuve-sur-Cher (bois du Palais).
- 1955 - Villeneuve-sur-Cher (bois du Palais).
- 1956 - Villeneuve-sur-Cher (bois du Palais).
- 1957 - Villeneuve-sur-Cher (bois du Palais).
- 1961 - Villeneuve-sur-Cher (bois du Palais).
- 2003 - Nord-ouest de Meillant (bois de Fleuret).
- 2004 - Nord-ouest de Meillant (bois de Fleuret).
- 2007 - Sud d'Issoudun (massif forestier de Bonmiers-Choëurs).
- 2017 - Sud de Cosne-sur-Loire (Bois-Rabot).




Fig. 225 - approche écologique de la serratule.




Fig. 226 -approche écologique de la serratule




Fig. 227 - Répartition des espèces du cortège de la serratule par types d'humus: A, B, C, D sont les 4 ensembles distingués sur les figures 225 et 226.




Fig. 228 - Topographie, faciès végétaux et sols d'une partie de la forêt de Prémery: -1- chênaie à *Leucobryum*; -2- charmaies; -3- hêtraies sur sol lessivé; -4- chênaie-boulaie à bourdaine et molinie, et aulnaie à sphaignes sur sol gleyfié; -5- courbes de niveau (tracé approximatif); -6- limite de la forêt et périmètre Domaniale-Communale; -7- dolines; -8- mardelles; -9- entonnoirs; -10- avens en cloche.




Fig 229 a,b,c - 3 exemples de mardelles sur le plateau de Prémery:

- | | |
|---|--|
| 1 - eau | 8 - molinie (couverture lâche) |
| 2 - sphaignes noyées | 9 - fougère-aigle |
| 3 - sphaignes exondées | 10 - saules |
| 4 - polytric commun
(<i>Polytrichum commune</i> L.) | 11 - bouleau (<i>Betula pendula</i> Roth) |
| 5 - carex | 12 - chêne rouvre
(<i>Quercus petraea</i> Lieb.) |
| 6 - juncs | 13 - callune |
| 7 - molinie (couverture dense) | 14 - fossé de drainage |




Fig. 230 - Différents types de zonation autour des mardelles:

- 1 - mardelles conservant une nappe d'eau libre toute l'année.
- 2 - mardelles à inondation temporaire
- 3 - mardelles évoluées en tourbière bombée.
- 4 - cuvettes à fond simplement plus humide que la bordure.



- 1 *Dryopteris dilatata*
- 2 *Molinia*
- 3 *Sphagnum*
- 4 *Carex*
- 5 *Pteridium aquilinum*
- 6 *Frangula alnus*

Fig. 231 - Relations topographiques entre l'aulnaie et la chênaie-boulaie.





Fig. 232 - L'ensemble forestier au sud d'Issoudun:

- 1 à 5 - Forêt domaniale de Bommiers: -1- Vouillon;-2- Bois-Ramier;-3- le Chaloy;-4- le Coudray;-5- Bommiers.
- 6 à 8 - Forêt domaniale de Choeurs: -6- Choeurs;-7- Bois Gilbert;-8- Bois Sainte-Marie.
- 9 - bois particuliers
- 10 - bois communaux.
- a - bois de Meunet-Planche;-b- bois de Condé;-c- bois de Chatain.

Forêts

domaniales

Bommiers



Bois communaux

de Meunet-Planche
de Condé

Forêt

domaniale

- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8




Fig. 233 et 234 - Transects à travers le massif

- 1 - forêts domaniales
- 2 - bois communaux
- 3 - bois particuliers
- 4 - limon
- 5 - sables burdigaliens
- 6 - sidérolithique
- 7 - Oxfordien supérieur marneux
- 8 - Oxfordien supérieur calcaire




Fig. 233




Fig. 234

forestier de Bommiers-Choeurs-Chatain:

- 9 - charmaie à *Festuca heterophylla*
- 10 - charmaie à *Ornithogalum pyrenaicum*
- 11 - charmaie à *Endymion non-scriptus*
- 12-13 - chênaie pubescente
- 12 - bois
- 13 - prés-bois
- 14 - chênaie silicicole mésoxérophile
- 15 - chênaie à *Peucedanum gallicum*
- 16 - faciès thermophile de la chênaie à *Peucedanum gallicum*




Fig. 235 - Conversion en futaie de la Forêt de Choeurs:

- 1 - superficie en taillis-sous-futaie
- 2 - superficie dont la conversion en futaie est décidée
- 3 - superficie soumise à "régénération"
- 4 - superficie soumise à "amélioration".




Fig. 236 - Bois, fruticées et pelouses au Sud-Ouest de Bourges:

- | | |
|--|-------------------------|
| 1 - communaux de la Chapelle-Saint-Ursin | 5 - Petits Bois |
| 2 - Bois de la Corne | 6 - Bois de Castelnau |
| 3 - Bois du Montet | 7 - Bois de Font-Moreau |
| 4 - Bois du Palais | |




Fig. 237 - Relations de position entre les divers types de pelouses et groupements de rocher.




Fig. 238 - Transect à travers les pelouses de la Chapelle-Saint-Ursin, le Bois de la Corne, le Bois du Palais, le Bois de Castein.

- 1 - alluvions
- 2 - sables burdigaliens (ou non datés)
- 3 - calcaire lacustre ludien
- 4 - sidérolithique
- 5 - Séquanien
- 6 - Rauracien
- 7 - mosaïque pelouses-fruticées
- 8 - chênnaie pubescente: mosaïque bois - prés-bois - fruticées
- 9 - charmaie baso-thermophile
- 10 - charmaie acidocline
- 11 - charmaie pauvre en espèces
- 12 - chênnaie silicicole
- 13 - mosaïque chênnaie pubescente-chênnaie à peucedan
- 14 - chênnaie à peucedan de Paris.




Fig. 239 - Localisation des sites ayant donné lieu à analyse pollinique.

L'encadré correspond à la carte 206, p. 277; la distinction des pays constituant le Bassin Parisien méridional est plus sommaire que sur cette carte.

1 et 2 - sols hydromorphes:

1 - sur sables d'épandage,

2 - sur la formation de Brenne,

3 et 4 - plateaux calcaires à couverture:

3 - d'argile à silex,

4 - d'argiles à chailles,

5 - plateaux calcaires à sols de types rendzines ou sols bruns calcimorphes,


6 - dépressions liasiques,

7 - plateaux gréseux,

8 - massifs anciens.

TABLEAU 92

CHRONOLOGIE ADOPTÉE
POUR LE NEOWÜRM ET LE POSGLACIAIRE



(principalement d'après Munaut A.V., 1967 et Leroi-Gourhan A. et Renault-Miskowsky J., 1977).




Fig. 240 - Essai de synthèse de quelques données palynologiques régionales. ✓

C - évolution des quantités d'énergie disponibles pendant la saison de végétation,
 E - tendance générale de la couverture des besoins en eau de la végétation,
 AP - pollens d'arbres,
 T - total des pollens.




Fig. 241 - Esquisse de la répartition régionale de quelques espèces atlantiques s.l.:

1-massifs anciens. -2-plateaux gréseux. -3-dépressions liasiques. -4-plateaux à couverture d'argile à chailles. -5-plateaux calcaires (rendzines et sols bruns calcaires). -6-plateaux à couverture d'argile à silex. -7-sols hydromorphes de la formation de Brenne. -8-petits causses berrichons. -9-sols hydromorphes des sables d'épandage. -10-Val de Loire. -11-limite d'*Euphorbia hyberna* L. ssp. *hyberna*. -12-limite d'*Erica cinerea* L.:14-d'après les travaux botaniques du XIX^{ème} siècle; de *Peucedanum gallicum* Latourr. -14-15-limite d'*Ulex minor* Roth:16-d'après les travaux botaniques du XIX^{ème} siècle; 15-probable actuelle. -16-17-limite d'*Ulex* probable actuelle, quand elle diffère de celle d'*Erica cinerea*. -18-limite d'*Ulex europaeus* L. (la station de St-Saulge, d'origine anthropique récente, n'est pas indiquée).




Fig. 242 - Répartition régionale d'arbustes et arbrisseaux d'affinités "méridionales".

1-massifs anciens. -2-plateaux gréseux. -3-dépressions liasiques. -4-plateaux à couverture d'argile à chailles. -5-plateaux calcaires (rendzines et sols bruns calcimorphes). -6-plateaux à couverture d'argile à silex. -7-sols hydromorphes de la formation de Brenne. -8-petits causses berrichons. -9-sols hydromorphes des sables d'épandage. -10-Val de Loire. -11-aire de *Spirea hypericifolia* L. ssp. *obovata* (W. et K.) Dostál. -12-répartition de *Burus sempervirens* L. -13-14-répartition de *Daphne laureola* L.: -13-aire principale; -14-station isolée. -15-16-répartition de *Cornus mas* L.: -15-aire principale; -16-station isolée.




Fig. 243 - Amplitude ionique de *Carpinus betulus* L.
et de *Fagus sylvatica* L.




Fig. 244 - Analyse
selon Czekanowski
des groupements à buis
du Sud du Bassin Parisien



Coefficients de Jaccard.





Fig. 246 - Analyse des groupements à buis du Sud du Bassin Parisien; -axes 1 et 3

Fig. 245 - Analyse des groupements à buis du Sud du Bassin Parisien; -axes 1 et 2




Fig. 248 - Analyse des groupements à buis du Sud du Bassin Parisien; - axes 1 et 4




Fig. 247 - Analyse des groupements à buis du Sud du Bassin Parisien; - axes 2 et 3

A *Buxus sempervirens* L.

DANS LE SUD DU BASSIN PARISIEN

E S P E C E S		R E L E V E S											é c o l o g i e					groupe phytogéographique		
													lumière	température	+ eau	humus				
		826	827	825	828	444	740	832	1064	752	443	1422	1421	température	+ eau	mor	moder	mull	mull calcaïque	
	330 <i>Melica ciliata</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	1724 <i>Thlaspi perfoliatum</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2019 <i>Sedum acre</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							3
	314 <i>Poa pratensis</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
B	333 <i>Ceratodon purpureus</i> (L.) Brid.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							1
L	1162p <i>Cladonia rangiformis</i> var. <i>pungens</i> (Ach.) Vain.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							1
	1483 <i>Arabis hirsuta</i> (L.) Scop.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	1354 <i>Arenaria serpyllifolia</i> L.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
L	1205p <i>Cladonia foliacea</i> var. <i>convoluta</i> (Lmk) Vain.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							3
	2042 <i>Saxifraga tridactylites</i> L.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
B	480 <i>Pleurochaete squarrosa</i> (Brid.) Lindb.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	1374 <i>Holosteum umbellatum</i> L.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	2020p <i>Sedum reflexum</i> L.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2014 <i>Sedum album</i> L.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	1821 <i>Erophila verna</i> L.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	1395 <i>Cerastium fontanum</i> ssp. <i>triviale</i> (Lmk.) J alas	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							1
L	770p <i>Peltigera canina</i> var. <i>rufescens</i> (Weiss.) Mudd.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							1
L	1195 <i>Cladonia symphylicarpa</i> (Ach.) Fr.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	2219 <i>Sorbus domestica</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
B	471 <i>Trichostomum crispulum</i> Bruch.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	1407 <i>Minuartia hybrida</i> (Will.) Sch.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2317 <i>Medicago minima</i> (L.) Bartal.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2020 <i>Sedum sexangulare</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	776 <i>Allium oleraceum</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	2301 <i>Ononis striata</i> Gouan	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
L	554 <i>Diploschistes bryophilus</i> (Ehrh.) Zahlbr.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
B	325 <i>Ditrichum flexicaule</i> (Schw.) Hampe	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	2227 <i>Prunus mahaleb</i>	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2173 <i>Potentilla tabernaemontani</i> Aschers.	+	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
B	854 <i>Rhytidium rugosum</i> (Ehrh.) Kindb.	2	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	386 <i>Bromus erectus</i> Huds.	1	2	2	3	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	741 <i>Anthericum ramosum</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	986 <i>Ophrys sphegodes</i> Miller	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	1907 <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Miller	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	2397 <i>Anthyllis vulneraria</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
B	812 <i>Oxyrrhynchium praelongum</i> (Hedw.) Wstf.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	2130 <i>Sanguisorba minor</i> Scop.	.	1	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.							3
	288 <i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers.	+	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.							2
	3438 <i>Stachys recta</i> L.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
L	1186 <i>Cladonia chlorophaea</i> (Floerke) Spreng.	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	4152 <i>Lactuca perennis</i> L.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	2631 <i>Linum tenuifolium</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	3603 <i>Asperula cynanchica</i> L.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2293p <i>Ononis spinosa</i> L.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	4183 <i>Hieracium pilosella</i> L.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.							3
	508 <i>Carex haleriana</i> Asso	2	2	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.							5
	2487 <i>Hippocrepis comosa</i> L.	1	1	2	1	2	.	.	.	.	.	.	.							4
	2284 <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.							5
	3979 <i>Carlina vulgaris</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.							3
	4100 <i>Leontodon hispidus</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	2683 <i>Scabiosa columbaria</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.							4
	3367 <i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.							3
	2396 <i>Trifolium rubens</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.							4

TABLEAU 93 (suite)

ESPECES		RELEVES										écologie					groupes phytogéographique		
												lumière	température	+ eau	moder	humus		mull calcaique	
		826	827	825	828	444	740	832	1064	752	443	1422	1421						
	4016 <i>Cirsium acaule</i> Scop.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						3
B	451 <i>Hymenostomum microstomum</i> (Hedw.) R. Br.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						4
	2767 <i>Eryngium campestre</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.						5
	2299 <i>Ononis natrix</i> L.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.						2
	4046 <i>Centaurea scabiosa</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.						3
	2849 <i>Seseli montanum</i> L.	1	1	2	+	.	1	.	.	.	.	.	.						2
	1475 <i>Silene nutans</i> L.	1	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.						5
	3470 <i>Thymus serpyllum</i> L.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.						3
	374p <i>Festuca hervieri</i> (St-Y.) Patzke	2	3	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.						2
	3364 <i>Teucrium chamaedrys</i> L.	2	1	1	1	1	1	.	.	.	.	.	.						5
	92 <i>Juniperus communis</i> L.	.	1	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.						2
	2479 <i>Coronilla minima</i> L.	.	1	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.						3
	3586 <i>Galium mollugo</i> L.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.						4
B	775 <i>Camptothecium lutescens</i> (Huds.) B.E.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.						2
	1914 <i>Fumana procumbens</i> (Dur.) Gren. et God.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.						4
	2630 <i>Linum catharticum</i> L.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.						4
	<i>Rosa</i> sp.	.	1	.	+	.	+	1	.	.	.	.	.						4
	1983 <i>Hypericum perforatum</i> L.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.						4
	336 <i>Briza media</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.						3
	438 <i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	.	+	.	1	2	1	1	.	+	.	.	.						4
	2476 <i>Coronilla varia</i> L.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.						5
	2413 <i>Lotus corniculatus</i> L.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.						4
	2205 <i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.						4
	2754 <i>Cornus sanguinea</i> L.	.	+	1	+	1	1	1	1	.	.	.	.						3
	552 <i>Carex flacca</i> Schreb.	.	.	.	2	2	1	1	.	.	.	.	.						1
	213 <i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.						3
B	702 <i>Neckera complanata</i> (L.) Hüb.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						4
	3552 <i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medic.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						4
	2216 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						5
	3428 <i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						5
B	718 <i>Anomodon viticulosus</i> (Hedw.) Hk. et Tayl.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.						2
	2715 <i>Polygala calcarea</i> F.W. Schultz	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.						2
B	850 <i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.						1
	2959 <i>Primula veris</i> L.	.	.	.	+	1	1	.	1	.	.	.	.						3
B	314 <i>Fissidens tariffolius</i> Hedw.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.						2
	1909b <i>Helianthemum nummularium</i> Miller	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.						4
	1254 <i>Buxus sempervirens</i> L.	2	2	2	1	3	3	3	4	3	3	2	1						3
	2663 <i>Geranium sanguineum</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.						4
	1530 <i>Helleborus foetidus</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.						2
	2509 <i>Vicia cracca</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.						3
	1014 <i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	3	2	1	.	.	.	.	.						4
	3568 <i>Rubia peregrina</i> L.	.	.	.	.	1	1	2	.	.	.	.	.						5
	2750 <i>Rhamnus catharticus</i> L.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.						2
B	817 <i>Pseudoscleropodium purum</i> (L.) Fl.	.	.	.	.	+	.	2	.	.	.	.	.						4
	3250 <i>Melampyrum cristatum</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.						2
	1246 <i>Euphorbia cyparissias</i> L.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.						3
	920 <i>Tamus communis</i> L.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.						3
	2214 <i>Sorbus terminalis</i> L.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.						4
	1377 <i>Stellaria holostea</i> L.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.						4
	935 <i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.						4
	344 <i>Dactylis glomerata</i> L.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.						4
	1945 <i>Viola hirta</i> L.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.						4
	847 <i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce	.	.	.	.	1	1	1	1	.	.	.	.						3
	2213 <i>Malus sylvestris</i> Miller	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.						4
	3083 <i>Buglossoides purpureocaeerulea</i> (L.) I.M. Johnst.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.						5
	2251 <i>Genista tinctoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.						4
	2087 <i>Ribes alpinum</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.						4
	2923p <i>Monotropa hypopitys</i> L. ssp. <i>hypopitys</i>	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.						5
	3254 <i>Melampyrum pratense</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.						2
	2230 <i>Prunus spinosa</i> L.	.	1	.	.	.	.	1	+	1	.	1	.						3
	2525 <i>Vicia sepium</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.						2

TABLEAU 93 (fin)

E S P E C E S		R E L E V E S											é c o l o g i e					groupe phytogéographique	
													lumière	température	humus				
															+ eau	moder	mull calcaïque		
		826	827	825	828	444	740	832	1064	752	443	1422	1421						
	3564 <i>Ligustrum vulgare</i> L.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.						4
	3618 <i>Viburnum lantana</i> L.	.	.	.	.	1	1	1	1	1	.	.	.						4
	3621 <i>Lonicera xylosteum</i> L.	.	.	.	.	+	1	1	1	1	.	.	.						3
	2148 <i>Fragaria vesca</i> L.	.	.	.	.	+	1	.	1	1	.	.	.						2
	1956 <i>Viola riviniana</i> Reich.	.	.	.	.	1	.	1	+	.	+	.	.						4
	334 <i>Melica uniflora</i> Retz.	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.						4
B	856 <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (L.) Wstf.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.	.	.						2
	3287 <i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.						4
	2204 <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	.	2	1					4
	1009 <i>Corylus avellana</i> L.	.	.	.	.	+	1	.	1	.	+	1	1	.					4
	2738 <i>Euonymus europaeus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.						3
	2729 <i>Acer campestre</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	1	1	3	1					4
	2755 <i>Hedera helix</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	1	3	1	+	1	1					4
	2114 <i>Rosa arvensis</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	+	.	.					5
	<i>Rubus fruticosus</i> L. s.a.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	+	1	.					4
B	721 <i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) B.E.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	1					2
	1007 <i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	2	2	.	1					5
	1648 <i>Berberis vulgaris</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					5
	968 <i>Orchis mascula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					4
	3466 <i>Calamintha sylvatica</i> Bromf.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					2
	828 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.					2
	1223 <i>Euphorbia dulcis</i> L. ssp. <i>dulcis</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					5
	1643 <i>Clematis vitalba</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					4
	242 <i>Juglans regia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.					4
	1062 <i>Ulmus minor</i> Mill.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					5
	1012 <i>Quercus robur</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					5
	1200 <i>Mercurialis perennis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	.	2	+					4
	437 <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.					4
	534 <i>Carex sylvatica</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.					2
	1566 <i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.					3
	2753 <i>Cornus mas</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					4
	3403 <i>Melittis melissophyllum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					4
	232 <i>Milium effusum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					5
	2192 <i>Geum urbanum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					4
	311 <i>Poa nemoralis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					2
	1622 <i>Ranunculus nemorosus</i> D.C.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.					5
	2958 <i>Primula elatior</i> (L.) Hill.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.					3
	2154 <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.					5
B	636 <i>Mnium undulatum</i> (L.) Weiss.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					4
	2229 <i>Prunus avium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					4
B	278 <i>Catharinea undulata</i> (L.) W. et M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					2
	1010 <i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.					5
B	221 <i>Calypogeia fissa</i> (L.) Rad.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					4
	846 <i>Convallaria majalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.					3
	1013 <i>Quercus petraea</i> (Mattuschka) Liebl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					5
B	287 <i>Polytrichum attenuatum</i> Menz.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					3
	3422 <i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Nath.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	1	.					3
	1581 <i>Ranunculus ficaria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					4
	3594 <i>Galium aparine</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					1
	2652 <i>Geranium robertianum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.					4
	670 <i>Arum maculatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	2	2	.					4
	3395 <i>Glechoma hederacea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	+	.					3
	2091 <i>Ribes uva-crispa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	+	.					3
B	806 <i>Eurhynchium striatum</i> (Schr.) Schp.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	2	.	1	.					5
	3547 <i>Vinca minor</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.					4
	3556 <i>Fraxinus excelsior</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.					4
	848 <i>Polygonatum multiflorum</i> (L.) All.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.					3
B	805 <i>Eurhynchium stockesii</i> (Turn.) B.E.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.					4
	3633 <i>Sambucus nigra</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.					4
80p	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.					2
77	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.					2





Fig. 249 - Part des espèces d'affinités méridionales dans le cortège floristique du buis, dans le Sud du Bassin Parisien.



Fig. 250 - Part des espèces d'affinités méridionales dans les cinq ensembles de relevés à buis du Sud du Bassin Parisien

- 1 - espèces localisées dans le Sud et l'Ouest de l'espace 4
- 2 - espèces localisées dans le Sud et l'Ouest de l'espace 5
- 3 - espèces localisées dans le Sud de l'espace 4
- 4 - espèces localisées dans le Sud de l'espace 5
- 5 - espèces localisées dans le Sud et l'Est de l'espace 4
- 6 - espèces localisées dans le Sud et l'Est de l'espace 5

TABLEAU 94

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE BRUT

DES GROUPEMENTS VEGETAUX A *Buxus sempervirens* L. DANS LE SUD DU BASSIN PARISIEN

	ELEMENTS PHYTOGEOGRAPHIQUES.														
	1	2	3	4					5						
				1	2	3	4	5	1	2	3	4	5		
Présence brute	15	53	66	126		6	4	19	1	20	3	22	6	23	16
%	3,9	13,9	17,4	33,2		1,6	1,1	5,0	0,3	5,3	0,8	5,8	1,6	6,1	4,2
							29						51		
							7,6						13,4		

code de la figure 207, p. 278.



Fig. 251 - Localisation des groupements à *Buxus sempervirens* L., faisant l'objet de la comparaison avec ceux du Bassin Parisien méridional.- Relevés effectués par:

- B - M. Bidault,
- D1 - L. Durin, J.M. Gehu, A. Noirfalise, N. Sougnez,
- D - L. Durin, W. Mullenders, C. Vanden Berghen,
- G - J.M. Gehu,
- R - J.C. Rameau,
- V - C. Vanden Berghen.

Légende commune aux figures 252 à 257:

- 1 - BRETAGNE: Durin, Géhu, Noirfalise, Sougniez, 1967.
- 2 - NORMANDIE:
 - a - Durin, Géhu, Noirfalise, Sougniez, 1967.
 - b - Géhu, 1964.
- 3 - ARDENNES ET LORRAINE DU NORD:
 - a - Vanden Berghen, 1954.
 - b - Durin, Mullenders, Vanden Berghen, 1964.
- 4 - BASSIN PARISIEN MERIDIONAL: relevés personnels.
- 5 - PLATEAUX BOURGUIGNONS, PLATEAU DE LANGRES, BASSIGNY, BARROIS:
 - a - Durin, Mullenders, Vanden Berghen, 1964.
 - b - Rameau, 1974.
- 6 - "COTE" BOURGUIGNONNE:
 - a - Bidault, 1961.
 - b - Rameau, 1974.




Fig. 253 - Groupements végétaux à buis dans les régions au Nord du Massif Central.-Analyse portant sur 51 relevés.-Axes 1 et 3.




Fig. 254 - Groupements végétaux à buis dans les régions
au Nord du Massif Central.
Analyse portant sur 51 relevés.- Représentation partielle.
Axes 2 et 3.

légende p. 328-329.




Fig. 255 - Groupements végétaux à buis dans les régions
au Nord du Massif Central.
Analyse portant sur 51 relevés.- Représentation partielle.
Axes 1 et 4.

légende p. 328-329.




Fig. 256 - Groupements végétaux à buis dans les régions au Nord du Massif Central. Analyse portant sur 41 relevés.- Axes 1 et 2.




Fig. 257 - Groupements végétaux à buis dans les régions au Nord du Massif Central. Analyse portant sur 41 relevés.- Axes 1 et 3.

GROUPEMENTS VEGETAUX A *Buxus sempervirens* L. - LOCALISATION DES RELEVES

RELEVES EFFECTUES EN BERRY ET EN NIVERNAIS

- 443 - Mont-Vigne (Nièvre).
 444 - Mont-Vigne.
 740 - Coteau du Cher, près de Châteauneuf (Cher).
 752 - Chevrouches (Nièvre).
 825 - Oisy (Nièvre).
 826 - Oisy.
 827 - Oisy.
 828 - Oisy.
 832 - St-Florent (Cher).
 1064 - le Taissiau, près de Dun-sur-Auron (Cher).
 1376 - Bois des Margaux, près de Rians (Cher).
 1421 - Alluy (Nièvre).
 1422 - Alluy.

RELEVES EMPRUNTES A DIVERS AUTEURS ET EFFECTUES HORS DU DOMAINE D'ELECTION DE *Buxus sempervirens* L.

- 1° - Bidault M., 1960:
 B 6 - Santenay (Côte-d'Or), *Querceto-Lithospermetum*.
 B 15 - Rully (Saône-et-Loire), *Querceto-Lithospermetum*.
 2° - Durin L., Gehu J.M., Noirfalise A., Sougniez N., 1967:
 D 2 - Forêt de Carnoet (Finistère), *Rusco-Fagetum*.
 D 5 - Belle-Isle-en-Terre (Côtes du Nord), *Rusco-Fagetum*
 D 8 - Forêt de Carnoet, *Rusco-Fagetum*.
 D 10 - Duclair (Seine-Maritime), *Daphne-Fagetum*.
 D 11 - Forêt de Maulévrier (Seine-Marit.), *Daphne-Fagetum*.
 3° - Durin L., Mullenders W., Vanden Berghen C., 1964:
 D 28 - Thonnance - les - Joinville (Haute - Marne), *Querceto-Lithospermetum*.
 D 29 - Naix-aux-Forges (Meuse), *Querceto-Lithospermetum*.
 D 30 - St-Amand-sur-Ornain (Meuse), *Ligustro-Prunetum*.
 D 31 - Bazoilles-sur-Meuse (Vosges), forêt à buis.

- D 32 - Bazoilles-sur-Meuse, forêt mixte à buis.
 D 33 - St-Martin-les-Langres (Haute-Marne), forêt mixte.
 D 34 - Outremécourt (Haute-Marne), forêt mixte.
 D 35 - Noidant-le-Rocheux (Haute-Marne), forêt mixte.
 D 36 - Brouennes (Meuse), hêtraie.
 D 37 - Brouennes, hêtraie.
 D 38 - Han-les-Juvigny (Meuse), hêtraie.
 D 39 - Juvigny-sur-Loison (Meuse), hêtraie.
 4° - Gehu J.M., 1964:
 G 18 - St-Wandrille (Seine-Maritime), *Coryleto-Buxetum*.
 5° - Rameau J.C., 1974:
 R236 - Grenant (Haute-Marne), *Scillo-Carpinetum*.
 R256 - Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), *Rubio-Quercetum*.
 R562 - Dampierre-en-Montagne (Côte-d'Or), *Ligustro-Prunetum*.
 R704 - Fixin (Côte-d'Or), *Scillo-Carpinetum*.
 R736 - Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or), *Rubio-Quercetum*.
 R747 - Corcelles-les-Monts (Côte-d'Or), *Seslerio-Tilietum*.
 R775 - Clavoillon (Côte d'Or), *Seslerio-Tilietum*.
 6° - Vanden Berghen C., 1954:
 V 89 - Dinant (Ardennes belges), buxaie.
 V 90 - Hastière-Lavaux (Ardennes belges), forêt à buis.
 V 91 - Givet (Ardennes), pelouse xérothermique.
 V 92 - Bouvignes (Ardennes belges), pelouse xérothermique.
 V 93 - Bouvignes, pelouse xérothermique.
 V 94 - Bouvignes, buxaie.
 V 95 - Waulsort (Ardennes belges), buxaie.
 V 96 - Houx (Ardennes belges), buxaie.
 V 97 - Bouvignes, forêt à buis.
 V 98 - Warnant (Ardennes belges), forêt à buis.
 V 99 - Hastière-Lavaux, forêt à buis.




Fig. 258 - Répartition régionale de trois espèces "méridionales" et d'une "montagnarde".

1-massifs anciens. -2-plateaux gréseux. -3-dépressions liasiqes. -4-plateaux à couverture d'argile à chailles. -5-plateaux calcaires (rendzines et sols bruns calcimorphes). -6-plateaux à couverture d'argile à silex. -7-sols hydromorphes de la formation de Brenne. -8-petits causses berrichons. -9-sols hydromorphes des sables d'épandage. -10-Val de Loire. -11 et 12-répartition de *Rubia perigrina* L.; -13-aire de grande abondance; -14-station isolée. -15-aire de *Chamaecytisus supinus* (L.) Link. -16-aire de *Helianthemum apenninum* (L.) Mill. -15 et 16-répartition de *Poa chaixii* Vill.; -15-aire de grande fréquence; -16-station isolée.

	2033	159	2062	134	77	2061	1703	1880
2033		41	38	50	46	46	24	28
159			45	41	45	45	33	30
2062				40	35	48	30	26
134					46	55	33	33
77						55	33	33
2061							43	34
1703								28
1880								

Fig. 259 - Homogénéité floristique des groupements forestiers dans lesquels se rencontre *Rhytidiadelphus loreus* (Dill.) Wstf. Les valeurs des coefficients de Jaccard sont indiquées

TABLEAU 96

LOCALISATION DES RELEVÉS A *Rhytidiadelphus loreus* (Dill.) Wstf.
Utilisés dans la figure 259.

- 77 - Nord-Ouest de la Forêt de la Bertrange, canton de l'Usage Défendu, près de Bois de Raveau.
- 134 - Forêt communale de Prémery.
- 159 - Nord-Ouest de la Forêt de la Bertrange, près de la Maison forestière de la Bertherie.
- 1703 - Sud de la Forêt de la Bertrange, Canton de Chaume.
- 1880 - Forêt domaniale de Prémery, canton de Rigny.
- 2033 - Forêt domaniale de Prémery, canton du Chasnay.
- 2061 - Forêt domaniale de Prémery, canton du Chasnay.
- 2062 - Bois de Giry.



Fig. 260 - Ecologie de *Daphne laureola* L. - Axes 1 et 2 de l'analyse.

TABEAU 97

LOCALISATION DES RELEVES A *Daphne laureola* L.
UTILISES POUR DEFINIR L'ECOLOGIE DE L'ESPECE.

- 48 - Ciez (Nièvre).
- 75 - Forges, commune de Bouhy (Nièvre).
- 76 - entre Ciez et Entrains (Nièvre).
- 106 - entre Ciez et Entrains (Nièvre).
- 108 - Ciez (Nièvre).
- 110 - Courcelles, au Nord-Est de Brinon-sur-Beuvron (Nièvre).
- 111 - Grenois (Nièvre).
- 112 - Villiers-sur-Yonne (Nièvre).
- 117 - Grand-Montois, près de Varzy (Nièvre).
- 168 - butte de Villiers-Saligny (Nièvre).
- 169 - butte de Villiers-Saligny (Nièvre).
- 170 - butte de Villiers-Saligny (Nièvre).
- 349 - La Chapelle-Saint-André (Nièvre).
- 570 - entre Montigny et Villepauant (Cher).
- 576 - les Ferrands, au Sud-Est de Montigny, (Cher)
- 594 - Montagné des Alouettes (Yonne).
- 700 - Bailly, au Sud-Ouest de Pouques-Lormes (Nièvre).
- 749 - Corvol-d'Embernard (Nièvre).
- 949 - Mont-Brivois, près de Brèves (Nièvre) sur la corniche.
- 952 - Mont-Brivois, près de Brèves (Nièvre) au sommet.
- 960 - Bois - Giraud, entre Ciez et Bouhy, (Nièvre).
- 1028 - Picarnon, au Nord-Ouest de Ciez, (Nièvre).
- 1030 - Bouhy (Nièvre).
- 1047 - Petit-Montois, près de Varzy (Nièvre).
- 1052 - Grand-Montois, près de Varzy (Nièvre).





Fig. 262 - Ecologie de *Poa chaixii* Vill. - Axes 1 et 2 de l'analyse.






TABEAU 98

LOCALISATION DES RELEVES A *Poa chaixii* Vill. UTILISES POUR DEFINIR L' ECOLOGIE DE L' ESPECE

4 - Usages d'Arbourse	996 - forêt de Trucy l'Orgueilleux (entre Trucy et Fondelin)
35 - Nord de Dompierre-sur-Nièvre	1081 - Mont-Martin (près de Dornecy)
45 - Forêt de Ronceaux (Sud-Ouest de Varzy)	1219 - Mont-Martin.
71 - Forêt de Ronceaux	2034 - Taillis de Dompierre (entre Châteauneuf et St-Bonnot)
120 - Usages de Châteauneuf (les Rouesses)	2035 - Taillis de Dompierre
304 - forêt d'Aprémont (Cher)	2039 - St-Hubert (commune de Châteauneuf Val de Bargis)
742 - bois de Rozay (à l'Est de St-Bonnot)	2042 - Forêt de Bouhy (Est de St-Malo)
908 - forêt de Trucy l'Orgueilleux (Nord de Corvol)	





3

Fig. 264 - Groupements à *Leucobryum glaucum* (L.) Schp. - Axes 1 et 3 de l'analyse.




Fig. 256 - Groupements végétaux à buis dans les régions au Nord du Massif Central. Analyse portant sur 41 relevés. - Axes 1 et 2.




Fig. 257 - Groupements végétaux à buis dans les régions au Nord du Massif Central. Analyse portant sur 41 relevés. - Axes 1 et 3.

GROUPEMENTS VEGETAUX A *Buxus sempervirens* L. - LOCALISATION DES RELEVES

RELEVES EFFECTUES EN BERRY ET EN NIVERNAIS

- 443 - Mont-Vigne (Nièvre).
 444 - Mont-Vigne.
 740 - Coteau du Cher, près de Châteauneuf (Cher).
 752 - Chevrouches (Nièvre).
 825 - Oisy (Nièvre).
 826 - Oisy.
 827 - Oisy.
 828 - Oisy.
 832 - St-Florent (Cher).
 1064 - le Taissiau, près de Dun-sur-Auron (Cher).
 1376 - Bois des Margaux, près de Rians (Cher).
 1421 - Alluy (Nièvre).
 1422 - Alluy.

RELEVES EMPRUNTES A DIVERS AUTEURS ET EFFECTUES HORS DU DOMAINE D'ELECTION DE *Buxus sempervirens* L.

- 1° - Bidault M., 1960:
 B 6 - Santenay (Côte-d'Or), *Querceto-Lithospermetum*.
 B 15 - Rully (Saône-et-Loire), *Querceto-Lithospermetum*.
 2° - Durin L., Gehu J.M., Noirfalise A., Sougneux N., 1967:
 D 2 - Forêt de Carnoet (Finistère), *Rusco-Fagetum*.
 D 5 - Belle-Isle-en-Terre (Côtes du Nord), *Rusco-Fagetum*
 D 8 - Forêt de Carnoet, *Rusco-Fagetum*.
 D 10 - Duclair (Seine-Maritime), *Daphne-Fagetum*.
 D 11 - Forêt de Maulévrier (Seine-Marit.), *Daphne-Fagetum*.
 3° - Durin L., Mullenders W., Vanden Berghen C., 1964:
 D 28 - Thonnance - les - Joinville (Haute - Marne), *Querceto-Lithospermetum*.
 D 29 - Naix-aux-Forges (Meuse), *Querceto-Lithospermetum*.
 D 30 - St-Amand-sur-Ornain (Meuse), *Ligustro-Prunetum*.
 D 31 - Bazoilles-sur-Meuse (Vosges), forêt à buis.

- D 32 - Bazoilles-sur-Meuse, forêt mixte à buis.
 D 33 - St-Martin-les-Langres (Haute-Marne), forêt mixte.
 D 34 - Outremécourt (Haute-Marne), forêt mixte.
 D 35 - Noidant-le-Rocheux (Haute-Marne), forêt mixte.
 D 36 - Brouennes (Meuse), hêtraie.
 D 37 - Brouennes, hêtraie.
 D 38 - Han-les-Juvigny (Meuse), hêtraie.
 D 39 - Juvigny-sur-Loison (Meuse), hêtraie.
 4° - Gehu J.M., 1964:
 G 18 - St-Wandrille (Seine-Maritime), *Coryleto-Buxetum*.
 5° - Rameau J.C., 1974:
 R236 - Grenant (Haute-Marne), *Scillo-Carpinetum*.
 R256 - Gevrey-Chambertin (Côte-d'Or), *Rubio-Quercetum*.
 R562 - Dampierre-en-Montagne (Côte-d'Or), *Ligustro-Prunetum*.
 R704 - Fixin (Côte-d'Or), *Scillo-Carpinetum*.
 R736 - Marsannay-la-Côte (Côte-d'Or), *Rubio-Quercetum*.
 R747 - Corcelles-les-Monts (Côte-d'Or), *Seslerio-Tilietum*.
 R775 - Clavoillon (Côte d'Or), *Seslerio-Tilietum*.
 6° - Vanden Berghen C., 1954:
 V 89 - Dinant (Ardennes belges), buxaie.
 V 90 - Hastière-Lavaux (Ardennes belges), forêt à buis.
 V 91 - Givet (Ardennes), pelouse xérothermique.
 V 92 - Bouvignes (Ardennes belges), pelouse xérothermique.
 V 93 - Bouvignes, pelouse xérothermique.
 V 94 - Bouvignes, buxaie.
 V 95 - Waulsort (Ardennes belges), buxaie.
 V 96 - Houx (Ardennes belges), buxaie.
 V 97 - Bouvignes, forêt à buis.
 V 98 - Warnant (Ardennes belges), forêt à buis.
 V 99 - Hastière-Lavaux, forêt à buis.



Fig. 267 - Essai de définition du groupe socio-écologique de *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.-Représentation partielle des espèces entrant dans les inventaires de végétation où *Leucobryum glaucum* est présent (plan des axes 1 et 2 de l'analyse);- pour l'identification des espèces, se reporter au tableau 99.

- I - taxons communs aux groupes de relevés A et B de la figure 263.
- II - taxons n'appartenant qu'au groupe A.
- III - taxons n'appartenant qu'au groupe B.

- 1 - *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.
- 2 - taxons qui par leur degré de commensalité méritent d'entrer dans le groupe socio-écologique de *Leucobryum glaucum*.
- 3 - compagnes occasionnelles de *Leucobryum glaucum*.

TABLEAU

ESSAI DE DEFINITION DU

à *Leucobryum*

ENSEMBLES						A _{1a}						A _{1b}				
RELEVES		151	58	86	374	165	140	55	1606	159	5	2054	312	2279	153	125
GROUPE ETROIT:																
BRYOPHYTES SEULS:																
B 388	<i>Leucobryum glaucum</i> (L.) Schp.	+	+	+	22	12	12	+	+	12	+	12	12	12	12	22
B 379	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.	12	.	.	12	12	12	+	12	12	+	12	12	+	22	12
B 820	<i>Pleurozium schreberi</i> (Wild.) Mitt.	.	.	.	12	.	.	.	.	12	+	.	.	.	.	.
B 346	<i>Dicranella heteromalla</i> (L.) Schp.	.	.	+	.	.	.	.	.	12	.	.	.	12	.	.
B 323	<i>Ditrichum pallidum</i> (Schr.) Hpe.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.
B 331	<i>Pleuridium subulatum</i> (Hedw.) Lindb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	12
HERBACEES ET ARBRISSEAUX:																
246	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	22	.	.	22	22	22	12	12	12	22	22	.	12	22	33
4215	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	1	.
2945	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull.	.	.	.	1	2	.	+	.	.	.	+	1	1	1	2
2942	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2948	<i>Erica cinerea</i>	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
373p	<i>Festuca filiformis</i> Pourret	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
GROUPE LARGE:																
BRYOPHYTES:																
B 840	<i>Hypnum cupressiforme</i> L.	1	.	+	12	.	12	.	.	22	+	+	12	.	12	.
B 855	<i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Dill.) Wstf.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.
HERBACEES ET ARBRISSEAUX:																
510	<i>Carex pilulifera</i> L.	.	.	22	12	22	+	.	.	12	1	12	12	1	12	22
52	<i>Pteridium aquilinum</i> (L.) Kuhn	.	.	12	2	1	.	1	1	22	1	22	.	33	12	1
1988	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	+	+	.	.	.	.
4206	<i>Hieracium lachenalii</i> (Gmel.) Zahn	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
LICHENS (affectation provisoire):																
L 1168	<i>Cladonia pityrea</i> (Ach.) Floerke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
L 1143	<i>Cladonia impexa</i> Harm.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L 1175	<i>Cladonia coniocraea</i> (Floerke) Hav.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L 1176	<i>Cladonia ochrochlora</i> Floerke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L 1189	<i>Cladonia fimbriata</i> (L.) Fr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L 1574	<i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
L 1186	<i>Cladonia chlorophaea</i> (Floerke) Spreng	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
GROUPE TRES LARGE:																
B 287	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz.	.	+	.	12	12	22	1	12	.	22	12	12	.	12	12
3359	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	1	.	.	1	1	1	+	1	1	+	1	1	1	1	1
3254	<i>Melampyrum pratense</i> L.	.	.	.	1	1	.	.	1	.	1	1	.	+	.	.

Les numéros qui précèdent les noms des plantes renvoient aux

glaucum (L.) Schp.

ouvrages de P. Fournier, J. Augier, P. Ozenda et G. Clausade.

TABLEAU 100

LOCALISATION DES RELEVES UTILISES POUR DEFINIR LE GROUPE SOCIO-ECOLOGIQUE
DE *Leucobryum glaucum* (L.) Schp.

- 5 - Arbourse, Usages d'Arbourse (Nièvre).
- 52 - Forêt des Vaulurins, 2,5km au Sud de Cessy-les-Bois (Nièvre).
- 55 - Forêt communale d'Urzy (Nièvre).
- 58 - Forêt domaniale de la Bertrange, la Bertherie (Nièvre).
- 63 - Usages de Chaulgnes (Nièvre)
- 70 - Forêt domaniale de la Bertrange, les Bois-Dieu.
- 77 - Forêt domaniale de la Bertrange, l'Usage-défendu
- 79 - Forêt domaniale de Prémary, Tirache (Nièvre).
- 85 - Forêt de la Croix-du-Cerf, au Nord d'Oudan (Nièvre).
- 86 - Forêt domaniale de la Bertrange, la Tête de Chat (Nièvre).
- 102 - Massif de Saint-Saulge (Nièvre).
- 125 - Forêt communale de Prémary (Nièvre).
- 127 - Forêt communale de Prémary.
- 128 - Forêt communale de Prémary.
- 130 - Forêt communale de Prémary.
- 135 - Forêt communale de Prémary.
- 138 - Forêt communale de Prémary.
- 140 - Sardolles, commune de Beaumont-Sardolles (Nièvre).
- 149 - l'Orme au Loup, au Sud de Sancerre (Cher)
- 151 - l'Orme au Loup.
- 153 - l'Orme au Loup.
- 154 - l'Orme au Loup.
- 159 - Forêt domaniale de la Bertrange, la Bertherie.
- 160 - Forêt domaniale de la Bertrange, la Coque-Martinot.
- 162 - Forêt de Tronçay, au Sud de Saint-Révérien (Nièvre).
- 165 - Ouagne (Nièvre).
- 312 - les Bordes, à l'Ouest de Grossouvre (Cher).
- 356 - Forêt domaniale de Vincence (Nièvre).
- 374 - Humbligny (Cher).
- 419 - Limon (Nièvre).
- 421 - Limon (Nièvre).
- 437 - Bois-Rabot, au Sud - Sud-Est de Cosne-sur-Loire (Nièvre).
- 595 - Fontenille, au Nord-Ouest de Saint-Andelain (Nièvre).
- 756 - Saint-Révérien.
- 815 - Forêt domaniale de Bommiers (Indre).
- 871 - Forêt domaniale de Tronçais (Allier).
- 1275 - Forêt de Bagnolet (Allier).
- 1604 - Forêt domaniale de la Bertrange.
- 1606 - Forêt domaniale de la Bertrange.
- 1613 - Forêt domaniale de Tronçais.
- 1627 - Forêt domaniale de Tronçais.
- 1628 - Forêt domaniale de Tronçais.
- 1702 - Forêt domaniale de la Bertrange.
- 1706 - Forêt communale d'Urzy (Nièvre).
- 1732 - Forêt domaniale de la Bertrange.
- 1922 - Bois de Castelnau, près de Villeneuve-sur-Cher (Cher).
- 2005 - Forêt domaniale de Bommiers.
- 2018 - Bois-Rabot.
- 2020 - Bois-Rabot.
- 2052 - les Grands-Bois, au Sud-Est de Dompierre-sur-Nièvre (Nièvre).
- 2053 - les Grands-Bois.
- 2054 - les Grands-Bois.
- 2061 - Forêt domaniale de Prémary, le Chasnay.
- 2127 - Forêt communale de Prémary.
- 2279 - Forêt de Maulne, au Nord-Est de Meillant (Cher).

TABLEAU 101

C A T A L O G U E . R E G I O N A L
E C O L O G I Q U E , C H O R O L O G I Q U E E T S O C I O L O G I Q U E
D E S E S P E C E S D E S F O R E T S E T D E S L I S I E R E S F O R E S T I E R E S

I

CODE DU TABLEAU

- 1° - Les noms des plantes sont précédés:
- pour les Phanérogames et les Cryptogames vasculaires, de leur numéro dans "Les Quatre Flores de France" de Fournier (1961); la lettre *p* est utilisée lorsque la plante répertoriée correspond à une subdivision du taxon retenu dans l'ouvrage.
 - pour les Bryophytes de la lettre *B*, suivie de leur numéro dans la Flore de Augier (1966).
 - pour les Lichens, de la mention *L*, suivie de leur numéro dans Ozenda et Clauzade (1972).
- 2° - La répartition géographique des espèces est marquée en utilisant le code de la figure 207, p. 278 (cf. aussi texte p. 307 sq.):
- 1 - espèces subcosmopolites,
 - 2 - espèces holarctiques,
 - 3 - espèces eurasiatiques,
 - 4 - espèces localisées dans l'espace Europe-Asie occidentale-Afrique du Nord,
 - 5 - espèces localisées en Europe.
- Pour les espèces des groupes 4 et 5, le deuxième chiffre indique éventuellement que l'aire de répartition n'intéresse qu'une partie de ces périmètres, soit:
- 41 et 51 - l'Ouest (espèces atlantiques et subatlantiques),
 - 42 et 52 - l'Ouest et le Sud (subatlantiques-subméditerranéennes),
 - 43 et 53 - le Sud (subméditerranéennes = "méridionales"),
 - 44 et 54 - le Sud et l'Est,
 - 45 et 55 - l'Est (médio et est-européennes),
 - 56 - le Nord.

La lettre *m* signale en outre des affinités montagnardes.

CODE DU TABLEAU 101 (suite)

3° - Les symboles suivants définissent type morphologique et forme biologique:

B - Bryophytes,

Lc - Lichens

Pour les Ptéridophytes et les Spermaphytes:

Ph - Phanérophytes:

PhM - Macrophanérophytes:arbres pouvant entrer dans la futaie,

Phm - Mésophanérophytes:arbres figurant normalement dans la strate de taillis,

Phn - Nanophanérophytes:arbustes et arbrisseaux,

Ch - Chamaephytes,

Hm - Hémicryptophytes,

Hl - Hélophytes,

Hd - Hydrophytes,

G - Géophytes,

Th - Thérophytes.

La lettre l indique qu'il s'agit d'une liane,ligneuse ou herbacée.

4° - L'auto-écologie des plantes est caractérisée de manière succincte:

- besoins en lumière:

L - espèces héliophiles,

l - espèces hélioclines,

s - espèces sciaphiles.

- besoins en chaleur:

T - espèces thermophiles,

t - espèces thermoclines.

la localisation saisonnière des besoins en lumière et en chaleur est, le cas échéant marquée par les lettres:

v - printemps,

e - été.

- besoins en eau:évalués de 1 (très limités) à 5 (très élevés);

le signe X indique que la plante demande,ou supporte,un régime hydrique alternant les périodes d'engorgement en eau et les phases de dessiccation du sol.

- besoins trophiques: les espèces sont classées par référence au type d'humus.

CODE DU TABLEAU 101 (suite)

5° - L'appartenance sociologique des espèces est définie de manière large au niveau des grandes unités (Classe, Ordre, parfois Alliance). Leur affectation s'écarte s'il y a lieu des données de la littérature, en fonction des observations réalisées dans la région. Pour beaucoup de plantes, une attribution plus précise est fournie par les tableaux de présentation des associations.

I - PLANTES FIGURANT NORMALEMENT DANS DES ASSOCIATIONS APPARTENANT A DES FORMATIONS FORESTIERES OU A DES GROUPEMENTS CONNEXES:

a) Plantes entrant dans des groupements sylvatiques:

QF - plantes des *QUERCO-FAGETEA* Br. Bl. et Viegler 1937: large gamme d'associations, riches en espèces, sur des sols présentant un complexe absorbant satisfaisant (rendzines, sols bruns calciques, sols brunifiés, sols faiblement lessivés), et bénéficiant en général d'une économie de l'eau correcte.

Certaines de ces plantes se localisent de préférence dans l'un des Ordres entre lesquels se partage la Classe:

QP - plantes des *Quercetalia pubescentis* Br. Bl. 1932: forêts qui dans la région affirment un vigoureux caractère baso-thermophile; associations souvent très riches en espèces (elles intègrent en proportion variable des taxons des associations de lisière et des associations de pelouses de la sigmassociation).

FG - plantes des associations, basophiles ou acidophiles, non ou faiblement thermophiles des *Fagetalia sylvaticae* Pawl. 1928. Elles peuvent appartenir plus spécialement:

* à des groupements mésophiles:

F - Alliance du *Fagion* Tx. et Diemont 1936,

C - Alliance du *Fraxino-Carpinion* Tx. 1937;

* ou à des groupements hygrophiles:

U - Alliance de l'*Alno-Padion* Knapp 1942 = *Alno-Ulmion* Br. Bl. et Tx. 1943.

QR - plantes des *Quercetalia robori-petraeae* Tx. 1931, Ordre unique de la Classe des *QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE* Br. Bl. et Tx. 1943: groupements pauvres en espèces des sols à complexe absorbant désaturé (sols lessivés, sols podzoliques). La flore, acidophile, comprend des espèces de landes. Lorsque l'hydromorphie tend à devenir un caractère dominant du sol, les groupements sont marqués par l'importance des plantes adaptées au régime hydrique alternant (forestières ou non).

FR - plantes se rencontrant à la fois dans les *QUERCO-FAGETEA* Br. Bl. et Viegler 1937, et dans les *QUERCETEA ROBORI-PETRAEAE* Br. Bl. et Tx. 1943.

CODE DU TABLEAU 101 (suite)

SL et AL - plantes entrant dans des associations forestières dont le principal caractère est l'Hygrophilie:

SL - espèces des saulaies : Ordre des *Salicetalia purpureae* Moor 1958, de la classe des *SALICETEA PURPUREAE* Moor 1958.

AL - aulnaies: *Alnetalia glutinosae* Tx. 1937 (*ALNETEA GLUTINOSAE* Br. Bl. et Tx. 1943).

b) Plantes dont l'habitat se trouve normalement dans les groupements connexes : associations des bordures forestières et des formations de dégradation:

PR - Espèces des *Prunetalia spinosae* Tx. 1952, Ordre rangé dans la Classe des *QUERCO-FAGETEA* Br. Bl. et Viegler 1937 ou dans celle des *RHAMNO-PRUNETEA* Riv. God. 1961: l'Ordre rassemble des groupements buissonnants provenant de la dégradation des forêts des *QUERCO-FAGETEA*, ou représentant un stade de reconstitution. Une grande partie des arbustes des *Prunetalia* se retrouve dans les *Fagetalia* et (ou) les *Quercetalia pubescentis*.

OR - Plantes des *Origanetalia* Th. Müller 1961, Ordre unique de la Classe des *TRIFOLIO-GERENIATEA SANGUINEI* Th. Müller 1961, qui groupe des associations de lisières, riches en héliophiles; beaucoup d'espèces sont en outre thermophiles.

Aux plantes propres aux *Origanetalia* se mêlent celles qui transgressent depuis les pelouses de la sigmassociation.

EP - plantes entrant dans les associations des clairières et des coupes (*EPILOBIETAE ANGUSTIFOLII* Tx. et Preisg. 1950; *Epilobietalia angustifolii* Tx. 1950): nombreuses héliophiles non thermophiles, les unes acidophiles, les autres neutrophiles ou basophiles.

OS et CU - Espèces des landes

OS - landes des tourbières bombées: *OXYCOCCO-SPHAGNETEA* Br. Bl. et Tx, 1943.

CU - landes installées sur d'autres substrats: *CALLUNO-ULICETEA* Br. Bl. et Tx. 1943. La plupart des espèces, mais non toutes, affirment un caractère nettement acidophile.

II - PLANTES FIGURANT NORMALEMENT DANS DES ASSOCIATIONS APPARTENANT A DES FORMATIONS HERBACEES:

b) Espèces des prairies ou (et) des pelouses:

MJ - Espèces des *MOLINIO-JUNCETEA* Br. Bl. 1947: associations herbacées denses, naturelles, sur sols gorgés d'eau. Les groupements de caractère médio-européen forment l'Ordre des *Molinietalia* W. Koch 1926.

AR - Espèces entrant dans les prairies semi-naturelles des *ARRHENATHERETEA* Br. Bl. 1947.

SC - Espèces des pelouses et gazons sur sables ou surfaces rocheuses altérées (*SEDO-SCLERANTHETEA* Br. Bl. 1955).

CODE DU TABLEAU 101 (fin)

- N* - Espèces des pâturages à nard sur substrat siliceux (*NARDETEA*).
- FB* - Espèces des pelouses mésophiles ou xérophiles sur calcaires ou marno-calcaires (*FESTUCO-BROMETEA* Br. Bl. et Tx. 1943).
- BR* - la plupart des espèces des *FESTUCO-BROMETEA* appartiennent dans la région à l'Ordre des *Brometalia erecti* Br. Bl. 1936, (l'Ordre des *Festucetalia valesiacae* Br. Bl. et Tx. 1943 étant de caractère médio-européen).
- IN* - Plantes des *ISOETO-NANOJUNCETEA* Br. Bl. et Tx. 1943, petites surfaces de gazon affectées par une submersion saisonnière durable.
- b) Espèces de marais:*
- SH* - Plantes des bas marais (*SCHEUCHZERIO-CARICETEA FUSCAE* Nordhagen 1936).
- PH* - Plantes des *PHRAGMITETEA* Tx. et Preisg. 1942 (associations des bordures d'étang).
- MC* - Plantes des *MONTIO-CARDAMINETEA* Br. Bl. et Tx. 1943, (associations du bord des sources et des ruisseaux limpides).
- LT* - Plantes des *LITTORELLETEA* Br. Bl. et Tx. 1943 (groupements submergés pendant une bonne partie de l'année).
- c) Plantes appartenant à des groupements des fissures de rochers:*
- AP* - Plantes des *ASPLENIETEA RUPESTRIS* (H. Meier) Br. Bl. 1934, des parois sèches ou fraîches (mais non très humides).
- d) Espèces des groupements rudéraux, "mauvaises herbes":*
- PL* - Plantes des *PLANTAGINETEA MAJORIS* Tx. et Preisg. 1950, groupements nitrophiles des sols rendus compacts par le piétinement.
- ON* - Plantes des *ONOPORDETEA* Br. Bl. 1964, groupements de grandes herbes vivaces ou bisannuelles bordant des formations arbustives, ou installées sur les berges.
- SL* - Mauvaises herbes des champs de céréales (entrant dans la Classe des *SECALINETEA* Br. Bl. 1951).
- CH* - Mauvaises herbes des tas d'ordures, des bords de chemins, des cultures sarclées (entrant dans la Classe des *CHENOPODIETEA* Br. Bl. 1952 em. 1962).

Les parenthèses marquent une réserve sur le caractère concerné.

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	Lumière	chaleur	humidité	Mor	Moder	Mull	Mull calcique	SOCIOLOGIE
A												
2729	<i>Acer carpestre</i> L.	4		Phm	1	t	2-3			-	-	QF
2731	<i>Acer monspessulanum</i> L.	53		Phm	1	T	2			-	-	QP
2728	<i>Acer platanoides</i> L.	4		Phm			4			-	-	FG
2727	<i>Acer pseudoplatanus</i> L.	5		Phm	1		3-4			-	-	FG
980	<i>Aceras anthropophorum</i> (L.) Ait.	42		G	L	t	2 X 3			-	-	BR
3615	<i>Adora moschatellina</i> L.	2		G			4			-	-	FG
2128	<i>Agrimonia eupatoria</i> L.	2		Hm	L	t	3			-	-	OR
212	<i>Agrostis canina</i> L.	3		Hm			4-5			-	-	SH
214	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	2		Hm	1		3 X 5			-	-	PL
210	<i>Agrostis tenuis</i> Sibth.	2		Hm	1		3			-	-	CU-AR
3354	<i>Ajuga reptans</i> L.	4		Hm	1		2 X 4			-	-	AR-FR
1739	<i>Alliaria petiolata</i> (Bieb.) Cav. et Gr.	4		Hm			3			-	-	ON
776	<i>Allium oleraceum</i> L.	3		G	L	t	2-3			-	-	FB-CH
803	<i>Allium ursinum</i> L.	4		G			4-5			-	-	FG
774	<i>Allium vineale</i> L.	4		G	1	t	2-3			-	-	CH
1005	<i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	4		PhM	1		4-5			-	-	AL-FG
2209	<i>Amelanchier ovalis</i> Med.	53		Phn	L	T	2			-	-	PR
1566	<i>Anemone nemorosa</i> L.	3		G	lv		2-4			-	-	QF
2883	<i>Angelica sylvestris</i> L.	3		Hm			3 X 5			-	-	MJ-U
B			B				2			-	-	
718	<i>Anomodon viticulosus</i> (L.) H. et T.	2		G	L	T	2-3			-	-	OR-QP
741	<i>Anthericum ramosum</i> L.	5		Hm	L		2 X 3			-	-	AR-QR
124	<i>Anthoxanthum odoratum</i> L.	1		G			3			-	-	FG
670	<i>Arum maculatum</i> L.	4		G			3-4			-	-	FG
1266	<i>Asarum europaeum</i> L.	44		G	s					-	-	

3603	<i>Asperula cynanchica</i> L.	54	Hm	L	t	1-2	-	FB
3608	<i>Asperula odorata</i> L.	3	G	s		3-4	-	FG
737	<i>Asphodelus albus</i> Miller	52	G	L		2 X 4	-	QR-CU
67	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	1	Hm			2	-	AP-QR
3766	<i>Aster amellus</i> L.	44	Hm	L	T	2	-	OR-FB
3761	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.	53	Hm	L	T	2	-	OR-FB
2435	<i>Astragalus glycyphyllos</i> L.	3	Hm	L	te	2-4	-	OR
70	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	3	Hm	L		4	-	FG
B 650	<i>Aulacomnium palustre</i> (L.) Schw.	1	B	s		4-5	-	MJ-LT
B								
1648	<i>Berberis vulgaris</i> L.	5	Phn	L	Te	2	-	PR
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	3	Phm	L		2 X 4	-	FR
1002	<i>Betula pubescens</i> Ehrh.	2	Phm			4-5	-	(QR)
48	<i>Blechnum spicant</i> (L.) Roth	2	Hm	s		4-5	-	AL-QR
438	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	4	Hm	1		2 X 4	-	FB-QR
437	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	4	Hm			2-4	-	QF
B 789	<i>Brachythecium rutabulum</i> (L.) B.E.	1				4	-	MC-FG
B 784	<i>Brachythecium salebrosum</i> (Hoff.) B.E.	2				3-4	-	
B 779	<i>Brachythecium velutinum</i> (L.) B. E.	2				4	-	
336	<i>Briza media</i> L.	3	Hm	L	t	3	-	FB-AR
386	<i>Bromus erectus</i> Huds.	4	Hm	L	t	2	-	BR
387	<i>Bromus ramosus</i> Huds.	4	Hm	1		3-4	-	EP-FG
3083	<i>Buglossoides purpureocaullea</i> (L.) I.M. Johnston ...	44	Ch	1	T	2-3	-	QF-OR
2812	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	3	Hm	L	t	2-3	-	OR-QP
1254	<i>Buxus sempervirens</i> L.	53	Phn	1	T	1-3	-	QF
C								
3466	<i>Calamintha officinalis</i> Moench	52	Hm	1	t	2	-	OR-QP
B 763	<i>Calliargonella cuspidata</i> (L.) Lske.	1				4-5	-	SH-MJ-AL
2945	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	4	Ch	L		2 X 4	-	CU
1525	<i>Caltha palustris</i> L.	2	Hm	1		5	-	MJ-U
B 216	<i>Calypogeia arguta</i> Nees et Mt.	52		s		4-5	-	CU
B 221	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Rad.	1				4-5	-	(AL)
B 222	<i>Calypogeia trichomanis</i> (L.) Cda.	2				4-5	-	
3696	<i>Campanula rotundifolia</i> L.	2	Hm	L		2-3	-	FB-N
3705	<i>Campanula trachelium</i> L.	4	Hm			3	-	FG
B 775	<i>Camptothecium lutescens</i> (Huds.) B.E.	2	B		t	2-3	-	BR

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	lumière	chaleur	humidité	ECOLOGIE				SOCIOLOGIE
								Mor	Moder	Mul1	Mul1 calcique	
B 354	<i>Campylopus flexuosus</i> (L.) Brid.	1	B	Hm	1		4-5	-	-	-	-	MJ-AR
B 355	<i>Campylopus fragilis</i> (Brid.) B.S.G. var. <i>pyriformis</i> Ag.	3	B	Hm	L	t	3	-	-	-	-	BR
1808	<i>Cardamine pratensis</i> L.	2		H1	L		4 X 5					PH
4072	<i>Carduncellus mitissimus</i> (L.) D.C.	52		Hm	L		5					PH
498	<i>Carex acuta</i> L.	2		Hm			2 X 3					FB
560	<i>Carex acutiformis</i> Ehrh.	2		Hm			4-5					SH
515	<i>Carex caryophyllaea</i> Latourr.	2		Hm			2					QF
543	<i>Carex demissa</i> Hornem.	3		Hm			3					EP
516	<i>Carex digitata</i> L.	4		Hm-H1			4-5					SH
483	<i>Carex divisa</i> Stokes	4		Hm-H1			4 X 5					PH
486	<i>Carex echinata</i> Murray	4		Hm			2 X 4					FB-MJ
497	<i>Carex hudsonii</i> A. Benn.	4		Hm		t	1-2					BR-OR
552	<i>Carex flacca</i> Schreb.	1		Hm	L	Te	1					FB
508	<i>Carex halleriana</i> Asso	54		Hm	L	Te	1-2					OR-QP
506	<i>Carex humilis</i> Leyss.	44		Hm	L	Te	3 X 5					N-SH
509	<i>Carex montana</i> L.	54		Hm	1	Te	3					EP
488	<i>Carex ovalis</i> Good.	4		Hm			2 X 4					MJ-EP
482	<i>Carex pairaei</i> (Schultz) Celak.	4		Hm			4-5					FG
538	<i>Carex pallescens</i> L.	2		Hm	1		2-3					CU
550	<i>Carex pendula</i> Huds.	4		Hm			4-5					FG
510	<i>Carex pilulifera</i> L.	3		Hm			3-4					EP
487	<i>Carex remota</i> Jusl. ex. L.	2		Hm			3-4					FG
481	<i>Carex spicata</i> Huds.	(4)		Hm			2 X 4					MJ
534	<i>Carex sylvatica</i> Huds.	2		Hm	L		3-4					FG
513	<i>Carex tomentosa</i> L.	3		Hm			5					PH
514	<i>Carex umbrosa</i> Hoppe	55		Hm		t						
558	<i>Carex vesicaria</i> L.	2		H1	L							

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	Lumière	chaleur	humidité	ECOLOGIE				SOCIOLOGIE
								Mor	Moder	Mull	Mull calcaïque	
L 1165	<i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm.	1	Lc									SC-OS
L 1139	<i>Cladonia tenuis</i> (Fl.) Harm. em. Des Abbayes	2	Lc	Phl	L	t	2-4	-	-	-	-	PR
1643	<i>Clematis vitalba</i> L.	4					4-5	-	-	-	-	MJ
B 686	<i>Climacium dendroïdes</i> (Dill.) W. et M.	2	B				3	-	-	-	-	OR
3465	<i>Clinopodium vulgare</i> L.	5		Hm		Te	3-5	-	-	-	-	MJ
727	<i>Colekteum autumnale</i> L.	3		G			1-2	-	-	-	-	PR-QP
2427	<i>Colutea arborescens</i> L.	43		Phn	L	T	2-4	-	-	-	-	QF
846	<i>Convallaria majalis</i> L.	3		G			1-2	-	-	-	-	PR
2753	<i>Cornus mas</i> L.	44		Phn	1	T	2-3	-	-	-	-	PR
2754	<i>Cornus sanguinea</i> L.	3		Phn	1		2	-	-	-	-	BR
2479	<i>Coronilla minima</i> L.	43		Ch	L	T	2	-	-	-	-	OR
2576	<i>Coronilla varia</i> L.	54		Hm	L		3	-	-	-	-	QF
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	4		Phn	1		3-4	-	-	-	-	QF
2205	<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) D.C.	4		Phn			2-4	-	-	-	-	PR
2204	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	4		Phn	1		3-4	-	-	-	-	ON
3597	<i>Cruciata lcevides</i> Opiz	3		Hm	1	t	2-3	-	-	-	-	BR
B 850	<i>Ctenidium molluscum</i> (Hedw.) Mitt.	2	B				4	-	-	-	-	ON-SL
1522	<i>Cucubalus baccifer</i> L.	44		Hm	1	t	4	-	-	-	-	FG
55	<i>Curriana dryopteris</i> (L.) Wherry	2 ^m		G			3-4	-	-	-	-	CU
2273	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	51		Phn	L			-	-	-	-	
D												
344	<i>Dactylis glomerata</i> L.	4		Hm	1		3	-	-	-	-	AR
971	<i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	3		G	L		3 X 5	-	-	-	-	MJ
1288	<i>Daphne laureola</i> L.	52		Phn		t	2	-	-	-	-	QF
244	<i>Deschampsia caespitosa</i> (L.) Beauv.	1		Hm	1		4-5	-	-	-	-	MJ-FG

246	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	2		Hm	1		3		FR
1494	<i>Dianthus armeria</i> L.	3		Hm	L	t	3	-	OR-CU
1500	<i>Dianthus superbus</i> L.	3		Hm	L		3-4	-	MJ
B 347	<i>Dicranella cerviculata</i> (Hedw.) Schp.	2	B				4	-	QR-CU
B 346	<i>Dicranella heteromalla</i> (L.) Schp.	2	B				3	-	FR
B 380	<i>Dicranum bonjeani</i> de Not.	2	B				4-5	-	SH-OS
B 379	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.	2	B				2-4	-	FR
B 378	<i>Dicranum undulatum</i> Ehrh.	2	B				2-4	-	CU
3246	<i>Digitalis lutea</i> L.	5 ¹		Hm	L	t	2-3	-	EP-OR
3248	<i>Digitalis purpurea</i> L.	5 ¹		Hm	L		3-4	-	EP
B 325	<i>Ditrichum flexicaule</i> (Schl.) Hpe.	2	B				1-2	-	FB-OR
B 323	<i>Ditrichum pallidum</i> (Schr.) Hpe.	2	B				2-3	-	FR
80 p	<i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	2		Hm	s		2-4	-	FG-AL
80 p	<i>Dryopteris dilatata</i> (Hoffm.) A. Gray	3		Hm	s		4-5	-	AL-(FG)
77	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	2		Hm	s		3-4	-	FG
E									
819	<i>Endymion non-scriptus</i> (L.) Garcke	5 ¹		G			3	-	FG
B 821	<i>Entodon orthocarpus</i> (La P.) Lind.	2	B				2	-	FB
2583	<i>Epilobium angustifolium</i> L.	2		Hm	L		3	-	EP
2591	<i>Epilobium hirsutum</i> L.	4		Hm	1		4-5	-	MJ-ON
2589	<i>Epilobium lanceolatum</i> Seb. et Mauri	4 ²		Hm	L		3	-	EP
2587	<i>Epilobium montanum</i> L.	3		Hm	1		3-4	-	ON-QF
2594	<i>Epilobium obscurum</i> Schreber	4		Hm	1		4-5	-	PH
2590	<i>Epilobium parviflorum</i> Schreber	4		Hm	L		4 X 5	-	PH
2593 p	<i>Epilobium tetragonum</i> L. ssp. <i>tetragonum</i>	4		Hm	1		4	-	MC
933	<i>Epipactis atrorubens</i> (Hoffm.) Schult.	3		G	1	T	1-2	-	OR
935	<i>Epipactis helleborine</i> (L.) Crantz	4		G	1		3	-	FG
932	<i>Epipactis microphylla</i> (Ehrh.) Swartz	5 ⁴		G	1		1 X 3	-	QF-FB
11	<i>Equisetum arvense</i> L.	2		G			4-5	-	ON-(FG)
18	<i>Equisetum hiemale</i> L.	2		G			3 X 5	-	FG
2948	<i>Erica cinerea</i> L.	5 ¹		Ch	L		2	-	CU
2952	<i>Erica scoparia</i> L.	5 ²		Phn	1	t	3 X 4	-	CU
2946	<i>Erica tetralix</i> L.	5 ¹		Ch	L		4-5	-	OS
2953	<i>Erica vagans</i> L.	5 ¹		Ch	L	t	3 X 4	-	CU
2738	<i>Euonymus europaeus</i> L.	3		Phn	1		3	-	PR
3751	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	4		Hm	L		4-5	-	EP
1292	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	4		Hm			3	-	FG
1228	<i>Euphorbia brittingeri</i> Opiz ex. Samp.	5		Hm	L	te	2-3	-	BR

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	ECOLOGIE					SOCIOLOGIE
					lumière	chaleur	humidité	Mor	Moder	Mull calicque
1246	<i>Euphorbia cyparissias</i> L.	53		Hm	L	t	2			FB
1224	<i>Euphorbia dulcis</i> L. ssp. <i>angulata</i> (Jacq.) Rouy	53		Hm			2 X 4			QR-CU
1223	<i>Euphorbia dulcis</i> L. ssp. <i>dulcis</i>	53		Hm	s		3			FG
1220	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	51m		Hm			3			FR
1213	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. et Kit. ex. Willd.	53		Hm-Hl			4-5			QR
B 805	<i>Eurhynchium stockesii</i> (Turn.) B.E.	53	B		s		3-5			QF-AL
B 806	<i>Eurhynchium striatum</i> (Schr.) Schp.	53	B		s		3			FG
F										
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	5		PhM	l		3			FG
373 p	<i>Festuca filiformis</i> Pourret	51		Hm	l		2 X 4			QR-CU
	<i>Festuca hervieri</i> (St-Yves) Patzke	52		Hm	L	T	1-2			BR
371	<i>Festuca heterophylla</i> Imk.	45		Hm			3			FG
2132	<i>Filipendula ulmaria</i> (L.) Maxim.	3		Hm	L		4-5			MJ
2133	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench	4		Hm	L	Te	1 X 3			OR-FB
B 318	<i>Fissidens adianthoides</i> (L.) Hedw.	2	B				4			FG-SH
B 300	<i>Fissidens bryoides</i> (L.) Hedw.	2	B				4			QR
B 319	<i>Fissidens cristatus</i> Wils.	2	B		s		2			OR
B 314	<i>Fissidens tarifolius</i> (L.) Hedw.	2	B		s		3-5			FG
2148	<i>Fragaria vesca</i> L.	2		Hm	l		3			EP
2150	<i>Fragaria viridis</i> Duchesne	3		Hm	l		2-3			OR-QP
2744	<i>Frangula alnus</i> Miller	4		Phn	l	t	3 X 5			QR-AL
3556	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	4		PhM	l		3-4			QF
B 241	<i>Frullania tamarisci</i> (L.) Dum.	2	B		l		2-3			

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	lumière	chaleur	humidité	Mor	Moder	Mull	Mull calcaire	SOCIOLOGIE
978	<i>Himantoglossum hircinum</i> (L.) Spreng.	52		G	L	t	2			-	-	BR-OR
2487	<i>Helleborus corosol</i> L.	53		Ch	L	te	2-3			-	-	BR
276	<i>Holeus lanatus</i> L.	5		Hm	L		4		-			AR-MJ
277	<i>Holeus mollis</i> L.	5		Hm			2 X 3	-	-			QR-CU
B 708	<i>Hookeria lucens</i> (L.) Sm.	5	B					-				AL
1072	<i>Humulus lupulus</i> L.	3		Hm1	L	t	3 X 4			-		U
2758	<i>Hydrocotyle vulgaris</i> L.	4		Hm-H1			4 X 5			-		SH
P 859	<i>Hylocomium proliiferum</i> (L.) Lindb.	2	B				2-3	-	-	-	-	QF-CU
B 849	<i>Hylocomium flagellare</i> B. et S.	51	B				4-5		-			
1997	<i>Hypericum androsaemum</i> L.	52		Hm	1		3-4		-			FG
1994	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	3		Hm	L		2-4		-			EP
1982	<i>Hypericum humifusum</i> L.	51		Ch	1		4 X 5		-			IN
1987	<i>Hypericum montanum</i> L.	4		Hm	L	T	1-2		-			OR-QP
1983	<i>Hypericum perforatum</i> L.	4		Hm	L		2-3		-			ON-FB
1988	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	51		Hm	1		2-4	-				QR
1981	<i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	4		Hm			4 X 5			-		PH
B 840	<i>Hypnum cupressiforme</i> L.	1		Hm	L		2-4	-				FR-CU
4093	<i>Hypochoeris maculata</i> L.	5	B	Hm	L	T	2 X 3		-			FB-OR
4096	<i>Hypochoeris radicata</i> L.	4		Hm			2-4					AR
I 2737	<i>Ilex aquifolium</i> L.	52		Phn			3-4		-			FR
2734	<i>Impatiens noli-tangere</i> L.	3		Th	s		4-5		-			U
3818	<i>Inula conyza</i> D.C.	4		Hm	L	t	2 X 4			-		OR
3824	<i>Inula salicina</i> L.	3		Hm	L	t	2 X 4			-		FB-MJ
904	<i>Iris foetidissima</i> L.	42		G	L	t	2			-		QF-OR

905	<i>Iris pseudacorus</i> L.	4		G	L				5		PH
1538	<i>Isopyrum thalictroides</i> L.	55		Hm	s				3-5		FG
B 844	<i>Isoterygium depressum</i> (Bruch.) Mitt.	51	B		s						FR
B 845	<i>Isoterygium elegans</i> (Hook.) Lindb.	2	B						2-4		
B 695	<i>Isothehium myosuroides</i> (Dill.) Brid.	2	B						2-4		
B 694	<i>Isothehium viviparum</i> (Neck.) Lindb.	5	B								
J											
242	<i>Juglans regia</i> L.	54		PhM	L				3		FG
682	<i>Juncus conglomeratus</i> L.	4		Hm					3 X 5		MJ
681	<i>Juncus effusus</i> L.	1		Hm-H1					4-5		MJ
680	<i>Juncus inflexus</i> L.	4		Hm					4-5		PL
686	<i>Juncus tenuis</i> Willd.	2		Hm					3-5		PL
92	<i>Juniperus communis</i> L.	2		phn	L				2-4		(PR)
K											
3367	<i>Knautia arvensis</i> (L.) Coulter	3		Hm	L				2-3		AR
288	<i>Koeleria cristata</i> (L.) Pers. s.l.	2		Hm	L				2		FB
283	<i>Koeleria vallesiana</i> (Honckeny) Gaudin	53		Hm	L				1-2		BR
L											
2264	<i>Laburnum anagyroides</i> Medic.	53		Phm	L				2		QP
3422	<i>Lamium galeobdolon</i> (L.) Nath.	3		Hm	s				3		FG
4081	<i>Lapsana communis</i> L.	4		Th	l				3-4		ON
3300	<i>Lathraea clandestina</i> L.	5		G	s				4		QF
3301	<i>Lathraea squamaria</i> L.	3		G	s				3 X 5		QF
2547 p	<i>Lathyrus latifolius</i> L.	54		Hm	L				2		OR
2557	<i>Lathyrus montanus</i> Bernh.	5		Hm					2-3		QR
2554	<i>Lathyrus niger</i> (L.) Bernh.	44		Hm	l				2		OR-QP
2555	<i>Lathyrus pannonicus</i> (Jacq.) Garcke	55		Hm	L				2-4		OR
2547 p	<i>Lathyrus sylvestris</i> L.	4		Hm	L				2-3		OR
B 853	<i>Loeskeobryum brevirostre</i> (Ehrh.) Fleisch.	2	B		s				3-4		FR
B 388	<i>Leucobryum glaucum</i> (L.) Schimp.	2	B		l				1-4		FR
3564	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	4		Phn	l				1-3		PR
928	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw.	53		G	L				1-2		OR-QP
2630	<i>Linum catharticum</i> L.	4		Th					3 X 4		MJ-AR
2631	<i>Linum tenuifolium</i> L.	4		Hù	L				1-2		BR

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	lumière	chaleur	humidité	Mor	Moder	Mull	Mull calcique	SOCIOLOGIE
938	<i>Listera ovata</i> (L.) R. Br.	3		G	1	te	3 X 5			-	-	FB-FG
3082	<i>Lithospermum officinale</i> L.	3		Hm	L		3-4			-	-	OR
3744	<i>Lobelia urens</i> L.	51		Hm	1		3 X 5	-	-			CU
3627	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	4		Phl	1		2-4	-	-			FR
3621	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	4		Phn	1	t	2-3					QF
B 124	<i>Lophochloa bidentata</i> (L.) Dum.	2	B				4-5				-	AL-FR
2414	<i>Lotus corniculatus</i> L.	4		Hm	L	t	2-3					AR
716 p	<i>Lotus uliginosus</i> Schkurhr.	4		Hm	1		3 X 5			-	-	MJ-U
708	<i>Luzula campestris</i> (L.) D.C.	2		Hm	1		3			-	-	CU-N
716 p	<i>Luzula forsteri</i> (Smith) D.C.	4		Hm	1		2-3			-	-	FR
707	<i>Luzula multiflora</i> (Retz.) Lej.	2		Hm	1		2 X 3			-	-	CU
717	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	2		Hm			3-4	-	-	-	-	FR
1436	<i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaudin	2		Hm			3			-	-	FG
3474	<i>Lychnis flos-cuculi</i> L.	52		Hm			3 X 5			-	-	MJ-AR
2994	<i>Lycopus europaeus</i> L.	3		Hm-H1	L		4-5			-	-	PH
2993	<i>Lysimachia nemorum</i> L.	4		Hm			4-5			-	-	U
2995	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	52		Ch			4-5			-	-	MJ-PL
2568	<i>Lysimachia vulgaris</i> L.	5		Hm			4 X 5			-	-	MJ
	<i>Lithrum salicaria</i> L.	2		Hm-H1	L		3 X 5			-	-	PH-MJ
M 2213	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Miller	5		Phm			3-4			-	-	PR
2312 p	<i>Medicago falcata</i> L.	3		Hm	L	Te	2			-	-	OR
2308	<i>Medicago lupulina</i> L.	4		Th	L	Te	2			-	-	BR
2317	<i>Medicago minima</i> (L.) Grubb.	4		Th	L	Te	1-2			-	-	FB-SC

3251	<i>Melampyrum arvense</i> L.	Th	L	Te	2-3	-	-	SL-OR
3250	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	Th	L	Te	X 2	-	-	OR-QP
3254	<i>Melampyrum pratense</i> L.	Th	1		2-4	-	-	FR
334	<i>Melica uniflora</i> Retz.	Hm			3	-	-	FG
3403	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	Hm	1	T	2-3	-	-	QP-OR
3478	<i>Mentha arvensis</i> L.	Hm			4-5	-	-	MJ
1200	<i>Mercurialis perennis</i> L.	G	1	t	3	-	-	FG
2208	<i>Mespilus germanica</i> L.	Phn			2	-	-	PR
232	<i>Milium effusum</i> L.	Hm	s		3	-	-	FG
B 638	<i>Mnium affine</i> Bland.				4	-	-	SH-QF
B 645	<i>Mnium hornum</i> Hedw.				4-5	-	-	AL-FR
B 636	<i>Mnium undulatum</i> (L.) Weis.		s		4-5	-	-	AL-FG
1353	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	Th	s		4	-	-	FG
329	<i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	Hm	1		4 X 5	-	-	MJ
2923 p	<i>Monotropa hypopitys</i> L. ssp. <i>hypopitys</i>	G			2-3	-	-	FR
4145	<i>Mycelis muralis</i> (L.) Reich.	Hm			3-4	-	-	EP-QF
3096	<i>Myosotis arvensis</i> (L.) Hill.	Th	L		3-4	-	-	EP-CH
3088 p	<i>Myosotis lara</i> Lehm. ssp. <i>caespitosa</i> (Sc.) Hyl. ex Nh.	Hm-HI	1	t	4-5	-	-	PH
3095	<i>Myosotis ramosissima</i> Rochel ex. Schultes	Th			2	-	-	SC-FB
3088 p	<i>Myosotis scorpioides</i> L.	Hm-HI	1		3 X 5	-	-	MJ
3091	<i>Myosotis sylvatica</i> Ehrh. ex Hoffm.	Hm			3-4	-	-	EP-FG
1404	<i>Myosoton aquaticum</i> (L.) Moench	Hm	1		4-5	-	-	ON
N								
870	<i>Narcissus pseudonarcissus</i> L.	G	Lv	tv	2-3	-	-	FG
B 702	<i>Neckera complanata</i> (L.) Hüb.				4-5	-	-	
937	<i>Neottia nidus-avis</i> (L.) L.C.M. Rich.	G			2-3	-	-	FG
O								
2299	<i>Ononis natatrix</i> L.	Ch	L	T	2-3	-	-	FB
2293	<i>Ononis spinosa</i> L. s.l.	Ch	L		2	-	-	FB-ON
989	<i>Opahrys insectifera</i> L.	G	L	t	1-3	-	-	BR-OR
968	<i>Orechis mascula</i> L.	G	L	t	2-3	-	-	QF-AR
955	<i>Orechis militaris</i> L.	G	L	T	1-3	-	-	BR
954	<i>Orechis purpurea</i> Huds.	G	L	T	2-3	-	-	OR-QP
956	<i>Orechis simia</i> Lmk.	G	L	T	2	-	-	BR
952	<i>Orechis ustulata</i> L.	G	L	t	2-3	-	-	BR
3469	<i>Origanum vulgare</i> L.	Hm	L	te	2-3	-	-	OR

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	lumière	chaleur	humidité	I. COLOGIE				Sociologie
								Mor	Moder	Mull	Mull calcaïque	
828	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	42		G	l		3			-	-	FG
826	<i>Ornithogalum umbellatum</i> L.	4		G			3-4			-	-	CH-ON
3314	<i>Orobanchë gracilis</i> Smith.	52		G			2			-	-	BR
3318	<i>Orobanchë pedunculata</i> Duby.	42		G			3-4			-	-	PR
38	<i>Osmunda regalis</i> L.	1		Hm	l		4-5			-	-	AL
2646	<i>Oxalis acetosella</i> L.	3		Hm	s		4-5			-	-	FG
B 812	<i>Oxyrrhynchium praelongum</i> (Hedw.) Warnst.	3	B	Hm						-	-	QF
B 810	<i>Oxyrrhynchium swartzii</i> (Turn.) Warnst.	3	B							-	-	FG-FB
P												
844	<i>Paris quadrifolia</i> L.	3		G	s		3-4			-	-	FG
B 56	<i>Pellia epiphylla</i> (L.) Corda.	2	B				4-5			-	-	
L 770 p	<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd. var. <i>canina</i> Lamb.	1	Lc		s		4			-	-	FB
L 770 p	<i>Peltigera canina</i> (L.) Willd. var. <i>rufescens</i> Mudd.	1	Lc		s		2			-	-	SC
2899	<i>Peucedanum alpestre</i> L.	5		Hm	L		3			-	-	OR
2891	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lapeyr.	44		Hm	L	Te	2-3			-	-	OR
2896	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	51		Hm	L	T	2 X 4			-	-	QR
49	<i>Phyllitis scolopendrium</i> (L.) Newman.	4		Hm	l		4*			-	-	(FG)
3733	<i>Phyteuma spicatum</i> L. var. <i>alpinum</i> Böll.	5		Hm	s		3-4			-	-	FG
3730 p	<i>Phyteuma tenerum</i> R. Schulz.	51		Hm	L	t	2 X 4			-	-	BR
2838	<i>Pimpinella major</i> (L.) Huds.	3		Hm	l		3-4			-	-	AR
2839	<i>Pimpinella saxifraga</i> L.	3		Hm	l		2			-	-	FB
B 177	<i>Plagiochila asplenoides</i> (L.) Dum.	2	B	Hm	L	Te	4-5			-	-	FG
B 826 p	<i>Plagiothecium succulentum</i> (Wils.) Lindb.	2	B							-	-	
B 826 p	<i>Plagiothecium sylvaticum</i> (Huds.) B.E.	2	B							-	-	

* = hygrométrie élevée de l'air.

ESPECES										GROUPE phytogéographique					Type morphologique					Forme biologique					lumière					chaleur					humidité					FECOLOGIE					SOCIOLOGIE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
										Groupe					Type					Forme																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Q										5					PHM																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

2136	<i>Rubus caesius</i> L.	Ch	L		4-5	ON-FG
2135	<i>Rubus fruticosus</i> L. coll.	Phn-Ch	L		3	FR-PR
1094	<i>Rubus idaeus</i> L.	Phn	L		3-4	EP-FG
1107	<i>Rumex acetosa</i> L.	Hm	L		4-5	AR-MJ
1109	<i>Rumex conglomeratus</i> Murray	Hm	L		3-5	EP-PL
1106	<i>Rumex obtusifolius</i> L.	Hm	L		3	EP-ON
1092	<i>Rumex sanguineus</i> L.	Hm	L		3 X 5	EP-FG
856	<i>Rumex thyrsiflorus</i> Fingerh.	Hm	L		2 X 3	AR-ON
	<i>Ruscus aculeatus</i> L.	Ch	L		3	QF
S						
1038	<i>Salix aurita</i> L.	Phn	L		4-5	AL
1039	<i>Salix caprea</i> L.	Phn	L		3-4	EP-QF
1037	<i>Salix cinerea</i> L.	Phn	L		4-5	AL-U
1034	<i>Salix viminalis</i> L.	Phn	L		4-5	SL-AL
3447	<i>Salvia pratensis</i> L.	Hm	L	te	2-3	FB
3633	<i>Sambucus nigra</i> L.	Phn	L		3	EP
3631	<i>Sambucus racemosa</i> L.	Phn	L		3	EP
2130	<i>Sanguisorba minor</i> Scop.	Hm	L	te	2	FB
2131	<i>Sanguisorba officinalis</i> L.	Hm	L		3 X 4	MJ
2759	<i>Sanicula europaea</i> L.	Hm	s		3-4	FG
3683	<i>Scabiosa columbata</i> L.	Hm	L		2-3	BR
B 144	<i>Scapania nemorosa</i> (L.) Dum.	G	lv	tv	4-5	QF
810	<i>Scilla bifolia</i> L.	H1	L		3	MJ
577	<i>Scirpus sylvaticus</i> L.	Hm	L	1	4-5	OR
4121	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Hm	L		2 X 3	MJ-(QF)
4117	<i>Scorzonera hispanica</i> L.	Hm	L		3 X 5	FG
3196	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	Hm	L		3-5	PH-AL
3375	<i>Scutellaria palustris</i> L.	Hm	L		4-5	MJ-AL
3374	<i>Scutellaria minor</i> Huds.	Hm	L		4-5	ON
2009	<i>Sedum cepaea</i> L.	Ch	L		3-4	EP
2028	<i>Sedum telephium</i> L. ssp. <i>telephium</i>	Hm	L		3-5	MJ-QR
2876	<i>Selinum carvifolia</i> L.	Hm	L	te	3 X 5	FB
3947	<i>Senecio erucifolius</i> L.	Hm	L		2 X 3	AR-FB
3948 p	<i>Senecio jacobaea</i> L.	Hm	L		3 X 4	EP
3956	<i>Senecio nemorosus</i> L. ssp. <i>palustris</i> (Gmel.) Celak.	Hm	L		3	EP
3942	<i>Senecio sylvaticus</i> L.	Th	L		3	EP

ESPECES		Groupe phytogéographique	Type morphologique	Forme biologique	lumière	chaleur	humidité	Mor	Mull	Mull calcaïque	SOCIOLOGIE
4039	<i>Seseli annuum</i> L.	4		Hm	1	t	2 X 4	-	-	-	MJ-FR
2850	<i>Seseli annuum</i> L.	54		Hm	L	te	2	-	-	-	FB-OR
2853	<i>Seseli annuum</i> (L.) Koch.	4		Hm	L	Te	2	-	-	-	OR-BR
2849	<i>Seseli annuum</i> L.	52		Hm	L	te	2	-	-	-	BR
152	<i>Seseli annuum</i> L.	5		Hm	1	Te	2-3	-	-	-	FB-OR
279	<i>Sieglingia decumbens</i> (L.) Bernh.	4		Hm	L		2-3	-	-	-	CU
2870	<i>Silene silaus</i> Schin et Thell.	3		Hm	L	t	2-4	-	-	-	MJ
1447	<i>Silene alba</i> (Miller) Krause	4		Hm	L	t	2	-	-	-	ON
1475	<i>Silene alba</i> L.	4		Hm	L	T	2	-	-	-	OR-QP
1451	<i>Silene alba</i> L.	4		Hm	L		3 X 4	-	-	-	AR-ON
3144	<i>Solanum dulcamara</i> L.	4		Phnl	1		3 X 5	-	-	-	AL-EP
3754	<i>Solidago</i> L.	2 ^m		Hm	1		2-4	-	-	-	FR-EP
2216	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	4 ^m		Phm	L	T	2	-	-	-	QF
2220	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	4 ^m		Phm	L		2-3	-	-	-	EP-QR
2219	<i>Sorbus aucuparia</i> L.	52		Phm	L	T	2	-	-	-	QP
2218	<i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers.	52		Phm	L	T	2	-	-	-	QP
2214	<i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers.	4		Phm	L	t	2-4	-	-	-	FR
2248	<i>Spartium</i> L.	53		Phn	L	T	2	-	-	-	OR-QP
B 257	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	2	B				X 5				LT-SH
B 268	<i>Sphagnum auriculatum</i> Schimp.	1	B				X 5				LT-SH
B 270	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy et Molk. (<i>amblyphyllum</i> Russ.)	1	B				5				OS-MJ
B 256	<i>Sphagnum flexuosum</i> Dozy et Molk. (<i>amblyphyllum</i> Russ.)	2	B				X 5				LT-SH
B 266bis	<i>Sphagnum molle</i> Sull.	2	B				4 X 5				OS-SH
B 266	<i>Sphagnum nemoreum</i> Scop.	1	B				X 5				OS

ESPECES										phytogéographique				Type morphologique	Forme biologique	lumière	chaleur	humidité				ECOLOGIE				SOCIOLOGIE			
										Groupe	Type																		
V	2942	<i>Vaccinium myrtillus</i> L.	3 ^m						Ch																			FR	
	3652	<i>Valeriana officinalis</i> L.	3						Hm																			MJ	
	3227	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	4						Ch																			FR	
	3215	<i>Veronica hederifolia</i> L.	4						Th																			SL-FG	
	3228	<i>Veronica montana</i> L.	4 ^m						Ch																			FG	
	3230	<i>Veronica officinalis</i> L.	2						Ch																			FR	
	3222	<i>Veronica scutellata</i> L.	3						Hm-H1																			LT	
	3244	<i>Veronica spicata</i> L.	3						Ch																			FB-OR	
	3232	<i>Veronica teucrium</i> L.	44						Hm								Te											OR	
	3618	<i>Viburnum lantana</i> L.	44						Phn								Te											PR	
	3617	<i>Viburnum opulus</i> L.	4						Phn								t											PR	
	2509	<i>Vicia cracca</i> L.	3						Hm																			MJ-AR	
	2525	<i>Vicia sepium</i> L.	3						Hm																			FG	
	3547	<i>Vinca minor</i> L.	54						Ch																			QF	
	3552	<i>Vincetoxicum hircundinaria</i> Medic.	4						Hm								t											OR	
	1950	<i>Viola alba</i> Besser	44						Hm								t											ON-(OR)	
	1958	<i>Viola canina</i> L.	3						Hm								t											CU-N	
	1945	<i>Viola hirta</i> L.	3						Hm								t											OR	
	1957	<i>Viola reichenbachiana</i> Jord. ex Boreau	4						Hm																			FG	
	1956	<i>Viola riviniana</i> Reichenb.	4						Hm																			FR	





Figure 268 - Forêts hygrophiles:analyse selon Czekanowski.



Fig. 269 - Typologie des forêts hygrophiles: position des relevés dans le plan des axes 1 et 2 de l'analyse.






Fig. 272 - Typologie des forêts hygrophiles: position des relevés dans le plan des axes 1 et 4 de l'analyse.




Fig. 273 - Typologie des forêts hygrophiles: position des relevés dans le plan des axes 2 et 4 de l'analyse.

TABEAU 102
FORETS HYGROPHILES

	Aulnaie du plateau de Prémery												Type morphologique		Ecologie					Sociologie	Groupe phytogéographique					
	61	60	161	103	1090	1091	1612	1603	2032	2029	2030	2031	129	2026	2028	2025	401	426	lumière			chaleur	humidité	mor	moder	mul calique
FUTAIE																										
Recouvrement %:	.75	.35	.	.15	.	.	.	.	.	.	.	5	5	.	5	.	10	5								
3556 <i>Fraxinus excelsior</i> L.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		3-4	-	-	-	QF	4
1007 <i>Carpinus betulus</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		2-4	-	-	-	-	FG	5
1005 <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	22	2	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		4-5	-	-	-	-	AL-FG	4
1012 <i>Quercus robur</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	Ph L		3-4	-	-	-	-	FR	4
1052 <i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	Ph L		4	-	-	-	-	FR	4
1001 <i>Betula pendula</i> Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	Ph L		2 X 4	-	-	-	-	FR	3
1013 <i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	Ph L		3	-	-	-	-	FR	5
TAILLIS																										
Recouvrement %:	50	50	60	35	.	.	15	50	35	60	50	30	.	10	20	10	25	15								
1062 <i>Ulmus minor</i> Roth	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		2-4	t	-	-	-	QF	4
1059 <i>Salix capraea</i> L.	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		3-4	-	-	-	EP-QF	3	
3556 <i>Fraxinus excelsior</i> L.	2	+	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		3-4	-	-	-	QF	4	
1007 <i>Carpinus betulus</i> L.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		2-4	-	-	-	FG	5	
1009 <i>Corylus avellana</i> L.	12	.	.	.	.	.	22	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		3	-	-	-	QF	3	
1005 <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	22	1	3	2	.	.	12	12	22	22	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		4-5	-	-	-	AL-FG	4	
1052 <i>Populus tremula</i> L.	1	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph 1		4	-	-	-	FR	4	
1012 <i>Quercus robur</i> L.	.	.	.	+	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph L		3-4	-	-	-	FR	5	
2214 <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	*	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph L		2-4	t	-	-	-	FR	4

TABEAU 102 - FORETS HYGROPHILES (suite)

	Aulnaie du plateau de Prémery	Type morphologique	Forme biologique	Ecologie					Sociologie	Groupe phytogéographique	
				lumière	chaleur	humidité	mor	moder			mul
ARBUSTES (fin)											
2737 <i>Ilex aquifolium</i> L.	.	.	Ph						FR	52	
2213 <i>Malus sylvestris</i> Miller	.	.	Ph						PR	5	
STRATE INFÉRIEURE DE VEGETATION											
Recouvrement %:											
85807080508025657075504065999999570											
Espèces communes											
à l'ALNION et à l'ALNO-PADION											
3144 <i>Solanum dulcamara</i> L.	+	1	Ch1	1	3	X	5		AL-FG	4	
1005 <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertn.	(.)	(.)	Ch	1		4	5		AL-FG	4	
1052 <i>Populus tremula</i> L.	(.)	.	Ch			4			FR	4	
80p <i>Dryopteris carthusiana</i> (Vill.) H.P. Fuchs	+	+	Hm	s	2	4			FG-AL	2	
1037 <i>Salix cinerea</i> L.	.	(.)	Ch	1		4	5		AL-QF	3	
Caractéristiques et différentielles											
de l'ALNO-PADION											
1062 <i>Ulmus minor</i> Miller	(.)	.	Ch	1	t	2	4		QF	4	
3556 <i>Fraxinus excelsior</i> L.	(.)	1	Ch	1		3	4		QF	4	
3439 <i>Stachys sylvatica</i> L.	+	+	Hm			3	5		FG	4	
636 <i>Mnium undulatum</i> L. Weis.	2212	.		s		4	5		(FG)	54	
938 <i>Listera ovata</i> (.) Br.	+	+	G			3	5		(FG)	3	
550 <i>Carex pendula</i> Huds.	2222	.	Hm	1		4	5		FG	4	

TABLEAU 102 - FORETS HYGROPHILES (suite).

Espèces des MOLINIETALIA et des MOLINIO-JUNCETEA (suite)	Aulnaie du plateau de Prémery										Type morphologique	Forme biologique				Ecologie				Sociologie	Groupe phytogéographique						
	61	60	161	103	1090	1091	1612	1603	2032	2029		2030	2031	129	2026	2028	2025	401	426			lumière	chaleur	humidité	mor	moder	mul
244 <i>Deschampsia cespitosa</i> (L.) Beauv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	4-5	-	-	-	-	MJ-FG	1
B 686 <i>Climacium dendroides</i> (Dill.) W. et M.	.	.	.	.	12	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		4-5	-	-	-	-	MJ	3
681 <i>Juncus effusus</i> L.	.	.	22	12	12	12	+	.	.	12	.	+	.	.	.	.	.	.	Hm	L	4 X 5	-	-	-	-	MOL	3
971 <i>Dactylorhiza maculata</i> (L.) Soó	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	L	3 X 5	-	-	-	-	MOL	4
3663 <i>Succisa pratensis</i> Moench	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	2 X 4	-	-	-	-	MJ-N	4
2414 <i>Lotus uliginosus</i> Schkuhr	.	.	.	.	12	12	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	Hm	1	3 X 5	-	-	-	-	MOL	4
329 <i>Molinia caerulea</i> (L.) Moench	.	.	.	.	.	1222	+	2232	2232	2232	2232	2232	2232	2232	2232	2232	2232	2232	Hm	1	4 X 5	-	-	-	-	MOL	2
B 650 <i>Aulacomnium palustre</i> (L.) Schw.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		4-5	-	-	-	-	MJ-LT	1
Espèces des SCHEUCHZERIO-CARICETEA																											
486 <i>Carex echinata</i> Murray	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		4-5	-	-	-	-	SH	2
488 <i>Carex ovalis</i> Good.	.	.	.	12	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3 X 5	-	-	-	-	SH-N	4
212 <i>Agrostis canina</i> L.	.	.	.	3344	12	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		4-5	-	-	-	-	SH	3
B 256 <i>Sphagnum inundatum</i> Russ.	.	.	.	4412	12	12	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	B		X 5	-	-	-	-	SH-LT	2
B 268 <i>Sphagnum cuspidatum</i> Hoffm.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		X 5	-	-	-	-	SH-LT	1
B 380 <i>Dicranum bonjeani</i> de Not.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		4-5	-	-	-	-	SH-OS	2
Espèces des PHRAGMITETEA																											
1981 <i>Hypericum tetrapterum</i> Fries	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	4 X 5	-	-	-	-	PH	4
2590 <i>Epilobium parviflorum</i> Schreber	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	4 X 5	-	-	-	-	PH	4
2594 <i>Epilobium obscurum</i> Schreber	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	4-5	-	-	-	-	PH	4
538 <i>Carex vesicaria</i> L.	.	2222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	H1	L	5	-	-	-	-	PH	2

TABEAU 102 : FORETS HYGROPHILES (fin).

	Aulnaie du plateau de Prémery	Type morphologique	Forme biologique										Ecologie				Sociologie	Groupe phytogéographique		
			chaleur	humidité	mor	mul	mul calcique	chaleur	lumière											
Espèces des PRUNETALIA																				
2754	<i>Cornus sanguinea</i> L.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	3	
3564	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	4	
920	<i>Tamus communis</i> L.	()	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	4	
2204	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	4	
2738	<i>Euonymus europaeus</i> L.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	3	
3617	<i>Viburnum opulus</i> L.	1	1	()	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	4	
2209	<i>Mespilus germanica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	44	
2213	<i>Malus sylvestris</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	PR	5	
Espèces des QUERCO-FAGETEA																				
1581	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	3	
437	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds. Beauv.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	4	
2205	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	4	
1566	<i>Anemone nemorosa</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	3	
846	<i>Convallaria majalis</i> L.	1	12	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	3	
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	4	
2755	<i>Hedera helix</i> L.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	QF	4	
B 805	<i>Eurhynchium stockesii</i> (Turn.) B.E.	.	.	22	+	+	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	QF-AL	4	
Compagnes																				
Espèces tolérantes																				
	<i>Rubus fruticosus</i> L. coll.	()	()	:	()	+	.	1	3	1	+	.	1	.	1	+	2	.	FR	4
1012	<i>Quercus robur</i> L.	.	()	.	()	+	1	.	.	.	.	.	()	()	.	.	.	.	FR	5

B	721	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) B.E.	.	+	.	.	.	22	1	12	.	+	.	12	12	.	B	3-5	FR-AL	2
B	763	<i>Calliargonella cuspidata</i> (L.) Lske.	.	.	2222	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	4-5	SH-MJ	1
B	749	<i>Drepanocladus uncinatus</i> (Hedw.) Warnst.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	4-5		2
B	817	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (L.) Fleisch.	.	.	.	+	.	12	.	12	.	+	.	12	12	12	B	2-4	FR	2
	3754	<i>Solidago virgaurea</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	Hm	2-4	FR-EP	2
	707	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	Hm	3-4	FR	2
B	840	<i>Hypnum cupressiforme</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	12	12	.	B	2-4	FR-CU	1
B	702	<i>Neckera complanata</i> (L.) Hüb.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	4-5		5
	1013	<i>Quereus petraea</i> Liebl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	3	FR	5
B	859	<i>Hylocomium proliferum</i> (L.) Lindb.	.	.	.	.	.	.	.	22	1222	.	.	22	1222	.	B	2-3	QF-CU	2
B	856	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (L.) Warnst.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	2-4	QF	2
Espèces du Mull-Moder et du Moder																				
	1039	<i>Salix capraea</i> L.	(.)	(.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	3-4	EP-QF	3
	3751	<i>Eupatorium cannabinum</i> L.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	4-5	EP	4
	3631	<i>Sambucus racemosa</i> L.	.	(.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	3	EP	2 ^m
	1623	<i>Ranunculus repens</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	4-5	PL-PH	4
	214	<i>Agrostis stolonifera</i> L.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	3 X 5	PL	2
	2993	<i>Lysimachia nummularia</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	4-5	PL-MJ	3
	1603	<i>Ranunculus flammula</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	4-5	SH	4
	2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	.	1	(.)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	2-4	FR	3
	3222	<i>Veronica scutellata</i> L.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	3-5	LT	4
B	221	<i>Calypogeia fissa</i> (L.) Rad.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	4-5	QF-AL	1
	3359	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	Hm	2-4	QR-OR	5
B	124	<i>Lophochloa bidentata</i> (L.) Dum.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	B	4-5	FR-AL	2
	67	<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	2	AP-QR	3
B	144	<i>Scapania nemorosa</i> (L.) Dum.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	4-5		52
B	355	<i>Campylopus pyriformis</i> (Schl.) Brid.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	B	3-4	FR	
	2737	<i>Ilex aquifolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Ch			
Espèces du Moder-Mor et du Mor																				
	3627	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	.	1	(.)	(.)	.	+	1	.	.	1	.	+	1	.	Ch	2-4	FR	4
B	287	<i>Polytrichum attenuatum</i> Menz	.	12	+	12	.	12	+	12	12	12	.	.	.	.	B	2-4	FR	2
	277	<i>Holcus mollis</i> L.	.	.	12	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	Hm	2 X 3	QR-CU	5
L	1165	<i>Cladonia squamosa</i> (Scop.) Hoffm.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Lc	2-4		1
B	379	<i>Dicranum scoparium</i> (L.) Hedw.	.	.	.	.	.	12	12	.	.	12	.	+	.	.	B	2-4	FR	2
B	388	<i>Leucobryum glaucum</i> (L.) Schimp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	1-4	QR	2
B	649	<i>Aulacomnium androgynum</i> (L.) Schwaegr.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	B		FR	2
	246	<i>Deschampsia flexuosa</i> (L.) Trin.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	12	+	.	.	.	Hm	3	FR	2
L	1175	<i>Cladonia coniocraea</i> (Floerke) Hav.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	Lc			1

TABEAU 103

LOCALISATION DES RELEVES FIGURANT AU TABLEAU 102

- 60 - Forêt domaniale de la Bertrange, aux Champs de la Bertherie, Nord-Est de Raveau - Nièvre.
- 61 - Forêt domaniale de la Bertrange, bois de Berlière, Nord-Est de Raveau - Nièvre.
- 103 - Saint-Saulge - Nièvre.
- 129 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 161 - Etang du Maupas, à l'Est de Saint-Franchy - Nièvre.
- 401 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 426 - Les Grands-Bois, à l'Est de la Grange-Mouton, entre Prémary et Dompierre-sur-Nièvre - Nièvre.
- 1090 - Etang de Villemenant, en Forêt de Guérigny - Nièvre.
- 1091 - Etang de Villemenant, en Forêt de Guérigny - Nièvre.
- 1603 - La Verrerie, près de la Chapelotte - Cher.
- 1612 - Forêt domaniale de Tronçais, dans les Chamignoux - Allier.
- 2025 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 2026 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 2028 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 2029 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 2030 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 2031 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.
- 2032 - Forêt communale de Prémary - Nièvre.

TABEAU 104

SPECTRES PHYTOGEOGRAPHIQUE, BIOLOGIQUE, ECOLOGIQUE
DE LA STRATE INFÉRIEURE DE VEGETATION - AULNAIE de PREMERY

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE			
1	= 35,3 %	41-51	= 0,3 %
2	= 43,8 %	42-52	= 0,3 %
3	= 15,5 %	43-53	=
4	= 4,3 %	44-54	=
5	=	45-55	= 0,3 %
total	= 98,9 %	total	= 0,9 %
TYPE MORPHOLOGIQUE ET FORME BIOLOGIQUE			
Lichens	= 0,3 %	Chamaephytes	= 12,0 %
Pryophytes	= 43,2 %	Hémicryptophytes	= 40,3 %
Ptéridophytes)	= 56,5 %	Géophytes	= 4,2 %
et Phanérophytes)		Thérophytes	= 0,3 %
SPECTRE ECOLOGIQUE: classement des espèces par référence au type d'humus			
Espèces tolérantes	= 10,3 %	Mull-Moder	= 1,3 %
Mull calcique	=	Moder	= 1,7 %
Mull calcique-Mull	=	Moder-Mor	= 41,3 %
Mull	= 0,3 %	Mor	= 45,1 %



Fig. 274 - Systématique des forêts hygrophiles: comparaison des forêts hygrophiles du Bassin Parisien méridional et de forêts décrites dans d'autres régions; - répartition des relevés dans le plan des axes 1 et 2 de l'analyse.

.1 ☆ 2 ☆ 3 ☆ 4 ◆ 5 ★ 6 □ 7 ■ 8 * 9 * 10 * 11 * 12 ○ 13 ● 14 * 15 * 16 * 17 +






Fig. 275 - Systématique des forêts hygrophiles: composition des types typiques du Bassin Parisien méridional et de forêts décrites dans d'autres régions; répartition des types dans les zones 1 et 2 de l'analyse.

1 - Bournérias: aulnaie (Forêt de Beine); - 2 - Braun-Blanquet et Tüxen: 3 - *Osmundo-Salicetum atrocineriae*; - 4 - *Urtica-Fragaria*; - 5 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 6 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 7 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 8 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 9 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 10 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 11 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 12 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 13 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 14 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 15 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*; - 16 - *Urtica-Fragaria-Fraxinetum*.

Fig. 276 - Systématique des forêts hygrophiles: comparaison des forêts hygrophiles du Bassin Parisien méridional et de forêts décrites dans d'autres régions; - répartition des relevés dans le plan des axes 1 et 4 de l'analyse.

1 - Bournérias: aulnaie (Forêt de Beine); - 2 - Braun-Blanquet: *Carici pendulae-Alnetum*; - 3-4 - Braun-Blanquet et Tüxen: 3 - *Osmundo-Salicetum atrocinereae*; - 4 - *Corylo-Fraxinetum*; - 5 - Durin: *Stellario-Alnetum*; - 6 - DuVigneaud: *Alnetum glutinosae-Caricetum ripariae*; - 7-8 - Gehu: 7 - *Alnetum glutinosae*; - 8 - *Carici remotae-Fraxinetum*; - 9 à 11 - Lemée: 9 - *Alneto-Caricetum remotae*; - 10 - *Alneto-Macrophorbietum*; - 11 - *Alneto-Sphagnetum*; - 12 - Malcuit: *Alnetum typicum*; - 13 - Neuhausl et Neuhauslová-Novotná: *Stellario-Alnetum-Chrysosplenietosum*; - 14-15 - Noirfalise, Dethioux et de Zuttere: 14 - *Vaccinio-Betuletum-Alnetosum*; - 15 - *Vaccinio-Betuletum typicum*; - 16 - Vanden Berghen: *Ulmeto-Fraxinetum calciense*; - 17 - individus d'association du Bassin Parisien méridional.





.1 ☆ 2 ☆ 3 ☆ 4 ☆ 5 ◆ 6 ★ 7 □ 8 ■ 9 * 10 * 11 * 12 ○ 13 ● 14 * 15 * 16 * 17 +



Fig. 277 - Systématique des forêts hygrophiles;- représentation partielle de l'analyse, dans le plan des axes 2 et 6.

3 - Braun-Blanquet et Tüxen: *Osmundo-Salicetum atrocinereae*; - 6 - Duvigneaud: *Alnetum glutinosae-Caricetum remotae*; - 7 - Gehu: *Alnetum glutinosae*; - 17 - individus d'association du Bassin Parisien méridional.




Fig. 278 - Systématique des forêts hygrophiles; - Statut du groupement de Prémery.

C A R P I N E N I O N

G R O U P E O R I E N T A L																								Type morphologique Forme biologique	Ecologie						Sociologie	Groupe phytogéographique
Scillo- Carpinetum										Asaro-Tilietum																						
163 972 1042	970	710	752	952	1052	748	446	349	1077	1228	1206	1205	1226	170	1236	1111	1237	1197	1234	169	lumière	chaleur	humidité		mor	moder	mul	calcaïque				
1 S	3 N	7 N	2 E		15 N	10 E	11 E	2 SW	8 S- SE	1 SW	1 N- NW	1 S	15 N- NW	8 N	2 W	2 NW	2 W- NW	15 N	5 NW		Ph	L	tv	3-4	-	-	-	-				
20	10	10	0	5	0	0	30	10	0	10	10	30	10	0	0	10	15	0	15	5	0	10										
				5											10																	
1	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	L	tv	3-4	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph			2-4	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	1	t	3	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	L	t	2-4	-	-	-	-			
.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	12	1	.	.	1	.	.	1	.	.	1	.	Ph	L	T	2	-	-	-	-			
1	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	L		3	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	Ph	1		3	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	1		3	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Ph	L	T	2	-	-	-	-			
35	50	70	80	55	50	60	75	50	75	80	80	75	80	80	70	60	60	80	50	45	80	0										
						65									65																	
.	.	.	1	.	.	.	.	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	L		3-4	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph1	L	t	2-4	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph			4	-	-	-	-			
.	1	.	22	2	2	32	33	22	2	33	22	12	22	22	12	.	12	22	1	.	22	*	Ph			2-4	-	-	-	-		
.	.	12	1	1	1	1	1	1	2	1	1	+	1	1	12	12	12	12	.	12	12	*	Ph	1	t	2-3	-	-	-	-		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph1			1-4	-	-	-	-			
.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	1		2-4	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	12	.	Ph	1		3	-	-	-	-			
.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	Ph	1	t	3	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph			3-4	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	1		3-4	-	-	-	-			
.	12	1	.	+	.	.	.	.	.	1	12	+	+	.	.	1	.	1	.	+	.	Ph	L	t	2-4	-	-	-	-			
+	1	22	.	.	.	12	.	.	1	.	.	2	1	1	1	1	1	1	1	1	.	Ph	L	T	2	-	-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	L	T	2	-	-	-	-			
+	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ph	L		3	-	-	-	-			

TABLEAU 105 - FORETS BASOPHILES :

	G R O U P E O C C I D E N T A L																
	Narcisso- Carpine- tum				Lithospermo-Carpinetum												
	67	700	1994	68	73	1997	74	1919	1024	1917	1064	1049	1025	1952	1916	2002	1951
Taillis (fin)																	
1010 <i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.
2216 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2753 <i>Cornus mas</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2628 <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2218 <i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NIVEAU ARBUSTIF																	
Recouvrement %:	10	15	5	65	70	25	15	10	30	60	70	65	15	15	25	30	50
moyenne				10									30				
Essences des strates arborescentes:																	
1010 <i>Quercus robur</i> L.	.	.	.	.	22	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+
1007 <i>Carpinus betulus</i> L.	1	1	+	22	22	.	.	.	12	.	22	+	.	.	.	+	+
2729 <i>Acer campestre</i> L.	1	.	.	1	22	12	.	+	1	1	+	1	1	+	1	.	.
2229 <i>Prunus avium</i> L.	.	.	+	.	1	.	.	.	+	+	.	+	.	.	.	.	.
3556 <i>Fraxinus excelsior</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1052 <i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1062 <i>Ulmus minor</i> Miller	.	.	+	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.
2214 <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	.	.	+	1	.	.	.	+	.	12	1	1	.	.	.	.
1014 <i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
2219 <i>Sorbus domestica</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1010 <i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.
2216 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.
2628 <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2218 <i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Lianes:																	
3627 <i>Lonicera periclymenum</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2755 <i>Hedera helix</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	1
1643 <i>Clematis vitalba</i> L.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.
920 <i>Tamus communis</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.
Arbustes et arbrisseaux:																	
2204 <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	1	1	+	1	1	12	1	+	1	1	2	1	1	1	1	1	1
3564 <i>Ligustrum vulgare</i> L.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	1	1	1	+	1	1	.	1

MERCURIALO - CARPINENION (suite)

[illegible]

TABLEAU 105 - FORETS BASOPHILES :

[illegible]

G R O U P E O R I E N T A L																							Type morphologique Forme biologique	Ecologie						SOCILOGIE	Groupe phytogéographique																																																																																																														
<i>Scillo- Carpinetum</i>									<i>Asaro-Tilietum</i>																																																																																																																																				
163 972 1042	970 710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169		710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169			710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169	710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169

TABLEAU 105 - FORETS BASOPHILES :

	G R O U P E O C C I D E N T A L																
	Narcisso- Carpine- tum				Lithospermo-Carpinetum												
	67	700	1994	68	73	1997	74	1919	1024	1917	1064	1049	1025	1952	1916	2002	1951
NIVEAU INFERIEUR DE VEGETATION (suite)																	
ENSEMBLE SPECIFIQUE COMMUN AUX FORETS BASOPHILES:																	
828 <i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	1	2	.	+	2	1	3	.	.	.	2	.	.	1	1	1	1
1200 <i>Mercurialis perennis</i> L.	32	.	.	+	.	.	32	.	.	.	22	.	.	.	1	.	.
1615 <i>Ranunculus auricomus</i> L.	2	33	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
968 <i>Orchis mascula</i> L.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
CARACTERISTIQUES ET DIFFERENTIELLES DES GROUPEMENTS:																	
870 <i>Narcissus pseudo-narcissus</i> L.	32	.	.	22	12	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1012 <i>Quercus robur</i> L.	.	1	()	()	1	.	+	.	.	.	()	+	.	()	.	.	()
3083 <i>Buglossoides purpureocaerulea</i> Johnst.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	1	1	+	1	1
1014 <i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	()	.	+	()	+	.	+	+	()	()	()	()
930 <i>Cephalanthera longifolia</i> (Huds.) Fr.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.
847 <i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Druce	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.
3403 <i>Melittis melissophyllum</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1010 <i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	()	()	.	.	.	.
3568 <i>Rubia peregrina</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.
1288 <i>Daphne laureola</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2219 <i>Sorbus domestica</i> L.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2216 <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.
937 <i>Neottia nidus-avis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
2753 <i>Cornus mas</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1266 <i>Asarum europaeum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
810 <i>Scilla bifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
516 <i>Carex digitata</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2628 <i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2218 <i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
929 <i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C.M. Rich.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ESPECES DU CARPINION:																	
1007 <i>Carpinus betulus</i> L.	1	1	()	+	1	()	2	()	()	()	.	+	()	+	()	()	()
2114 <i>Rosa arvensis</i> Huds.	+	1	+	1	2	1	1	1	+	()	+	()	1	+	+	()	+
2154 <i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke	1	.	.	+	1	+	.	1	.	+	.	1	.	1	.	.	1
371 <i>Festuca heterophylla</i> Lmk.	.	.	.	12	43	+	.	1	+	12	.	22	.	1	+	.	.
2229 <i>Prunus avium</i> L.	.	.	()	.	4	.	+	.	()	()	.	()	.	.	.	.	.

MERCURIALO - CARPINENION (suite)

G R O U P E O R I E N T A L																							Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCILOGIE	Groupe phytogéographique
Scillo- Carpinetum									Asaro-Tilietum															lumière	chaleur	humidité	mor moder mull	calcique		
163	972	1042	970	710	752	952	1052	748	446	349	1077	1228	1206	1205	1226	170	1236	1111	1237	1197	1234	169								
.	.	.	1	3	.	2	.	.	.	1	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	1	G	1	3	-	-	FG	42	
.	.	.	2	2	1	.	.	.	22	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	12	.	.	G		3	-	-	FG	4	
.	.	.	.	2	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	Hm	1	3-4	-	-	FG	3	
.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	1	.	+	+	.	.	G	L	t	2-3	-	-	QF-AR	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	Lv	tv	2-3	-	-	FG	51
()	()	.	()	.	.	.	.	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	2-4	-	-	FR	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	Ch	l	T	2-3	-	-	QF-OR	4
()	()	()	.	.	.	()	.	.	()	()	.	()	()	()	+	()	()	+	+	()	()	1	Ch	L	T	2	-	-	QP	54
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	G	L	Te	2	-	-	QF	4
.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	1	1	1	+	1	G	l	T	1	-	-	QP-OR	4
.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	+	1	.	1	1	1	2	Hm	l	T	2-3	-	-	QP	54	
.	.	.	.	.	.	.	()	()	.	.	.	1	1	()	()	.	.	+	()	()	()	Ch	l		3	-	-	FG	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	+	+	.	+	+	1	1	1	1	Ch	l	T	2	-	-	QP	52
.	.	.	.	.	.	()	()	()	.	()	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	()	Ch	t	t	2	-	-	QF	52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	Ch	L	T	2	-	-	QP	52
.	.	.	.	()	.	()	.	.	.	()	()	()	.	.	()	.	()	.	.	.	()	Ch	L	T	2	-	-	QF	43	
.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	1	+	1	.	.	.	.	1	1	.	G		2-3	-	-	FG	3	
.	.	.	()	()	()	.	.	()	.	.	()	()	()	()	.	()	()	+	()	()	1	Ch	l	T	1-2	-	-	PR	44	
.	.	.	2	22	.	.	.	.	.	.	.	+	12	+	.	.	.	1	.	12	+	.	G	s	3-4	-	-	FG	44	
.	.	.	+	3	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	12	.	G	lv	tv	3	-	-	QF	44
.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	1	1	+	+	12	.	.	Hm			2	-	-	QF	2	
.	.	.	.	.	.	()	()	.	.	.	.	1	1	()	+	()	()	.	.	+	.	Ch			3	-	-	FG	44	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	()	()	.	()	.	()	.	()	.	Ch	L	T	2	-	-	FG	52	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	+	.	.	.	.	.	1	.	.	G	L	Te	2	-	-	QF	3
.	()	.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	.	1	()	()	.	()	()	Ch			2-4	-	-	FG	55	
()	1	+	1	.	1	()	1	.	+	()	1	()	1	1	.	()	1	1	1	.	1	()	Ch		2-3	-	-	FG	5	
.	.	.	1	.	1	.	+	.	.	1	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	Hm		3	-	-	FG	51	
.	.	.	+	22	.	+	.	.	.	12	12	12	12	1	.	.	12	.	12	.	12	12	Hm		3	-	-	FG	45	
.	.	()	.	.	.	()	+	.	.	.	+	1	.	()	.	()	.	+	.	()	.	.	Ch	1	t	3	-	-	FG	4

MERCURIALO - CARPINENION (suite)

G R O U P E O R I E N T A L																							Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCILOGIE	Groupe phytogéographique	
<i>Scillo- Carpinetum</i>								<i>Asaro-Tilietum</i>																lumière	chaleur	humidité	mor moder	mull mull			calcaie
163	972	1042	970	710	752	952	1052	748	446	349	1077	1228	1206	1205	1226	170	1236	1111	1237	1197	1234	169									
. 1 2	2	1 +	2	1 1	2	1	1 1	2	1	. 1	. .	. 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	. .	. .	+	.	G			3		-	FG	4		
. . .	2	. +	1	1 1	.	+	. .	.	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	. .	. .	.	+	Hm		3		-	FG	4			
+ . .	. 1	. +	1	12	.	1	12 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	1 1	. .	. .	. .	.	.	Hm		3-4		-	FG	2			
. . .	2 22	1 .	. .	.	+	.	. .	.	.	. .	. .	. .	1 1	1 1	. .	. .	+	. .	. .	.	.	Hm	s	3		-	FG	3			
. . .	. .	. .	. .	. .	.	1	12 +	. .	12	. .	12	. .	12	. .	12	. .	12	12	12	12	12	B	s	3-5		-	FG	2			
. . .	. 1	. .	. .	. .	1	1	. +	. .	+	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	+	Hm		3		-	FG	4			
+ 2 .	2 .	. +	. .	.	1	+	. 1	.	.	+	. 1	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	Hm		3-4		-	FG	3			
. . .	. .	. .	. .	. .	.	. .	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	.	.	Hm	s	3-4		-	FG	4			
. . .	. .	. .	. .	. .	.	. .	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1	.	+	Hm	s	3		-	FG	5			
. . .	. .	. .	. .	. .	.	. .	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	+	.	Hm	l	3-4		-	FG-EP	4			
. 1 1	. .	. .	. .	. .	.	+	+	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	.	G	L	3		-	FG	4			
. + .	1 .	. .	. .	. .	1	.	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	.	G		3		-	FG	3			
. . .	. 1	. .	. .	. .	.	. .	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	.	B		4		-	FG	2			
. . .	1 +	. .	. .	. .	.	. .	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	.	Hm		3		-	FG	4			
. . .	12 32	. .	. .	. .	.	. .	. .	.	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	.	B		4		-	FG	2			
. . .	. .	. .	. .	1 .	.	. .	. .	12	.	. .	. .	12	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	.	G	s	3-4		-	FG	3			
+ 1 .	1 1 +	+ +	+ +	1 .	.	+	. .	. .	1 +	. .	+	. .	+	1 .	. .	1 1	1 1	. .	1 1	1 1	1 1	Hm	l	3		-	FG	3			
1 12 12	. 12 .	22 22	12 33	12	. .	12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	. 12 12	B		3		-	FG	3			
. . .	. . 1	1 1	. . 1	. . 1	.	. .	12 1 1	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	.	Hm	s	3		-	FG	2			
. . .	2 22	1 1	. .	. .	.	1 1	12 1 12	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	1 1 1	Hm		3		-	FG	4			
. . .	1 . 1	1 1	. .	. .	.	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	. .	1 .	1 .	. .	. .	.	Hm		3		-	FG	5			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Hm		3		-	FG	5 th			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Hm		3		-	FG	5 th			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Ch1	L	2-4		-	PR	4			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Ch	L	3		-	PR	4			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Ch		2-4		-	PR	4			
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Ch	L	2		-	PR	4			
+ . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	.	Ch	L	1-2		-	PR	44			

TABLEAU 105 - FORETS BASOPHILES :

	G R O U P E O C C I D E N T A L																
	Narcisso- Carpine- tum				Lithospermo-Carpinetum												
	67	700	1994	68	73	1997	74	1919	1024	1917	1064	1049	1025	1952	1916	2002	1951
NIVEAU INFÉRIEUR DE VÉGÉTATION																	
ESPECES DES PRUNETALIA (fin)																	
Espèces du Mull et autres espèces																	
2204 <i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	+	+	()	1	1	()	+	()	()	()	()	()	()	+	+	()	()
3564 <i>Ligustrum vulgare</i> L.	+	1	+	1	1	2	1	.	()	()	1	()	()	1	1	.	1
2754 <i>Cornus sanguinea</i> L.	()	.	.	+	+	()	1	+	+	()	()	()	()	1	()	()	()
2738 <i>Euonymus europaeus</i> L.	()	()	+	()	1	()	1	+	()	()	1	.	+	1	.	()	.
2230 <i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	()	+	()	()	.	.	.	1
920 <i>Tamus communis</i> L.	.	.	+	.	()	.	.	.	+	.	.	.	1	.	+	.	.
3617 <i>Viburnum opulus</i> L.	.	1	.	.	1	.	.	.	()	.	.	.	()	.	.	.	.
2213 <i>Malus sylvestris</i> Miller	.	.	.	.	()	()	()	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.
92 <i>Juniperus communis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
ESPECES DES QUERCO-FAGETEA																	
Espèces du Mull-Mull calcique:																	
2729 <i>Acer campestre</i> L.	()	()	()	+	1	()	1	()	()	()	()	()	()	1	+	+	.
1062 <i>Ulmus minor</i> Miller	.	.	()	.	.	.	.	.	.	()	()	.	.	.	.	.	.
2087 <i>Ribes alpinum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	()	()	.	()
1254 <i>Buxus sempervirens</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
1540 <i>Aquilegia vulgaris</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Espèces du Mull:																	
437 <i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	.	.	.	.	+	.	+	1	22	12	12	12	12	.	1	.	.
3556 <i>Fraxinus excelsior</i> L.	1	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2192 <i>Geum urbanum</i> L.	.	.	+	+	1	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
856 <i>Ruscus aculeatus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	1	+	.	.
Espèces du Mull-Moder et du Moder:																	
2755 <i>Hedera helix</i> L.....	33	33	44	22	22	12	44	12	22	1	33	22	22	33	32	12	32
2205 <i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) D.C. ...	+	.	.	.	1	.	.	()	()	.	.	()	()	.	.	.	.
311 <i>Poa nemoralis</i> L.	12	1	.	12	.	1	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
1377 <i>Stellaria holostea</i> L.	+	.	.	+	1	+	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	+
3547 <i>Vinca minor</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.
846 <i>Convallaria majalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.
Espèces tolérantes:																	
1009 <i>Corylus avellana</i> L.	.	()	()	()	()	()	()	.	+	()	()	()	+	()	.	.	()
B 856 <i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (L.) Wnrt.	12	.	.	32	.	.	22	.	.	.	.	33	.	.	22	1	1
1566 <i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	22	.	.	.	.	1	.	12	.	1	12	.	.	.

MERCURIALO. - CARPINENION (suite)

G R O U P E O R I E N T A L																	Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCILOGIE	Groupe phytogéographique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
<i>Scillo- Carpinetum</i>							<i>Asaro-Tilietum</i>											lumière	chaleur	humidité	mor moder mull	mull calcaie																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
163 972 1042	970 710 752 952 1052 748 446	349 1077 1228 1206 1205 1226 170 1236 1111 1237 1197 1234 169																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
. () 1 1 () 2 () () 2 . () () () () . . . 2 ()	. () () () . () . () . 1 () . () 1 () () () () . () 1 () () () . . () () . () () + . 1 1	() () () () () () () () () () + . . () () () 1 1 1 1 . 1 1 1 + 1 1 () . 1 1 1 . () 1 1 () + 1 . () + 22 + () . () . + . . + ... + . + 1 () . . . + ... () . . () () . . . ()	Ch Ch Ch Ch Ch G1 Ch Ch Ch	1 1 1 1 1 1 1 1 L																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					</

TABLEAU 105 - FORETS BASOPHILES :

	G R O U P E O C C I D E N T A L																	
	Narcisso- Carpine- tum				Lithospermo-Carpinetum													
	67	700	1994	68	73	1997	74	1919	1024	1917	1064	1049	1025	1952	1916	2002	1951	
NIVEAU INFERIEUR DE VEGETATION																		
COMPAGNES (fin)																		
Espèces du Moder-Mor:																		
3627	<i>Lonicera periclymenum</i> L.				.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.
3254	<i>Melampyrum pratense</i> L.				.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
2744	<i>Frangula alnus</i> Miller				.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.
2557	<i>Lathyrus montanus</i> Bernh.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
Espèces tolérantes:																		
707	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.				.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.				.	.	()	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
	<i>Rubus fruticosus</i> L. coll.				.	1	+	()	1	+	+	1	+	()	()	1	1	.
3754	<i>Solidago virgaurea</i> L.				.	.	.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.
B 853	<i>Loeskobryum brevirostre</i> (Ehr) Fleisch.				.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	32	.	.	.
B 817	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (L.) Fleisch.				.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	12	.	.	+
B 721	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) B.E. ..				.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	22	.	12
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 789	<i>Brachythecium rutabulum</i> (L.) B.E. ...				.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.


ESPECES PRESENTES UNE FOIS:


- 67 - *Agrostis stolonifera* L.,+.
68 - *Alliaria petiolata* (Bieb.) Cav. et Grande,l.
73 - *Centaureum erythraea* Raffin ssp. *erythraea*,l;- *Cytisus scoparius* (L.) Link.,arbustif,+.
74 - *Fragaria viridis* Duch.,+.
163 - *Melampyrum cristatum* L.,+;- *Fissidens adianthoides* (L.) Hedw.,+.- *Mnium affine* Bland.,+.
169 - *Hypericum hirsutum* L.,+.
349 - *Paris quadrifolia* L.,+;- *Scrophularia nodosa* L.,+.
446 - *Euphorbia cyparissias* L.,+.
700 - *Dryopteris filix-mas* (L.) Schott.,+;- *Athyrium filix-femina* (L.) Roth.,+;- *Circea lutetiana* L.,2/2.
710 - *Lycopus europaeus* L.,+;- *Muscari comosum* Mill.,+;- *Isopterygium depressum* (Bruch.) Mitt.,+;- *Acer pseudoplatanus* L.,taillis,+;niveau inférieur,+;- *Sambucus nigra* L.,arbustif,+.


748 - *Anomodon viticulosus* (L.) Hook. et Tayl., 1.
752 - *Luzula forsteri* (Sm.) D.C., +.
952 - *Brisa media* L., +.
024 - *Oxyrrhynchium praelongum* (Hedw.) Warnst., +.
049 - *Luzula multiflora* (Retz.) Lej., +.
064 - *Cladonia tenuis* (Floerke) Harm. em. Des Abb., +; - *Juglans regia* L., niveau inférieur, 1; - *Berberis vulgaris* L., arbustif, +.
197 - *Digitalis lutea* L., 1; - *Anthericum ramosum* L., 1.
226 - *Peltigera canina* (L.) Willd. var. *rufescens* Mudd., 1; - *Dicranum scoparium* (L.) Hedw., 1/2.
228 - *Lapsana communis* L., +.
237 - *Isothecium viviparum* (Neck.) Lindb., +.
917 - *Cirsium arvense* (L.) Scop., +; - *Hypericum pulchrum* L., +; - *Lathyrus niger* (L.) Bernh., +.
919 - *Mespilus germanica* L., +.
994 - *Rumex sanguineus* L., +.
997 - *Carex spicata* Huds., 1/2; - *Cruciata loevipes* Opiz., +.

2

Fig. 279 - Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles : graphe - espèces (représentation simplifiée).











Fig. 281 - Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles du Bassin Parisien méridional: "carte" des individus d'association dans le plan des axes 1 et 2 de l'analyse.






Fig. 283 - Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles du Bassin Parisien méridional: "carte" des individus d'association dans le plan des axes 1 et 4 de l'analyse.




Fig. 284 - Spectre sociologique brut du *Mercurialo-Carpinenion*.

A - *Narcisso-Carpinetum*

B - *Lithospermo-Carpinetum*

C - *Scillo-Carpinetum*

D - *Asaro-Tilietum*

TABLEAU 106

SPECTRE SOCIOLOGIQUE BRUT DU *MERCURIALO-CARPINENION*

	<i>Narcisso-Carpinetum</i>	<i>Lithospermo-Carpinetum</i>	<i>Scillo-Carpinetum</i>	<i>Asaro-Tilietum</i>
Espèces du <i>Carpinion</i>	10,8 %	9,6 %	8,6 %	8,3 %
Espèces des <i>Fagetalia</i>	25,2 %	14,9 %	24,0 %	21,7 %
Espèces des <i>Quercetalia pubescenti-petreae</i>		4,2 %	1,7 %	2,6 %
Espèces des <i>Querco-Fagetea</i>	27,9 %	26,3 %	29,6 %	28,4 %
Espèces des <i>Prunetalia</i>	18,9 %	20,7 %	18,0 %	15,3 %
Compagnes	17,1 %	24,6 %	18,0 %	23,6 %




Fig. 286 - *Lithospermo-Carpinetum*

Fig. 285 - *Narcisso-Carpinetum*




Fig. 287 - *Scillo-Carpinetum*




Fig. 288 - *Asaro-Tilietum*

Fig. 285 à 288 - Types morphologiques et formes biologiques des forêts
du *MERCURIALO-CARPINETUM*.




Fig. 289 - *Narcisso-Carpinetum*

Fig. 290 - *Lithospermo-Carpinetum*




Fig. 291 - *Scillo-Carpinetum*

Fig. 292 - *Asaro-Tilietum*

Fig. 289 à 292 - Spectre écologique des forêts du *MERCURIALO-CARPINENION*




Fig. 294 - *Lithospermo-Carpinetum*

Fig. 293 - *Narcisso-Carpinetum*




Fig. 295 - *Scillo-Carpinetum*

Fig. 296 - *Asaro-Tilietum*

Fig. 293 à 296 - Spectre phytogéographique des forêts du *MERCURIALO-CARPINENION*.




Fig. 297 - Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles du Bassin Parisien méridional: comparaison avec des associations décrites dans d'autres régions.

TABLEAU 107

SPECTRE ECOLOGIQUE DES FORETS BASOPHILES:

CLASSEMENT DES ESPECES PAR REFERENCE AU TYPE D' HUMUS

	<i>Narcisso- Carpinetum</i>	<i>Lithospermo- Carpinetum</i>	<i>Scillo- Carpinetum</i>	<i>Asaro- Tilietum</i>
FUTAIE:				
espèces tolérantes	100,0 %	41,0 %	60,0 %	26,0 %
espèces du Mull calcique		58,6 %		61,8 %
Mull calcique-Mull			40,0%	
espèces du Mull				12,2 %
espèces du Moder-Mor		0,4 %		
TAILLIS:				
espèces tolérantes	94,0 %	41,4 %	82,1 %	52,2 %
espèces du Mull calcique		41,3 %	2,8 %	18,9 %
Mull calcique-Mull	5,9 %	12,6 %	14,8 %	11,6 %
espèces du Mull	0,1 %	0,7 %	0,2 %	13,9 %
espèces du Mull-Moder		4,0 %		
espèces du Moder-Mor			0,1 %	3,4 %
ARBUSTES:				
espèces tolérantes	39,4 %	19,6 %	14,0 %	16,6 %
espèces du Mull calcique	7,7 %	22,9 %	43,9 %	21,1 %
Mull calcique-Mull	15,7 %	13,5 %	20,1 %	10,5 %
espèces du Mull	28,6 %	35,1 %	17,4 %	43,3 %
espèces du Mull-Moder	8,0 %	7,6 %	2,8 %	3,8 %
espèces du Moder	0,3 %	1,1 %		1,8 %
espèces du Moder-Mor	0,3 %	0,1 %	1,7 %	2,8 %
STRATE INFERIEURE:				
espèces tolérantes	9,8 %	13,0 %	12,0 %	33,6 %
espèces du Mull calcique	0,4 %	2,7 %	6,6 %	6,6 %
Mull calcique-Mull	15,5 %	16,5 %	14,4 %	6,3 %
espèces du Mull	34,4 %	27,4 %	30,9 %	23,5 %
espèces du Mull-Moder	37,5 %	38,5 %	34,3 %	24,7 %
espèces du Moder	2,1 %	1,7 %	2,0 %	4,1 %
espèces du Moder-Mor	0,4 %	0,3 %		0,8 %

TABLEAU 108

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE DES FORETS BASOPHILES

	<i>Narcisso- Carpinetum</i>	<i>Lithospermo- Carpinetum</i>	<i>Scillo- Carpinetum</i>	<i>Asaro- Tilietum</i>
FUTAIE:				
4		0,4 %	20,0 %	
5	100,0 %	35,2 %	60,0 %	26,0 %
Total 4 + 5	100,0 %	35,6 %	80,0 %	26,0 %
42 - 52				0,8 %
44 - 54		58,6 %	20,0 %	73,2 %
45 - 55		5,7 %		
TAILLIS:				
4	8,1 %	18,7 %	15,0 %	18,2 %
5	3,8 %	2,7 %	11,4 %	6,4 %
Total 4 + 5	11,9 %	21,4 %	26,4 %	24,6 %
42 - 52				8,4 %
44 - 54		41,3 %	2,9 %	19,0 %
45 - 55	88,1 %	37,3 %	70,7 %	48,0 %
ARBUSTES:				
2				0,1 %
3	12,4 %	21,1 %	15,5 %	16,7 %
4	48,2 %	46,4 %	35,9 %	43,5 %
5	3,9 %	7,8 %	3,0 %	6,4 %
Total 2 à 5	64,5 %	75,3 %	54,4 %	66,7 %
42 - 52	4,1 %		2,8 %	5,4 %
43 - 53		14,4 %	28,6 %	
44 - 54	4,1 %	4,6 %	10,0 %	18,3 %
45 - 55	27,3 %	5,6 %	4,2 %	9,5 %
STRATE INFÉRIEURE:				
1		3,8 %	0,6 %	2,6 %
2	13,4 %	15,4 %	13,9 %	34,5 %
3	37,4 %	14,7 %	29,5 %	17,9 %
4	35,9 %	43,6 %	35,6 %	30,1 %
5	1,3 %		0,9 %	2,4 %
Total 1 à 5	88,0 %	77,5 %	80,5 %	87,5 %
41 - 51	7,7 %	3,7 %	0,6 %	1,4 %
42 - 52	3,0 %	7,5 %	4,7 %	3,4 %
44 - 54		4,7 %	9,1 %	4,6 %
45 - 55	1,3 %	6,6 %	5,2 %	3,1 %

TABLEAU 109

STRATE INFÉRIEURE DES FORÊTS BASOPHILES:
TYPE MORPHOLOGIQUE ET FORME BIOLOGIQUE DES ESPÈCES

	<i>Narcisso- Carpinetum</i>	<i>Lithospermo- Carpinetum</i>	<i>Scillo- Carpinetum</i>	<i>Asaro- Tilietum</i>
BRYOPHYTES	17,1 %	13,8 %	17,8 %	34,2 %
SPERMATOPHYTES ET) PTERIDOPHYTES)	82,9 %	86,2 %	82,1 %	65,8 %
Chamaephytes	27,2 %	35,7 %	19,9 %	24,9 %
Hémicryptophytes	23,5 %	31,6 %	32,3 %	26,3 %
Géophytes	32,2 %	18,7 %	29,9 %	14,4 %
Thérophytes		0,2 %		0,2 %

TABLEAU 110

LOCALISATION DES RELEVÉS DE FORÊTS BASOPHILES

67 - Bois du Battoir, Champvoux, Nièvre.	1111 - Mont-Martin, Dornecy, Nièvre; - à la base du versant Nord-Ouest.
68 - Bois du Battoir, Champvoux.	
73 - Bois de Charrant, Mesves-sur-Loire, Nièvre.	1197 - Mont-Martin, versant Nord.
74 - Les Gaillots, Perroy, Nièvre.	1205 - Mont-Martin, plateau sommital.
163 - Bois de Soye, St-Just, Cher.	1206 - Mont-Martin, en haut du versant Nord.
169 - Butte de Saligny, Asnois, Nièvre, à l'Ouest du plateau sommital.	1226 - Mont-Martin, versant Ouest.
170 - Butte de Saligny, versant Nord.	1228 - Mont-Martin, extrémité Ouest du plateau.
349 - La Chapelle-St-André, Nièvre	1234 - Mont-Martin, versant Nord-Ouest.
446 - Champcelée, Suilly-la-Tour, Nièvre.	1236 - Mont-Martin, sommet.
700 - Anthien, Nièvre.	1237 - Mont-Martin, pente Ouest.
710 - Pressur, Clamecy, Nièvre, coteau orienté au Nord.	1916 - Les Petits-Bois, Villeneuve-sur-Cher, Cher.
748 - Corvol d'Embernard, Nièvre.	1917 - La Vallée du Port, Villeneuve-sur-Cher.
752 - Chevroches, Nièvre.	
952 - Mont-Brivois, Brèves, Nièvre, sommet.	1919 - La Vallée - Saget, Villeneuve-sur-Cher.
970 - Les Fourneaux, Surgy, Nièvre.	
972 - Le Puizac, Garchy, Nièvre.	1951 - Bois du Montet, Villeneuve-sur-Cher.
1024 - Mont-Givre, Pougues-les-Eaux, Nièvre	
1025 - Mont-Givre, Pougues-les-Eaux.	1952 - Bois du Palais, Villeneuve-sur-Cher.
1042 - Les Génévriers, Baugy, Cher.	
1049 - Petit-Montois, Varzy, Nièvre.	1994 - Blancafort, Nièvre.
1052 - Grand-Montois, Varzy, Nièvre.	1997 - Vinon, Cher.
1064 - Le Taissiau, Dun-sur-Auron, Cher.	2002 - Bois de Fleuret, Uzay-le-Venon, Cher.
1077 - Bois des Brûlés, Armes, Nièvre.	

TABEAU 111

SPECTRE SOCIOLOGIQUE BRUT DU RUBIO-QUERCETUM

	Groupe ment de transition	Rubio-Quercetum Fagetosum	Rubio-Quercetum Ornithogaletosum	faciès péri-forestier
Espèces des <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>	13,4	18,6	17,7	19,9
dont espèces communes aux <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>				
et aux <i>Prunetalia</i>	2,3	4,1	2,8	2,6
aux <i>Quercetalia pubescenti-petraeae</i>				
et aux <i>Origanetalia</i>	5,1	8,5	9,9	12,5
Espèces des <i>Fagetalia</i>	16,2	10,2	7,1	8,8
Espèces des <i>Quercu-Fagetea</i>	20,4	17,0	14,2	8,8
Espèces des <i>Prunetalia</i>	20,3	15,0	19,7	17,1
Espèces des <i>Origanetalia</i>	1,4	2,8	6,1	10,2
Espèces des <i>Festuco-Brometea</i>	4,2	10,8	13,9	6,9
Compagnes	24,1	25,2	21,3	28,2




Fig. 298 - Spectre sociologique brut du Rubio-Quercetum.

- A - groupement de transition au *Mercurialo-Carpinenion*.
 B - *Rubio-Quercetum-Fagetosum*.
 C - *Rubio-Quercetum-Ornithogaletosum*.
 D - *Rubio-Quercetum-Ornithogaletosum*, faciès péri-forestier.

TABLEAU 112

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE DES FORETS THERMOPHILES

	Groupement de transition	<i>Rubio-Quercetum Fagetosum</i>	<i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i>	faciès péri-forestier
FUTAIE:				
4		0,6		
5	19,7	71,6		
Total 4 + 5	19,7	72,8		
44 - 54	80,3	27,8	100,0	100,0
TAILLIS:				
2		1,2	1,3	8,5
4	4,3	4,7	17,8	17,5
5	4,0	13,1		
Total 2 à 5	8,3	19,0	19,1	26,0
42 - 52	0,1	1,9	0,1	
44 - 54	79,9	76,5	79,4	74,1
45 - 55	11,7	2,6	1,4	
ARBUSTES:				
2	20,5	10,5	8,6	27,9
3	12,5	17,5	6,3	7,7
4	32,7	42,3	32,5	27,8
5	5,7	5,8	2,7	9,0
Total 2 à 5	71,4	76,1	50,1	72,4
42 - 52	6,4	3,9	8,4	16,8
43 - 53		4,1	16,5	
44 - 54	22,1	15,2	21,4	10,8
45 - 55		0,6	3,5	0,1
STRATE INFERIEURE:				
1	15,7	10,8	8,0	2,0
2	28,8	22,2	16,8	9,9
3	13,9	11,1	14,7	15,5
4	25,3	30,4	23,5	37,7
5	5,5	3,6	3,0	3,1
Total 1 à 5	89,2	78,1	66,0	68,2
41 - 51	1,7	1,0	2,5	1,7
42 - 52	2,8	6,9	12,6	7,2
43 - 53		1,2	2,3	3,0
44 - 54	6,3	12,4	16,5	19,8
45 - 55		0,4		0,1

TABEAU 113

SPECTRE ECOLOGIQUE DES FORETS THERMOPHILES
CLASSEMENT DES ESPECES PAR REFERENCE AU TYPE D'HUMUS

	Groupe ment de transition	<i>Rubio-Quercetum</i> <i>Fagetosum</i>	<i>Rubio-Quercetum</i> <i>Ornithogaletosum</i> faciès péri-forestier	
FUTAIE:				
espèces tolérantes	19,7	72,2		
espèces du mull calcique	80,3	27,8	100,0	100,0
TAILLIS:				
espèces tolérantes	6,0	14,4	1,6	8,5
espèces du mull calcique	79,9	79,7	79,4	74,1
mull calcique-mull	2,3		6,3	16,4
espèces du mull	9,7	3,4	8,8	
espèces du mull-moder	2,1		4,0	1,1
espèces du moder		2,6		
ARBUSTES:				
espèces tolérantes	21,0	13,8	10,5	28,0
espèces du mull calcique	27,1	26,7	31,9	16,3
mull calcique-mull	16,2	16,9	18,3	25,8
espèces du mull	32,5	37,4	34,0	26,3
espèces du mull-moder	3,0	3,6	4,3	1,2
STRATE INFERIEURE:				
espèces tolérantes	26,7	18,5	15,6	10,4
espèces du mull calcique	8,4	19,8	19,8	25,1
mull calcique-mull	5,8	13,6	28,4	29,9
espèces du mull	32,7	24,6	17,0	9,9
espèces du mull-moder	21,7	20,4	16,8	24,4
espèces du moder	2,8	2,0	0,6	
espèces du moder-mor	2,3	1,0	2,3	1,3
espèces du mor			1,5	

TABEAU 114

STRATE INFERIEURE DES FORETS THERMOPHILES
TYPE MORPHOLOGIQUE ET FORME BIOLOGIQUE DES ESPECES

	Groupe ment de transition	<i>Rubio-Quercetum</i> <i>Fagetosum</i>	<i>Rubio-Quercetum</i> <i>Ornithogaletosum</i> faciès péri-forestier	
LICHENS			0,2	0,3
BRYOPHYTES	34,0	21,3	18,2	10,8
PTERIDOPHYTES ET)				
SPERMATOPHYTES)	66,0	78,6	81,5	88,9
Chamaephytes	30,0	24,3	31,4	32,2
Hémicryptophytes	32,0	44,9	41,6	40,0
Géophytes	3,5	7,5	5,3	11,2
Thérophytes	0,5	1,7	3,2	5,5




Fig. 299 - groupe de transition

Fig. 300 - Rubio-Quercetum Fagetosum




Fig. 299 à 302 - *Rubio-Quercetum Ornithogaletosum* facies péri-forestier

Fig. 301 - *Rubio-Quercetum Ornithogaletosum*

Fig. 302 - *Rubio-Quercetum Ornithogaletosum*

Fig. 299 à 302 - Types morphologiques et formes biologiques des forêts du RUBIO-QUERCETUM.




Fig. 304 - *Rubio-Quercetum Fagetosum*

Fig. 303 - *Rubio-Quercetum Fagetosum*




Fig. 305 - *Rubio-Quercetum Ornithogaleetosum*




Fig. 306 - *Rubio-Quercetum Ornithogaleetosum*
faciès péri-forestier
RUBIO-QUERCETUM.

- 1 - espèces du mull calcaïque
2 - espèces du mull-mull-calcaïque
3 - espèces du mull
4 - espèces du mull-moder
5 - espèces du moder
6 - espèces du moder-mor
7 - espèces du mor
8 - espèces tolérantes





Fig. 308 - *Rubio-Quercetum Fagetosum*

Fig. 307 - groupement de transition



1 - espèces subcosmopolites

2 - espèces holarctiques

3 - espèces eurasiatiques

4 - espèces dont l'aire de répartition s'étend largement en Europe, Afrique du Nord, Asie occidentale

5 - espèces européennes

6 à 10 - espèces localisées en Europe, ou à l'intérieur du périmètre 4, principalement:

6 - dans l'Ouest

7 - dans l'Ouest et le Sud

8 - dans le Sud

9 - dans le Sud et l'Est

10 - dans l'Est

Fig. 309 - *Rubio-Quercetum Ornithogaletosum*

Fig. 310 - *Rubio-Quercetum Ornithogaletosum*
facies péri-forestier

Fig. 307 à 310 - Spectre phytogéographique des forêts du RUBIO-QUERCETUM.

THERMOPHILES

[illegible]

TABLEAU 115 - F O R E T S B A S O

		RUBIO - QUERCETUM FAGETOSUM																								
		groupement de transition																								
		158	966	1229	1376	570	1028	949	115	1115	1078	444	111	1104	117	76	1047	984	110	112	1076	108	114	1030		
NIVEAU ARBUSTIF:																										
Recouvrement %		554550404035							4035554565808545455035506040508030																	
moyenne		55							50																	
Essences des strates arborescentes:																										
1012	<i>Quercus robur</i> L.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.		
2628	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.		
2218	<i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers. .	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.		
3556	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2229	<i>Prunus avium</i> L.	.	+	+	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	1	+		
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	+	.	+	+	+	.	.	1	.	.	.	1	+	.	.	1	.	1	.	1	1	1		
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.		
2216	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	+	.	.	1	1	1	1	.		
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.		
2729	<i>Acer campestre</i> L.	1	.	1	+	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	2	1	1	1	2	.		
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz .	+	+	1	.	+	.	.	+	1	.	.	.	1	.	.	1	.	.	1	1	+	1	+		
2219	<i>Sorbus domestica</i> (L.) Crantz ..	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.		
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	1	1	1	1	.	+	1	.	1	1	1	2	2	1	3	2	1	1	1	2	2	.	1	1	.
	<i>Pinus</i> sp. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	
Lianes:																										
2755	<i>Hedera helix</i> L.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1643	<i>Clematis vitalba</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
920	<i>Tamus communis</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	
3627	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	
Arbustes et arbrisseaux:																										
2427	<i>Colutea arborescens</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2753	<i>Cornus mas</i> L.	.	2	2	2	.	.	.	+	+	1	1	.	1	2	.	1	.	.	.	.	1	2	1	1	1
2227	<i>Prunus mahaleb</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	+	.	.	1	+	1	.	1	.	1	.	.	.	+	.	
1288	<i>Daphne laureola</i> L.	.	1	.	+	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	+	1	+	.	.	.	.	1	.	1	
1254	<i>Buxus sempervirens</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2205	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	1	+	.	.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	+	.	
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	2	2	1	1	1	2	1	2	.	+	1	1	+	1	2	1	.	+	.	.	1	.	.	1	
2213	<i>Malus sylvestris</i> Miller	.	+	.	+	+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	+	.	+	+	
2204	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.	1	+	1	2	1	.	.	.	1	.	.	.	1	1	.	1	+	.	.	1	1	1	1	

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																	Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCIOLOGIE	Groupe phytogéographique				
																	faciès péri-forestier	lumière	chaleur	humidité	mor	moder	mull	mull calcaire				
119 116 106 857	2001 1953 1032 832 118 123 740 576 358 831 1943 124 2280 164 175 1308															413 1033 343 2003 1307 1306 2004												
30252560	60506080806065505525505975456550	60														30306020 0 9035												
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	L		3-4	-	-	-			FR	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn			3			-			FG	44	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	L T		2			-			QP	52	
+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	l		3-4			-			QF	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	l t		3			-			FG	4	
+	. 1 .	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	Phn			3			-			FG	5	
+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn			4			-			FR	4	
.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	Phn	L T		2			-			QF	43	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn			2-4			-			FG	55	
.	2 .	.	1 + 1 +	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	Phn	l t		2-3			-			QF	4	
+	+	1	1 + +	.	.	.	.	.	.	1 1	.	+	.	1 2	.	.	Phn	L t		2-4			-			FR	4	
.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	L T		2			-			QP	52	
+	.	1	. 1 . 1 + 1 1 2 2 2 2 2 1 1 1 2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	L T		2			-			QP	54	
+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn						-					
+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phl			1-4			-			QF	4	
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phl	L t		2-4			-			PR	4	
1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G1	l t		3			-			PR	4	
.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phl	1		2-4			-			FR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	L T		1-2			-			PR-QP	43	
.	1 1 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	l T		1-2			-			PR	44	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	L T		1-2			-			PR	44	
.	.	1 .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	t		2			-			QF	52	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	1 T		1-2			-			QF	53	
+	+	1 +	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn			3-4			-			QF	4	
+	+	. 1	1 1 .	.	1 1 1	.	.	1 1 1 2 1	.	1 1	.	.	1 1	.	.	.	Phn	1		3			-			QF	3	
.	+	. 1	+	.	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Phn			3-4			-			PR	5	
1 1 + 1	1 1 . 1 1 1 1	.	1 1 1 1 1	.	.	.	.	.	1 + 1 1	.	.	.	1 2	.	.	.	Phn	1		2-4			-			PR	4	

TABLEAU 115 - F O R E T S B A S O

		RUBIO - QUERCETUM FAGETOSUM																														
		groupement de transition																														
		158	966	1229	1376	570	1028	949	115	1115	1078	444	111	1104	117	76	1047	984	110	112	1076	108	114	1030								
Arbustes et arbrisseaux (fin):																																
2738	<i>Euonymus europaeus</i> L.	.	.	1	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.							
3564	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	.	1	2	1	2	.	2	2	1	1	2	1	1							
2114	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	1	1	1	.	1	+	.	+	.	.	.	1	+	1	+	1	.	1	1	.	1	1	.	.							
3618	<i>Viburnum lantana</i> L.	+	1	1	1	+	.	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	2	1	.	2	1	1							
2754	<i>Cornus sanguinea</i> L.	1	+	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	2	1	1	.	2	2	1	1	2	1	1							
3621	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	.	1	1	1	1	+	1	1	+	1	+	.	1	1	2	1	1	1	1	+	1	.	1	.							
	<i>Rosa</i> sp.	.	.	1	.	1	+	.	+	.	.	.	+	.	+	.	1	.	+	1	.	.	1	+	.							
2750	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	.	.	2	.	.	.	+	1	+	.	+	.	1	.	.	1	.	.	+	.	.	1	.	.							
92	<i>Juniperus communis</i> L.	.	1	1	.	.	1	2	1	2	.	.	.	12	1	1	1	.	+	1	1	1	2	1	1							
2230	<i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	+	.	1	1	.	.	.	.	.	1	.	1	+	1	.	1	2	.	.	1	1	1							
	<i>Rubus fruticosus</i> L. coll.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	+	.	.							
2744	<i>Frangula alnus</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.							
2737	<i>Ilex aquifolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.							
2210p	<i>Pyrus pyraister</i> Burgsd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.							
2087	<i>Ribes alpinum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
3617	<i>Viburnum opulus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
1648	<i>Berberis vulgaris</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
2095	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
2092	<i>Spirea hypericifolia</i> L. ssp. <i>obovata</i> (W. et K.) Dósti.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.							
NIVEAU INFÉRIEUR																																
DE VEGETATION																																
Recouvrement %		45	75	30	40	40	40	30	70	80	80	40	80	50	40	80	90	99	60	45	50	35	45	52	0							
moyenne		45												50																		
ENSEMBLE SPECIFIQUE COMMUN																																
AUX FORETS BASOPHILES ET																																
AUX FORETS BASO-THERMOPHILES:																																
3618	<i>Viburnum lantana</i> L.	(	)	(	)	(	)	+	1	(	)	1	1	1	(	)	(	)	1	+	1	(	)	1	1	(	)	.	1	1		
3621	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	.	(	)	1	(	)	(	)	(	)	+	(	)	(	)	.	(	)	(	)	(	)	(	)	.	(	)	(	)	(	)
2959	<i>Primula veris</i> L.	+	1	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1530	<i>Helleborus foetidus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
904	<i>Iris foetidissima</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

[illegible]

TABLEAU 115 - F O R E T S B A S O

		RUBIO - QUERCETUM FAGETOSUM															
		groupement de transition															
		158	966	1229	1376	570	1028	949	115	1115	1078	444	111	1104	117	76	1047
NIVEAU INFERIEUR DE VEGETATION (suite)																	
ENSEMBLE SPECIFIQUE COMMUN																	
AUX FORETS BASO-THERMOPHILES:																	
ESPECES DU RUBIO-QUERCION:																	
3568	<i>Rubia peregrina</i> L.	.	.	1	.	1	.	1	2	1	1	1	1	2	1	.	1
928	<i>Limodorum abortivum</i> (L.) Sw. ..	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	+	.	1
ESPECES DES QUERCETALIA																	
PUBESCENTI-PETRAEAE:																	
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	1	()	1	+	()	2	1	()	1	1	()	()	1	()	()	1
2219	<i>Sorbus domestica</i> (L.) Crantz ..	()	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	+	.	()	.
3403	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	+	.	1	.	1	.	2	1	.	.	.	2	.	.	.	2
ESPECES DES PRUNETALIA ET DES																	
QUERCETALIA PUBESCENTI-PETRAEAE																	
92	<i>Juniperus communis</i> L.	.	()	()	.	.	1	()	()	1	1	.	+	1	1	()	+
2750	<i>Rhamnus catharticus</i> L.	.	.	()	.	.	.	()	()	1	.	()	.	+	.	1	.
2227	<i>Prunus mahaleb</i> L.	.	.	()	.	.	.	.	()	()	.	.	()	()	.	()	.
2210p	<i>Pyrus pyrastraster</i> Burgsd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()
ESPECES DU GERANION ET DU																	
QUERCION PUBESCENTI-PETRAEAE:																	
3552	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Med.	+	.	1	+	.	.	1	.	1	.	1	.	.	1	.	+
847	<i>Polygonatum odoratum</i> (Mill.) Dr.	.	.	1	1	.	.	1	1	1	1	.	.	1	1	.	1
3364	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.	.	.	1	.	.	.	1	+	1	1	1	.	+	1	.	.
3466	<i>Calamintha officinalis</i> Moench .	.	.	1	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.
1633	<i>Thalictrum minus</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+
2812	<i>Bupleurum falcatum</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	+
3250	<i>Melampyrum cristatum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	1	+	1	+
1475	<i>Silene nutans</i> L.	.	.	.	.	.	.	1	+	12	.	.	.	.	.	.	.
954	<i>Orchis purpurea</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	+	+	+	1	1
741	<i>Anthericum ramosum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	22	.	1	1

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																				Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCIOLOGIE	Groupe phytogéographique															
																					lumière	chaleur	humidité	mull calcique																		
																								mor	moder			mull														
119	116	106	857	2001	1953	1032	832	118	123	740	576	358	831	1943	124	2280	164	175	1308	413	1033	343	2003	1307	1306	2004	Ch1	G	L	T	2	1-2					QP	OR-QP	52	53		
+	1	.	.	.	1	2	2	.	1	1	3	2	.	1	1	1	+	.	.	.	2	1	1	+	.	1	+															
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.															
()	+	1	()	1	()	()	()	()	+	()	1	()	()	()	1	+	()	1	()	1	()	()	()	1	1	1	Ch	L	T	2									QP	54		
.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	()	Ch	L	T	2									QP	52		
.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	T	2-3									QP-OR	54		
()	.	()	.	()	+	.	.	()	()	+	()	.	()	.	()	.	.	.	.	.	()	()	()	()	+	()	()	Ch	L		2-4	-	-	-	-		(PR)	2				
.	.	.	.	.	.	()	()	.	()	.	.	.	+	.	()	()	.	.	.	.	()	.	()	.	()	.	Ch	L	t	2									PR	4		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	T	1-2									PR	44		
.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	T	3									PR	53		
.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	Hm	1	t	3									OR	4		
.	1	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	1	.	.	1	.	.	+	.	G	1	T	2									OR-QP	4		
.	.	.	+	.	.	.	+	1	1	2	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	1	+	.	.	1	1	Ch	1	T	2									OR-QP	4		
1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	t	2									OR-QP	52		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	T	1-2									OR-QP	3		
.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	+	.	+	.	.	1	.	.	.	.	1	1	1	.	+	.	1	Hm	L	t	2-3									OR-QP	3	
.	.	.	+	.	.	1	1	.	1	1	1	+	+	1	+	1	1	.	.	.	2	1	2	1	.	.	1	Th	L	Te	X 2									OR-QP	3	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	T	2										OR-QP	4	
.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	G	L	T	2-3										OR-QP	44	
.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	1	.	.	1	G	L	T	2-3										OR-QP	5

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																				Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCILOGIE	Groupe phytogéographique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																		faciès péri-forestier					lumière	chaleur	humidité			mor moder mull mull calcaique																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
119	116	106	857	2001	1953	1032	832	118	123	740	576	358	831	1943	124	2280	164	175	1308		413	1033							343	2003	1307	1306	2004																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
. . . +																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														.

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																				Type morphologique Forme biologique	Ecologie				SOCIOLOGIE	Groupe phytogéographique										
																			lumiére		chaleur	humidité	moder													
																							mull	mull			calcaique									
119	116	106	857	2001	1953	1032	832	118	123	740	576	358	831	1943	124	2280	164	175	1308	faciès péri-forestier	413	1033			343	2003		1307	1306	2004						
.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	22	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	22	+	12	Hm	L	T	2				OR-QP	44
.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	33	12	.	23	.	12	.	12	.	.	12	12	.	1	Hm	l	T	1-2				OR-QP	54	
.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	.	+	1	1	1	2	Hm	L	Te	1 X 3				OR-FB	4
.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	Hm	L	T	2				OR-FB	44	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	T	2-3				OR	54	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	1	.	1	.	1	.	1	.	+	.	Hm	L	T	2				OR-QP	43	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	+	.	.	1	Hm	L	T	2 X 3				OR	54	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	22	Hm	L	T	2				OR-FB	53	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	Hm	L	T	2-4				OR	55	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	Hm	L	T	2 X 3				OR-FB	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	Hm	L	T	2				OR-QP	52	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	Hm	L	Te	3				OR	55	
()	.	.	.	.	()	()	()	()	()	()	()	()	.	.	()	()	.	()	.	()	()	.	.	()	.	()	Ch	L		3				PR	4	
()	.	()	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	()	.	.	.	.	()	Ch	L	t	2-4				PR	4
1	1	()	()	()	()	()	1	1	()	1	()	()	.	()	1	()	()	()	()	()	.	.	()	()	.	()	Ch	1		2-3				PR	3	
1	1	()	2	()	1	1	()	1	1	1	()	()	()	()	1	1	()	1	.	1	2	()	.	+	()	.	Ch	1		1-3				PR	4	
()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	.	()	()	()	()	()	()	()	()	.	.	.	.	.	()	Ch	1		2-4				PR	4	
.	1	()	.	()	.	()	()	.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	Ch	1	t	2-3				PR	4	
.	.	.	.	()	.	()	.	()	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	()	.	()	.	.	.	.	.	Ch	1		3				PR	3	
()	()	.	.	.	1	1	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	1	.	.	.	.	G1	1	t	3				PR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch			3-4				PR	4	
.	()	.	()	()	.	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	()	()	.	.	.	.	Ch			3-4				PR	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	t	2				PR	44	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch			3-4				FG	54		
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G			3				FG	4		

			RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																			Type morphologique Forme biologique		Ecologie				SOCIOLOGIE	Groupe phytogéographique							
			faciès péri-forestier																					lumière	chaleur	humidité	mor	moder	mull	calcaïque						
119	116	106	857	2001	1953	1032	832	118	123	740	576	358	831	1943	124	2280	164	175	1308	413	1033	343	2003	1307	1306	2004										
. . . 1 .																											G									
.																											B									
(.) 1 (.) 1																											Ch									
. . . 1 +																											G	1								
.																											Ch	1	t							
.																											Hm	s								
.																											Hm	s								
.																											G	s								
.																											B	s								
+																											Ch	s								
. . . 1																											Hm	1								
.																											Hm	s								
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.																											Hm									
.				</																																

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM										Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCILOGIE	Groupe phytogéographique		
											faciès péri-forestier	lumière	chaleur	humidité	mor			moder	mull
119 116 106 857	2001 1953 1032 832 118 123 740 576 358 831 1943 124 2280 164 175 1308									413 1033 343 2003 1307 1306 2004									
. . . 1 () . () . + . . .	. . 1 12									+ . 1	Hm Ch Ch	1	2-4 3-4 3	- - -				QF QF QF	4 4 52
1 1 1 12 () () ()	12 2 22 12 1 1 1 . 1 12 1 1 () () . () () + . . . 1									+ . 22	Ch1 Ch Ch	1	1-4 3-4 2-4	- - -				QF QF QF	4 4 4
() () . () . . 2222	() () . . () . () . () () () () . () () () 12 . 332222 1 . . 1222 . + . . 1 12 + ... + . + . .									() . () () . . () 1222 . 1 B	Ch G	1 1v	3 2-4 2-4	- - -	- - -	- - -		QF QF QF	3 2 3
1 . 1 1 + ...	. . 1 1 . 12 1 1 1 1 1 12 1 1 + . . . 1 1 1 . + . + ... 1 + ... + ... 1 1 1									2 2 2 . 1 1 1 . + . + . . 1 . . . + ... 1	Hm G Hm Hm Hm Hm	1 Te L L L L	2 2 2-4 2-3 3 2	- - - - - -	- - - - - -		OR OR OR OR OR OR	3 3 4 3 5 54	
. . . . 12 1 12 1 + ... + ...	 1 1 + 1 12 12 1222 12 1 . 12 12 1 3322 . . . + 1 12 . 12 12 12 . 12 . . 12 . . + . 1 12 12 . 1 + 1 1 . + 1 + . . 1 + 12 .																		

[illegible]

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM										faciès péri-forestier	Type morphologique Forme biologique	Ecologie				SOCIOLOGIE	Groupe phytogéographique	
119 116 106 857	2001 1953 1032 832 118 123 740 576 358 831 1943 124 2280 164 175 1308	413 1033 343 2003 1307 1306 2004	lumière	chaleur	humidité	mor moder mull mull calcaire												
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		t	1-2				FB	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	T	2				BR	43
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	L	T	1-3				BR	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	T	2-3				BR	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	te	3				FB	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	L	t	2-3				BR	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	1-2				BR	5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2				FB	5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	Te	2				FB	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	te	2-3				BR	5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	te	2				BR	52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	3				BR	52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2 X 4				BR	51
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	te	2 X 4				BR	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	te	2				FB	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	1-2				FB	54
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	Te	1				FB	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	te	2-3				BR	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	Te	1-3				BR	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G	L	t	1-3				BR	5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2-3				BR	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	T	1				BR	53
12 +	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B			2					2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		t	2 X 4				MJ	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	t	2 X 3				MJ-OR	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ln		t						1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ln		t	1-2					1
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	l		3 X 4				MJ-FB	5
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2-3				AR	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2-3				AR-QF	4

- T H E R M O P H I L E S (suite)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																				faciès péri-forestier		Type morphologique Forme biologique	Ecologie				SOCIOLOGIE	Groupe phytogéographique									
119	116	106	857	2001	1953	1032	832	118	123	740	576	358	831	1943	124	2280	164	175	1308	413	1033	343	2003	1307	1306	2004	lumière	chaleur	humidité	mor	moder	mull	mull calcaique				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	Hm	L	t	3			-	-	AR-FB	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	G	L	t	3 X 4			-	-	MJ-BR	3	
.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	G	l		2 X 4			-	-	MJ-OR	3	
.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	Hm	L		2-4			-	-	AR	3		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2 X 4			-	-	MJ-FB	3		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	Ch	L	t	2			-	-	N-OR	55		
1 121212	221212	1 1 1 1233	.	1 121	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	.	1 12	1 1 1 221	Hm		t	2 X 4			-		MJ-FB	1	
+	.	.	.	1 1	.	.	.	.	.	.	.	.	1 1	.	.	1 2 1	.	1 1	.	.	1 2 1	.	1 1	.	+	1	Hm		t	2 X 4			-		FR	(51)	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1		2-4			-	-	AR-OR	4		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	Th			3 X 4			-	-	AR-MJ	4		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L		3-4			-	-	MJ-AR	3		
.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	Hm	1	t	3-4			-	-	ON	3		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	Hm	L	t	2-3			-	-	AR	3		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	Hm	L		3-4			-	-	AR	51		
() () . ()	+	() () ()	.	.	+	.	() () () () () ()	.	() . . ()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	() . . ()	.	.	.	Ch	L	t	2-4			-	-	FR	4		
.	.	.	.	.	+	+	.	+	+	.	.	.	.	.	.	1 . .	.	+	+	.	1 . .	.	+	1 . .	Hm	1		3			-	-	AR	4			
.	.	.	1	.	.	.	+	.	.	1 . 1	+	+	+	.	.	.	.	2 .	+	1 1	.	.	2 .	+	1 1	Hm	1		2 X 4			-	-	FR-ON	4		
.	.	.	1	.	.	1 . .	1 . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1		3			-	-	EP	2			
.	.	.	1	.	.	1 . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 . .	.	.	.	G			2 X 3			-	-	MJ-OR	4		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 . .	.	.	.	Hm	L	t	2-3			-	-	SC-FB	5		
.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	1 + .	.	.	.	2 + .	.	.	2 + .	.	Hm	L		2 X 4			-	-	MJ-N	4			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	Hm	1	t	2			-	-	SC-CU	3		
.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1 . 2 1 1	.	1 .	+	1 + .	1	.	.	1 .	+	1 .	Hm	1	t	2 X 4			-	-	MJ-FR	4			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1 . .	.	+	+	.	.	.	+	.	Hm			2 X 4			-	-	MJ-FB	2			
.	.	+	.	.	1 1 1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm			2-3			-	-	FR	4			
() . . .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch			3-4			-	-	FR	52			

- T H E R M O P H I L E S (f i n)

RUBIO - QUERCETUM ORNITHOGALETOSUM																				Type morphologique Forme biologique	Ecologie					SOCILOGIE	Groupe phytogéographique								
																			lumièr chaleur		humidité	mor moder mull	mull calcaique												
119	116	106	857	2001	1953	1032	832	118	123	740	576	358	831	1943	124	2280	164	175	1308	faciès péri-forestier	413	1033	343	2003	1307	1306	2004								
.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1		2-3	-	FR	3
.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	G			2-3	-	FR	2	
.	.	+	1	+	.	.	1	1	1	.	.	.	1	.	1	.	+	.	.	1	1	.	1	.	.	1	Th	1		2-4	-	FR	3		
.	.	()	1	.	.	+	.	.	()	.	1	()	.	1	.	()	.	1	1	()	.	()	()	.	.	.	Ch1	1		2-4	-	FR	4		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	B				2-4	-	FR	2		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	()	.	.	()	Ch	1		3 X 5	-	QR-AL	4		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm			2-3	-	QR	5		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L		2 X 4	-	CU	3		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	12	.	.	.	.	.	.	.	G	L		2 X 4	-	CU	1			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L		2-3	-	N-FB	2		
.	.	+	1	.	.	1222	.	+	.	3312	1	22	+	22	1	+	+	.	.	121222	1	.	22	1	B				2-4	-	FR	2			
.	.	+	12	.	.	1212	+	.	.	12	+	+	+	+	.	1	.	.	.	12	+	.	.	.	B				3-5	-	FR-AL	2			
()	.	()	1	.	.	.	.	()	()	.	()	.	+	.	()	+	.	()	.	.	.	.	.	.	B			Ch1		3	-	FR-PR	4		
.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B				2-4	-	FR-CU	1			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1			2-4	-	FR-EP	2			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch				3-4	-	FR	5			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L t			2	-	(SC)	3			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B				2	-	CU-QF	2			
()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch				4	-	FR	4			
()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B					4-5	-		54		
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	B				2-4	-	CU	5			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L			3	-	FR	5			

TABLEAU 116 : FORETS BASOPHILES ET FORETS BASO -

		MERCURIALO - CARPIN			
		Narcisso- 700 Carpinetum 1994	Lithospermo- Carpinetum 73 74 75 1919 1924 1927 1069 1049 1952 1952 1916 2002 1951 163	Scillo- Carpinetum 972 1042 970 710 752 952 1052 748 446	Asa 349 1077 1228 1206
Ensemble spécifique commun aux forêts basophiles et aux forêts baso-thermophiles					
3618	<i>Viburnum lantana</i> L.	. x . x	x 1 + x x . x + x + + x +	x 1 x x 1 . . x x	
3621	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	. x .	1 x x . x . x x x x + x x	x x x x x + x x	x x x .
2959	<i>Primula veris</i> L.	. . . +	1 1 + . 1 . 1 . . + 1 .	. + . 2 + . 1 .	. . + .
1530	<i>Helleborus foetidus</i> L.	. . . +	1 + ... + + . .	 +	
904	<i>Iris foetidissima</i> L.				
Espèces du Carpinion:					
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	1 1 x +	1 x 2 x x x . + x + x x x .	x . x x x x x x x	x x x x
2154	<i>Potentilla sterilis</i> (L.) Garcke .	1 . . +	1 + . 1 . + . 1 . 1 . 1 .	. 1 . 1 . + . .	1 . + +
371	<i>Festuca heterophylla</i> Lmk.	. . . 1	4 + . 1 + 1 . 2 . 1 . .	. . + 2 . + . .	1 1 1 1
Caractéristiques et différentielles des groupements:					
1615	<i>Ranunculus auricomus</i> L.	2 3 . +	. . 1	. . . 2 . 2 . .	. . 1 .
1200	<i>Mercurialis perennis</i> L.	3 . . +	. . 3 . . 2 . . 1 . .	. . 2 2 1 . . 2 . .	
968	<i>Orchis mascula</i> L.	. . . +	 + ...	. . . + 1	. . 1 .
828	<i>Ornithogalum pyrenaicum</i> L.	1 2 . +	2 1 3 . . 2 . 1 1 1 1 .	. . 1 3 . 2 . .	1 . . 1
870	<i>Narcissus pseudo-narcissus</i> L.	3 . . 2	1 3		
1012	<i>Quercus robur</i> L.	. 1 x x	1 . + . . . x + . x . x x	x . x . . . x x	
1266	<i>Asarum europaeum</i> L.			. . 2	. . . +
810	<i>Scilla bifolia</i> L.			. + 3	
516	<i>Carex digitata</i> L.			. . 1	. . 1 .
2628	<i>Tilia platyphyllos</i> Scop.			 x x .	. . 1 1
937	<i>Neottia nidus-avis</i> L.		 + ...	 + . .	. + . 1
1288	<i>Daphne laureola</i> L.	. 1 . .		 x x x .	x . . .
2753	<i>Cornus mas</i> L.			. . x x x . x	. x x x
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	. . x .	 x x . . .	 x x .	. . . 1
2216	<i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz .		 x	 x . x	x x x x
930	<i>Cephalanthera longifolia</i> (Huds.) Fr.		. . . + . . . 1 . . .		. + . .
929	<i>Cephalanthera rubra</i> (L.) L.C. Rich.				. . . 1
2218	<i>Sorbus latifolia</i> (Lmk.) Pers.				. . . x
2427	<i>Colutea arborescens</i> L.				
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.		. . x . + x + . + x x x x x	x x . . . x . x	x . x x
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	. . . x	 x		x . . x
3403	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	. . . 1		. . + 1	. . 1 .
2750	<i>Rhamnus catharticus</i> L.		 x	. + x	. . . x
3568	<i>Rubia peregrina</i> L.		. . . 1 . . . 1 . . .		. + . 1
928	<i>Limodorum abortivum</i> L. Sw.				
847	<i>Polygonatum odoratum</i> (Miller) Druce		. . 1 . . . 1 . . 1 . .	. . 1	1 . . .
954	<i>Orchis purpurea</i> Huds.		. . 1		1 . . .
3466	<i>Calamintha officinalis</i> Moench.	. . . 1	. . . 1 + ...		
92	<i>Juniperus communis</i> L.				
3552	<i>Vincetoxicum hirundinaria</i> Medic.				
3364	<i>Teucrium chamaedrys</i> L.				
2227	<i>Prunus mahaleb</i> L.				
1633	<i>Thalictrum minus</i> L.				
2812	<i>Bupleurum falcatum</i> L.				
3250	<i>Melampyrum cristatum</i> L.				
1475	<i>Silene nutans</i> L.				
741	<i>Anthericum ramosum</i> L.				
2284	<i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link.				
2210p	<i>Pyrus pyraaster</i> Burgesd.				
2891	<i>Peucedanum cervaria</i> (L.) Lap.				
2150	<i>Fragaria viridis</i> Duch.				
1981	<i>Hypericum montanum</i> L.				
3083	<i>Buglossoides purpureocaerulea</i> I.M. Jh.		. . 1 . . 1 . . 1 1 + 1 1 .		
509	<i>Carex montana</i> L.		 1 . 1 .		
1648	<i>Berberis vulgaris</i> L.				
2133	<i>Filipendula vulgaris</i> Moench.				
2663	<i>Geranium sanguineum</i> L.				
3766	<i>Aster amellus</i> L.				
2095	<i>Rosa pimpinellifolia</i> L.				
2092	<i>Spirea hypericifolia</i> ssp. obovata Dst.				
2912	<i>Laserpitium latifolium</i> L.				
3904	<i>Tanacetum corymbosum</i> Schultz-Bip.				
4121	<i>Scorzonera hispanica</i> L.				
3761	<i>Aster linosyris</i> (L.) Bernh.				
4903	<i>Hypochoeris maculata</i> L.				
4069p	<i>Centaurea triumfetti</i> ssp. lugdunensis				
2899	<i>Peucedanum alsaticum</i> L.				

THERMOPHILES - PRESENTATION SYNTHETIQUE SIMPLIFIEE

EN ION	transition	QUERCION PUBESCENTI - PETRAEAE			
		Rubio-Quercetum Fagetosum	Rubio-Quercetum Ornithogaleetosum	faciès péri-forestier	
1205	158	949	2001	413	2004
1206	966	115	1952	1033	1306
1207	1229	115	1032	343	1307
1208	1376	1078	118	2007	1308
1209	1376	444	123	1309	
1210	570	111	140	1310	
1211	1028	1104	358	1311	
1212		117	831	1312	
1213		76	1943	1313	
1214		1047	124	1314	
1215		984	280	1315	
1216		110	164	1316	
1217		112	175	1317	
1218		1076	1308	1318	
1219		114			
1220		1030			
1221		116			
1222		106			
1223		857			
1224		2001			
1225		1952			
1226		1032			
1227		118			
1228		123			
1229		358			
1230		831			
1231		1943			
1232		124			
1233		280			
1234		164			
1235		175			
1236		1308			
1237					
1238					
1239					
1240					
1241					
1242					
1243					
1244					
1245					
1246					
1247					
1248					
1249					
1250					
1251					
1252					
1253					
1254					
1255					
1256					
1257					
1258					
1259					
1260					
1261					
1262					
1263					
1264					
1265					
1266					
1267					
1268					
1269					
1270					
1271					
1272					
1273					
1274					
1275					
1276					
1277					
1278					
1279					
1280					
1281					
1282					
1283					
1284					
1285					
1286					
1287					
1288					
1289					
1290					
1291					
1292					
1293					
1294					
1295					
1296					
1297					
1298					
1299					
1300					

Le signe x indique la présence en strates arborescentes ou arbustive mais non en strate herbacée.

TABLEAU 117

LOCALISATION DES RELEVES DE FORETS BASO - THERMOPHILES
ET LISTE DES ESPECES PRESENTES UNE FOIS

- 76 - La Masserie, entre Ciez et Entrains-sur-Nohain, Nièvre. - *Quercus petraea* Liebl.: taillis, l, arbustes, +; niveau inférieur, +; - *Lithospermum officinale* L., +; - *Linum tenuifolium* L., +; - *Achillea millefolium* L., +.
- 106 - Bois entre Ciez et Entrains-sur-Nohain, Nièvre.
- 108 - Ciez, Nièvre. - *Salix cinerea* L.: arbustes, +; - *Listera ovata* (L.) Br., l; - *Pyrus communis* L.: arbustes, +.
- 110 - Butte de Courcelles, au Nord-Est de Brinon-sur-Beuvron, Nièvre. - *Pulmonaria montana* Lej., +; - *Brachythecium rutabulum* (L.) B.E., +.
- 111 - Grenois, Nièvre. - *Weisia viridula* (L.) Hedw., +.
- 112 - Villiers-sur-Yonne, butte de Saligny, Nièvre.
- 114 - Bois du Parloir, Dornecy, Nièvre.
- 115 - Bois du Parloir, Dornecy, Nièvre.
- 116 - Bois du Parloir, Dornecy, Nièvre. - *Isoetecium viviparum* (Neck.) Lindb., +.
- 117 - Grand-Montois, Varzy, Nièvre. - *Polypodium vulgare* L., +.
- 118 - Mont-Givre, Pouques-les-Eaux, Nièvre.
- 119 - Mimont, Parigny-les-Vaux, Nièvre. - *Laburnum anagyroides* Medic.: taillis, +; arbustes, +; niveau inférieur, l; - *Acer monspessulanum* L.: taillis, l; - *Spartium junceum* L.: arbustes, +; - *Sequoia sempervirens* (Lamb.) Endl.: futaie, +.
- 123 - Bué, Cher. - *Juglans regia* L.: arbustes, +.
- 124 - Bué, Cher. - *Abies alba* Miller: arbustes, +.
- 158 - Les Garennes, Châteauneuf-Val-de-Bargis, Nièvre. - *Betula pendula* Roth.: niveau inférieur, +; - *Ajuga reptans* L., +.
- 164 - Soye, Cher. - *Viola odorata* L., +; - *Plagiochila asplenoides* (L.) Dum., l; - *Mnium affine* Bland, l/2; - *Brachythecium salebrosum* (Hoff.) B.E., +.
- 175 - Soye, Cher.
- 343 - Bois de Bouard, Serruelles, Cher. - *Ranunculus bulbosus* L., +; - *Pimpinella major* (L.) Huds., +.
- 358 - Bois de Faitin, Plaimpied, Cher. - *Arenaria serpyllifolia* L., +.
- 413 - Bois de Bouard, Serruelles, Cher. - *Carex caryophyllaea* Latour., +; - *Leontodon hispidus* L., +.
- 444 - Mont-Vigne, Pouques-Lormes, Nièvre; versant Sud.
- 570 - Bois de Couy, Montigny, Cher. - *Agrimonia eupatoria* L., +; - *Carex sylvatica* Huds., l/2.
- 576 - Les Ferrands, Montigny, Cher.
- 740 - Châteauneuf-sur-Cher, Cher. - *Fumana procumbens* (Dun.) Gren., +.
- 831 - Bois du Palais, Villeneuve-sur-Cher, Cher. - *Trichostomum crispulum* Bruch., +.
- 832 - Le Bout-des-Ponts, St-Florent, Cher. - *Hypericum perforatum* L., +; - *Veronica chamaedrys* L., +.
- 857 - Les Carrés, Alligny-Cosne, Nièvre. - *Ophrys apifera* Huds., +.
- 949 - Mont-Brivois, Brèves, Nièvre; versant Sud. - *Himantoglossum hircinum* (L.) Spr., +; - *Cratoneuron filicinum* (L.) Roth., +.
- 966 - Bois-Giraud, Ciez, Nièvre. - *Ranunculus auricomus* L., l; - *Luzula forsteri* (Sm.) D.C., +.
- 984 - Villaine, Varzy, Nièvre. - *Hieracium vulgatum* Fr., +.
- 1028 - Picarnon, Ciez, Nièvre.
- 1030 - Route des Escargots, Bouy, Nièvre.
- 1032 - Plou, Cher. - *Cruciata loevipes* Opiz., +.
- 1033 - Plou, Cher. - *Salvia pratensis* L., +.
- 1047 - Petit-Montois, Varzy, Nièvre. - *Globularia punctata* Lapeyr., +.
- 1076 - Les Brûlés, Armes, Nièvre. - *Acer platanoides* L.: arbustes, +; - *Homalothecium sericeum* (L.) B.E., +.
- 1078 - Les Brûlés, Armes, Nièvre. - *Picris hieracioides* L., +.
- 1104 - Mont-Martin, Dornecy, Nièvre. - *Primula elatior* (L.) Hill., l; - *Convallaria majalis* L., l; - *Entodon orthocarpus* Lindb., l/2.
- 1115 - Mont-Martin, Dornecy, Nièvre; versant Sud. - *Campanula glomerata* L., l; - *Hieracium laevigatum* Willd., +; - *Fissidens cristatus* Wils, l/2.
- 1229 - Mont-Martin, Dornecy, Nièvre; versant Sud-Ouest. - *Carex digitata* L., +; - *Carex pairaei* Schultz, l/2; - *Glechoma hederacea* L., l; - *Arabis hirsuta* (L.) Scop., +.
- 1306 - La Périssette, Dun-sur-Auron, Cher. - *Genista pilosa* L., l; - *Koeleria vallesiana* (Honck.) Bert., +.
- 1307 - Chavannes, Cher.
- 1308 - Chavannes, Cher.
- 1376 - Bois des Margaux, Rians, Cher. - *Pseudotsuga menziesii* (Mirbel) Franco: futaie, +; - *Robinia pseudacacia* L.: taillis, +; - arbustes, +.
- 1943 - Bois du Palais, Villeneuve-sur-Cher, Cher. - *Cytisus scoparius* (L.) Link.: arbustes, +; - *Melampyrum arvense* L., +.
- 1953 - Bois du Montet, Villeneuve-sur-Cher, Cher.
- 2001 - Bois de Fleuret, Uzay-le-Venon, Cher.
- 2003 - Bois de Fleuret, Uzay-le-Venon, Cher. - *Calamagrostis epigeios* (L.) Roth., l; - *Cirsium tuberosum* (L.) All., l.
- 2004 - Bois de Fleuret, Uzay-le-Venon, Cher. - *Cladonia furcata* (Huds.) Schrad., +.
- 2280 - Bois de la Corne, Morthomiers, Cher.



Fig. 311 - Forêts neutroclines, acidoclines, acidophiles; -graphe relevés.

- 1 - groupe des forêts acidophiles (chêne et hêtre).
- 2 - groupe des forêts acidoclines ou neutroclines (chêne, hêtre, charme).
- 3 - groupe des forêts (chêne) acidophiles ou acidoclines sur sol hydromorphe.




Fig. 312 - Graphe espèces simplifié du Peucedano-Quercetum.

- 1 - Espèces de l'Ordre des Quercetalia robori-petraeae.
- 2 - Espèces de l'Alliance du Quercion robori-petraeae.
- 3 - Espèces du Peucedano-Quercenion.
- ★ 4 - Différentielles.

52 - <i>Pteridium aquilinum</i>	1213	- <i>Euphorbia villosa</i>	2945	- <i>Calluna vulgaris</i>
246 - <i>Deschampsia flexuosa</i>	1220	- <i>Euphorbia hyberna</i>	2948	- <i>Erica cinerea</i>
277 - <i>Holcus mollis</i>	1224	- <i>Euphorbia dulcis</i>	2952	- <i>Erica scoparia</i>
279 - <i>Sieglingia decumbens</i>		ssp. <i>angulata</i>	3123	- <i>Pulmonaria angustifolia</i>
329 - <i>Molinia caerulea</i>	1988	- <i>Hypericum pulchrum</i>	3230	- <i>Veronica officinalis</i>
373p - <i>Festuca filiformis</i>	2166	- <i>Potentilla erecta</i>	3359	- <i>Teucrium scorodonia</i>
438 - <i>Brachypodium pinnatum</i>	2214	- <i>Sorbus torminalis</i>	3403	- <i>Melittis melissophyllum</i>
510 - <i>Carex pilulifera</i>	2219	- <i>Sorbus domestica</i>	3428	- <i>Stachys officinalis</i>
538 - <i>Carex pallescens</i>	2250	- <i>Genista pilosa</i>	4039	- <i>Serratula tinctoria</i>
716p - <i>Luzula multiflora</i>	2270	- <i>Ulex minor</i>	4117	- <i>Scorzonera humilis</i>
737 - <i>Asphodelus albus</i>	2273	- <i>Cytisus scoparius</i>	4206	- <i>Hieracium lachenalii</i>
1011 - <i>Castanea sativa</i>	2557	- <i>Lathyrus montanus</i>	4214	- <i>Hieracium laevigatum</i>
1012 - <i>Quercus robur</i>	2714	- <i>Frangula alnus</i>	4215	- <i>Hieracium umbellatum</i>
	2896	- <i>Peucedanum gallicum</i>	4216	- <i>Hieracium sabaudum</i>

Fig 313 - Les sous-unités du *Peucedano-Quercetum*; - graphe mixte relevés / espèces.

- 1 - sous-association *typicum*
- 2 - sous-association *Euphorbietosum*
- 3 - différencielles de la sous-association *Euphorbietosum*
- 4 - espèces des *Calluno-Ulicetea*
- 5 - *Luzula multiflora*

QPB - espèces de la chênaie pubescente et de ses lisières





Fig. 314 - Essai de définition de la sous-alliance du PEUCEDANO-QUERCENION: comparaison des relevés effectués dans le Bassin Parisien méridional avec des individus d'associations définies dans d'autres régions.





★ 13 ★ 14 ★ 15 ★ 16 ★ 17 ★ 18

★ 19 ★ 20 ★ 21 ★ 22 ★ 23

- 1 - Bodeux: *Quercetum sessiliflorae medioeuropaeum* (Haute Campine).
- 2 - Bournérias: Chênaie sessiliflore silicicole (Forêt de Beine).
- 3 - Braun-Blanquet: *Blechno-Quercetum roboris subass. tametosum* (Pays basque).
- 4 - Braun-Blanquet: *Festuco - Quercetum pyrenaicae* (Pays basque).
- 5 - Braun-Blanquet: *Illici-Fagetum* (Pays basque).
- 6 - Braun-Blanquet: *Peucedano-Quercetum pyrenaicae* (Sologne).
- 7 - Braun-Blanquet: *Betulo-Quercetum* (Sologne).
- 8 - Duchaufour: Chênaie claire en sol humide (secteur ligérien).
- 9 - Duchaufour, Bonneau, de Bazac, Pardé: Chênaie hygrophile à chêne pédonculé et charme (Argonne).
- 10 - Gehu: *Quercetum sessiliflorae* (Bassin de la Sambre française).
- 11 - Lapraz: *Periclymeno-Quercetum occidentale* (Entre-Deux-Mers).
- 12 - Lemée: *Querceto-Holcetum mollis* (Perche).
- 19 - Roisin: *Luzulo-Quercetum Dryopteridetosum* (Massif Ardennais).
- 20 - Roisin et Thill: *Quercetum atlanticum convallarietosum* (district picardo-brabançon).
- 21 - Roisin et Thill: *Quercetum sessiliflorae medioeuropaeum* (district picardo-brabançon).
- 22 - Roisin et Thill: *Quercetum atlanticum typicum* (district picardo-brabançon).
- 23 - relevés personnels (Sud du Bassin Parisien).

- 13 - Lemée: *Quercetum roboris parisiense* (Perche).
- 14 - Lemée: *Quercetum sessiliflorae occidentale Illicetosum* (Perche).
- 15 - Lemée: *Quercetum sessiliflorae occidentale* (Perche).
- 16 - Roisin: *Luzulo-Quercetum* (Massif Ardennais).
- 17 - Roisin: *Luzulo-Fagetum* (Massif Ardennais).
- 18 - Roisin: *Luzulo-Quercetum molinietosum* (Massif Ardennais).

CHENAIES

ACIDOCLINES - ACIDOPHILES

PEUCEDANO -

		PEUCEDANO QUERCETUM TYPICUM																			
		Variante à <i>Luzula multiflora</i>																			
		142	155	53	121	1018	1272	1268	98	1273	590	1392	70	2020	69	1271	141	258	1006	559	2021
Pente en degrés Exposition		.	5	.	.	1	.	1	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.
		E				S		N				NW		N				W			
FUTAIE																					
Recouvrement %:		10	5	.	10	25	30	45	20	40	20	.	65	10	5	30	15	30	80	10	5
moyenne:		20																			
1012	<i>Quercus robur</i> L.	+	.	.	1	.	.	22	.	.	+	.	.	.	1	.	1	2	.	+	.
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	.	.	.	22	2	.	1	2	+	.	3	1	.	2	.	.	42	+	+
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Pinus</i> sp. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TAILLIS																					
Recouvrement %:		50	60	90	30	65	"	"	70	"	"	80	"	70	"	40	15	30	20	35	70
moyenne:		50																			
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	+	+	12	.	.	.	*	1	*	.	+	.	.	*	.	1	.	.	+	.
1011	<i>Castanea sativa</i> Miller	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2229	<i>Prunus avium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	1	*	.	.	*	.	*	.	.	.	.	.	.
2213	<i>Malus sylvestris</i> Miller	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	+	.	.	.	22	.	*	.	.	.	.	.	.	+	12	.	32
1012	<i>Quercus robur</i> L.	3	.	44	1	.	.	*	+	.	.	.	*	.	*	.	12	.	.	1	.
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	32	.	.	33	*	.	12	*	.	32	.	32	.	22	.	+	1	12	1
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	12	*	+	*	.	.	.	.	.	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	1	1	.	.	.	1	.	*	.	.	.	.	.	.	2	.	1	.
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Pinus</i> sp. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
NIVEAU ARBUSTIF																					
Recouvrement %:		10	15	5	10	5	40	60	15	40	25	10	15	20	30	15	50	15	10	15	15
moyenne:		20																			
Espèces des strates supérieures:																					
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	.	.	+	.	.	1	.	.	1	1	.	.	.	22	.	1	.	.	.	.
1011	<i>Castanea sativa</i> Miller	.	2	.	.	.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	.	.	12	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1
2229	<i>Prunus avium</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	1	.	.	+	+	.	1	.	.	.	.	.	.
1012	<i>Quercus robur</i> L.	+	.	.	.	.	.	1	+	.	+	.	+	.	12	.	2	1	.	+	.
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	1	.	.	+	1	.	.	1	.	.	22	2	.	1	.	+	1	1	.
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	+	1	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	+	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.
	<i>Abies</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

Le signe * indique la présence potentielle dans la strate de taillis (présence en strate arbustive), momentanément oblitérée par le traitement auquel la forêt est soumise.
Le signe () rappelle la présence dans une strate autre que la strate inférieure.

SUR SOLS HYDROMORPHES

Q U E R C E N I O N.

		PEUCEDANO										QUERCETUM										EUPHORBIETOSUM										faciès thermo- phile				Type morphologique Forme biologique	Ecologie						Sociologie	Groupe phytogéographique
435	810	144	1279	1391	1260	437	807	1036	1003	1840	1830	2017	780	779	1851	436	143	2007	2006	1859	1945	1944	1862	1860	lumière	chaleur	humidité	mor moder	mull	mull	calcaique													
.	.	.	.	.	.	1 W	.	1 SW	1 W	.	.	.	.	1 NW	.	.	1 E	.	.	.	.	.	.	.	.																			
25	10	40	20	30	45	5	"	60	40	60	45	"	10	10	10	10	35	"	15	45	10	5	15	15																				
2	.	1	.	.	22	.	.	22	.	22	22	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		PhM	L		3-4	-	-	-	FR	5										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		PhM	L		2 X 4	-	-	-	FR	3										
.	1	1	1	1	+	.	.	1	22	32	.	.	.	.	1	1	2	.	1	1	+	.	.	.		PhM	L		3	-	-	-	FR	5										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		PhM			2-4	-	-	-	FG	55										
.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		PhM			4	-	-	-	FR	4										
.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1		PhM	1		3	-	-	-	FG	5										
.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1		PhM				-	-	-												
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.		PhM	L	T	2	-	-	-	QP	54										
60	70	"	30	20	30	75	60	20	30	40	15	65	60	60	50	40	30	70	60	15	70	70	"	15																				
.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm	L		2 X 4	-	-	-	FR	3										
.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm	1	t	3	-	-	-	QR	53										
.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm	1	t	3	-	-	-	FG	4										
.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm			3-4	-	-	-	PR	5										
+	12	*	.	1	.	+	.	12	12	.	1	33	32	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm			2-4	-	-	-	FG	55										
.	.	.	1	1	1	.	22	1	.	.	1	33	32	32	.	.	1	2	2	2	32	+	.	1		Phm	L		2-4	-	-	-	FR	5										
.	3	.	1	1	.	32	22	.	22	.	.	.	.	.	1	2	2	2	32	+	22	32	*	.		Phm	L		3	-	-	-	FR	5										
.	1	*	.	.	.	.	.	+	.	2	1	.	1	.	.	2	.	.	1	.	.	.	*	.		Phm	L	t	2-4	-	-	-	FR	4										
1	.	*	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.		Phm			4	-	-	-	FR	4										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm	1		3	-	-	-	FG	5										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+		Phm				-	-	-												
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phm	L	T	2	-	-	-	QP	52										
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	*	.		Phm	L	T	2	-	-	-	QP	54									
10	10	15	20	30	40	15	20	10	15	35	30	15	5	15	45	30	25	30	30	20	20	15	40	20																				
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.		Phn	L		2 X 4	-	-	-	FR	3										
.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phn	1	t	3	-	-	-	QR	53										
+	+	2	.	1	.	.	.	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.		Phn			2-4	-	-	-	FG	55										
+	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.		Phn	1	t	3	-	-	-	FG	4										
.	.	+	+	.	1	.	+	+	.	.	+	1	+	+	+	.	.	+	.	1	.	.	1	.		Phn	L		2-4	-	-	-	FR	5										
.	.	+	1	1	.	1	+	.	1	+	.	.	.	.	+	1	.	1	1	1	1	1	1	1		Phn	L		3	-	-	-	FR	5										
.	.	+	+	1	+	+	1	+	1	1	1	.	+	+	+	1	1	1	+	1	.	.	2	+		Phn	L		2-4	-	-	-	FR	4										
.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		Phn			4	-	-	-	FR	4										
.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.		Phn				-	-	-												

		PEUCEDANO QUERCETUM TYPICUM																				
		Variante à <i>Luzula multiflora</i>																				
		142	155	53	121	1018	1272	1268	98	1273	590	1392	70	2020	69	1271	141	258	1006	559	2021	
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	<i>Pinus</i> sp. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1014	<i>Quercus pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Arbustes et arbrisseaux:																						
2744	<i>Frangula alnus</i> Miller	1	1	+	1	+	1	1	1	1	+	1	1	.	.	12	1	1	1	1	.	
3627	<i>Lonicera periclymenum</i> L.	+	1	+	1	+	1	+	.	+	.	.	1	+	1	1	1	.	.	.	+	
2213	<i>Malus sylvestris</i> Miller	+	+	+	1	.	.	.	+	.	.	+	1	.	1	.	.	+	.	+	.	
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	.	.	.	.	.	+	12	.	1	.	.	.	+	.	+	1	.	.	+	1	
	<i>Rubus fruticosus</i> L. coll.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	
2205	<i>Crataegus laevigata</i> (Poiret) D.C.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	
2273	<i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	+	.	.	.	12	.	.	.	.	.	
2945	<i>Calluna vulgaris</i> (L.) Hull	.	.	.	1	.	12	.	.	12	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	
2114	<i>Rosa arvensis</i> Huds.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3617	<i>Viburnum opulus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	
	<i>Rosa</i> sp.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
2204	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	+	.	1	.	
2208	<i>Mespilus germanica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	1	.	12	.	.	
2737	<i>Ilex aquifolium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	.	1	.	.	
92	<i>Juniperus communis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
2230	<i>Prunus spinosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	
2270	<i>Ulex minor</i> Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2952	<i>Erica scoparia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3564	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3618	<i>Viburnum lantana</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NIVEAU INFÉRIEUR DE VÉGÉTATION																						
Recouvrement %:		80	70	45	35	50	50	90	50	65	85	55	45	25	90	60	60	65	70	60	20	
moyenne:																	60					
ENSEMBLE SPÉCIFIQUE CARACTÉRISTIQUE:																						
Espèces des <i>Quercetalia robori-petraeae</i> :																						
3359	<i>Teucrium scorodonia</i> L.	1	1	2	1	1	2	1	1	2	2	2	1	1	2	1	1	1	1	1	.	
1988	<i>Hypericum pulchrum</i> L.	1	.	.	+	+	.	.	1	.	1	+	+	.	.	.	1	1	+	.	.	
4215	<i>Hieracium umbellatum</i> L.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	1	+	.	.	
2557	<i>Lathyrus montanus</i> Bernh.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	
4216	<i>Hieracium sabaudum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Espèces du <i>Peucedano-Quercenion</i> :																						
2896	<i>Peucedanum gallicum</i> Latourr.	.	1	1	1	.	.	2	.	2	1	1	1	1	1	+	1	1	1	1	1	
1012	<i>Quercus robur</i> L.	+	.	1	()	.	.	1	()	.	.	+	.	.	()	.	1	()	.	+	.	
2744	<i>Frangula alnus</i> Miller	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	+	.	.	.	+	()	()	()	.	.	
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	()	()	.	()	.	.	.	.	.	()	()	()	1	.	.	.	.	.	.	
438	<i>Brachypodium pinnatum</i> (L.) Beauv.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3428	<i>Stachys officinalis</i> (L.) Trev.	.	.	.	.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	12	1	1	.	+	1	
3123	<i>Pulmonaria angustifolia</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	+	
3403	<i>Melittis melissophyllum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4039	<i>Serratula tinctoria</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
1220	<i>Euphorbia hyberna</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
737	<i>Asphodelus albus</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1213	<i>Euphorbia villosa</i> Waldst. et Kit.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1224	<i>Euphorbia dulcis</i> L. ssp. <i>angulata</i> Rouy .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

		PEUCEDANO QUERCETUM EUPHORBIETOSUM																				faciès thermo-phile				Type morphologique Forme biologique	Ecologie					Sociologie	Groupe phytogéographique	
435	810	144	1279	1391	1260	437	807	1036	1003	1840	1830	2017	780	779	1851	436	143	2007	2006	1859	1945	1944	1862	1860	lumière		chaleur	humidité	mor moder mull mull calcique					
.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	Phn	1		3	-	-	-	FG	5
.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn				-	-	-			
.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	Phn	L	T	2	-	-	-	QP	52	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	+	.	Phn	L	T	2	-	-	-	QP	54
1	+	.	1	1	1	+	2	1	.	1	1	1	.	+	1	+	1	.	1	1	.	.	1	1	Phn	1		3 X 5	-	-	-	QR-AL	4	
.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	+	+	.	+	+	.	1	.	.	.	+	.	.	+	Phl	1		2	-	-	-	FR	4	
.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	Phn			3-4	-	-	-	PR	5	
+	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn	1		3	-	-	-	QF	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	+	+	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	1	+	Phn	L		3	-	-	-	FR-PR	4	
1	+	.	+	.	.	.	.	.	.	+	+	.	1	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	Phn			3-4	-	-	-	QF	4	
.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	.	.	Phn	L		3-4	-	-	-	CU	51	
+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	12	.	.	Phn	1		2 X 4	-	-	-	CU	3	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn			2-3	-	-	-	FG	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Phn			3-4	-	-	-	PR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Phn	L		3	-	-	-	PR	4	
.	.	.	1	.	.	.	1	.	+	1	+	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	1	1	.	Phn	1		2-4	-	-	-	PR	4	
.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	Phn	1	t	2	-	-	-	PR	44	
.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Phn			3-4	-	-	-	FR	52	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	1	1	.	1	.	.	1	.	.	.	1	.	Phn	L		2-4	-	-	-	(PR)	2	
.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	1	.	+	1	.	1	.	1	.	1	.	.	1	1	1	2	Phn	1	t	2-3	-	-	-	PR	4
.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Phn	L		3	-	-	-	CU	51	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	1	.	.	2	2	Phn	L		4-5	-	-	-	CU	52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	1	.	.	Phn	1		1-3	-	-	-	PR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	1	.	.	Phn	1	t	2-3	-	-	-	PR	44	
95 50		85	80	60	75	45	80	50	50	70	65	70	40	80	50	55	35	40	45	60	40	60	90	90	Hm	1		2-4	-	-	-	QR-OR	51	
.	1	.	2	1	1	1	2	1	1	.	.	1	.	.	.	.	1	+	.	1	1	1	.	.	Hm			2-4	-	-	-	QR	51	
1	.	2	.	.	.	.	1	1	.	.	1	+	+	1	.	+	.	.	+	+	.	+	+	.	Hm	1	t	2-4	-	-	-	QR-CU	2	
.	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm			2-3	-	-	-	QR	5	
1	1	1	.	.	.	.	.	+	1	1	+	1	+	+	+	.	+	+	+	.	.	.	.	.	Hm	1	t	2-3	-	-	-	QR	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1		2-3	-	-	-			
2	1	1	2	1	+	1	2	2	1	.	1	2	1	.	2	2	1	+	1	+	1	2	.	1	Hm	1		2 X 4	-	-	-	QR	51	
()	.	()	()	1	1	.	()	()	.	+	+	+	()	()	()	.	.	()	.	1	.	.	.	+	Ch	L		3-4	-	-	-	FR	5	
()	()	.	()	()	()	()	()	.	+	()	()	.	()	()	()	+	.	+	()	.	.	.	.	.	Ch	1		3 X 5	-	-	-	QR-AL	4	
.	()	()	()	1	()	()	()	()	()	.	.	()	1	()	()	1	+	+	()	.	.	.	.	.	Ch	L	t	2-4	-	-	-	FR	4	
.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	12	1	1	12	1	1	.	.	.	.	12	22	33	22	Hm	1		2 X 4	-	-	-	FB-QR	4	
1	1	.	.	.	.	2	1	1	+	1	2	.	2	+	1	.	.	.	+	.	1	.	.	.	Hm	1		2 X 4	-	-	-	FR-OM	4	
1	1	1	.	.	.	2	1	1	+	1	1	1	1	1	+	1	1	+	1	1	1	1	1	1	Hm		t	2 X 4	-	-	-	FR	(51)	
.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	.	.	.	Hm	1	T	2-3	-	-	-	QP-OR	54	
1	1	.	.	.	.	+	1	+	.	.	2	.	.	.	.	1	.	.	+	+	.	.	1	1	Hm	1	t	2 X 4	-	-	-	FR-MJ	4	
.	.	+	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm			3	-	-	-	FR	51m	
.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	2	1	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	1	.	G	L		2 X 4	-	-	-	QR-CU	52	
.	.	.	.	.	.	.	1	()	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	Ch	L	T	2	-	-	-	QP	52	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	2	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm-HI			4-5	-	-	-	QR	3	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	+	Hm			2 X 4	-	-	-	QR-CU	53	

[illegible]

SUR SOLS HYDROMORPHES : PEUCEDANO - QUERCENION.

		PEUCEDANO QUERCETUM TYPICUM																	faciès thermo-phile				Type morphologique Forme biologique	Ecologie						Sociologie	Groupe phytogéographique		
435	810	144	1279	1391	1260	437	807	1036	1003	1840	1830	2017	780	779	1851	436	143	2007	2006	1859	1945	1944	1862	1860	lumière	chaleur	humidité	mor moder mull	mull calcaire				
.	.	.	.	.	()	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	t	3	-	-	-	QR	53
.	1	.	.	.	.	2	.	.	+	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		2 X 3	-	-	-	QR-CU	5	
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Hm		3	-	-	-	QR-CU	3	
.	.	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch		2-3	-	-	-	FR	2	
.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	Hm	1	2 X 4	-	-	-	QR-CU	51	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		2 X 4	-	-	-	CU	2	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		2-4	-	-	-	CU	2	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	2 X 3	-	-	-	CU	2	
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	3	-	-	-	CU-QR	2	
.	.	+	1	1	12	1	.	1	+	.	1	.	1	2	1	+	1	1	1	2	()	12	12	22	Ch	L	2 X 4	-	-	-	CU	3	
.	1	()	()	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	3-4	-	-	-	CU	51	
.	2	.	32	33	.	2	22	.	1	.	.	.	.	.	22	.	1	.	.	22	1	.	.	.	G	L	2 X 4	-	-	-	CU	1	
12	+	.	.	1	.	12	.	+	+	.	.	.	+	+	.	1	1	.	.	.	12	12	.	.	Hm		2-3	-	-	-	CU	3	
1	.	1	+	.	+	.	.	1	.	+	+	1	+	+	+	1	.	+	.	1	.	+	1	.	Hm	1	2 X 4	-	-	-	CU-MJ	4	
.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	+	1	.	.	.	.	Ch	L	2	-	-	-	CU	51	
.	.	()	()	+	+	+	.	+	.	.	+	+	.	.	.	.	.	()	+	1	.	.	12	.	Ch	L	3	-	-	-	CU	51	
.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	Hm	L	2	-	-	-	CU-FB	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	2-3	-	-	-	CU	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		2 X 4	-	-	-	CU-QR	51	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	()	()	()	.	.	1	()	Ch	1	1	3 X 4	-	-	-	CU	52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	Hm	L	3 X 5	-	-	-	CU	51	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	Hm		2 X 4	-	-	-	CU-N	3	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm								
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	T	1-2	-	-	-	QP-OR	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	T	2-3	-	-	-	QF-OR	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	L	T	2	-	-	-	QP	54
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch		T	2	-	-	-	QP	52
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	T	2	-	-	-	OR-QP	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	Te	1 X 3	-	-	-	OR-FB	4
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	t	2-3	-	-	-	OR	44
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm								
.	12	.	12	12	.	12	32	+	22	.	12	12	22	.	.	+	.	12	+	.	.	.	.	.	Hm	1		3	-	-	-	FR	2
.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		2-4	-	-	-	-	FR	2
.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		2-3	-	-	-	-	FR	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		3	-	-	-	-	FR	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	1	1-4	-	-	-	-	FR	2
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm								
.	.	22	22	12	12	.	1	33	+	43	12	32	22	22	.	.	12	22	12	22	.	.	22	44	Hm	1		4 X 5	-	-	-	MJ	2
2	2	.	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Ch1	1		2-4	-	-	-	FR	4
.	1	1	.	2	.	1	22	.	1	1	2	1	1	1	.	1	.	1	12	.	.	.	.	+	Th	1		2-4	-	-	-	FR	3
.	.	.	.	.	22	12	12	12	.	.	12	12	.	.	.	.	12	.	12	.	12	.	.	.	B			2-4	-	-	-	FR	2
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L		2 X 3	-	-	-	AR-QR	1

Variante à
Luzula multiflora

SUR SOLS HYDROMORPHES : PEUCEDANO - QUERCENION.

		PEUCEDANO QUERCETUM EUPHORBIETOSUM																	faciès thermo- phile		Type morphologique Forme biologique	Ecologie					Sociologie	Groupe phytogéographique					
435	810	144	1279	1391	1260	437	807	1036	1003	1840	1830	2017	780	779	1851	436	143	2007	2006	1859	1945	1944	1862	1860	lumière	chaleur	humidité	mor moder	mull	mull calcaire			
.	.	.	() ()	.	.	.	.	.	()	.	.	()	.	() ()	.	() ()	.	() ()	.	12	.	.	.	.	.	Ch		3-4	-			PR	5
.	.	1	1	.	.	1	2	.	1	12	2	.	.	.	.	.	1	.	.	12	.	.	.	.	.	Hm	1	3	-			CU-AR	2
.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	G		2-4	-			QF	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	s	2-4	-			AL-FG	2	
.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		2 X 4	-			MJ-EP	2	
2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	4	-			AR-MJ	3	
1 +	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	1	.	.	.	.	+	1	.	1	1	.	.	.	+	Hm		2-3	-			FR	4	
.	.	.	() ()	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	Ch		3-4	-			FR	52	
1 22	1 1 1	1	.	1	.	+	1	1	1	1	.	2	2	1	.	1	.	.	12	1	.	.	.	.	Ch1		1-4	-			QF	4	
12 +	12	.	1	.	.	12	12	+	12	.	.	.	+	+	.	+	.	.	12	+	.	.	.	.	B	s	3	-			FG	3	
() ()	.	()	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	() ()	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch		3-4	-			QF	4	
.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	Hm	1	3 X 5	-			PL	2	
.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B		2-4	-			FG	2	
12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3	-			FG	45	
1 1	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	Hm	L	2 X 4	-			MJ-N	4	
1 1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	2 X 4	-			AR-FR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	s	3-4	-			FG	2	
1 1	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	2-4	-			QF	4	
22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3	-			QF	2	
.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	t	2	-			PR	44
.	+	.	.	.	.	12	12	.	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	4-5	-			MJ-FG	1	
+	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3 X 5	-			MJ	3	
1 1	.	.	.	.	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	Hm		3	-			FG	51	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	Hm	L	2 X 4	-			AR	5	
1 +	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm	1	3	-			AR	4	
1 +	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3	-			FG	55	
.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	2	.	+	.	.	.	.	+	+	Hm	1	3 X 5	-			MJ-QF	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	G		3	-			FG	51	
.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	Hm	1	3	-			EP	2	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3	-			FG	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch		3	-			QF	54	
.	()	.	.	()	.	()	.	()	.	.	+	()	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	t	3	-			FG	4
1 1	.	.	1	1	1	1	1	1	+	1	.	12	1	2	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	.	G		3	-			FG	3
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	B	s	4-5	-			AL-FG	54	
.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	12	1	.	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	Ch		2-3	-			FG	5
+	.	.	.	.	.	1	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch		3-4	-			PR	4	
.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Hm		3	-			FG	4	
.	.	.	()	.	.	()	.	()	.	+	()	.	() ()	.	.	.	.	.	.	.	.	() ()	.	.	Ch	1	2-4	-			PR	4	
.	+	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch		3	-			QF	52	
+	32	.	.	.	.	12	.	12	32	1	.	23	12	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	+	.	Hm		2 X 4	-			FB-MJ	1
.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	2	.	.	.	.	.	.	.	Hm	s	3	-			FG	5	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	2-3	-			PR	3	
.	.	.	()	.	.	.	.	()	.	+	.	() ()	.	+	.	.	.	.	.	12	.	.	.	+	Ch	1	t	2-3	-			PR	4
.	1 12	+	.	.	.	.	.	+	.	1	.	1	+	.	.	.	()	.	.	12	.	.	.	+	Ch	1	2-4	-			AR-OR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	Ch	1	1-3	-			PR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	12	.	.	.	.	.	Hm		2-4	-			QF	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	Hm	1	3 X 5	-			MJ	51	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	()	.	.	Ch	L	3	-			PR	4	
.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	()	.	.	Ch	1	t	2-3	-			PR	44

TABLEAU 118 : CHENAIES ACIDOCLINES - ACIDOPHILES

		PEUCEDANO QUERCETUM TYPICUM																			
		Variante à <i>Luzula multiflora</i>																			
		142	155	53	121	1018	1272	1268	98	1273	590	1392	70	2020	69	1271	141	258	1006	559	2021
Espèces tolérantes:																					
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	+	.	.	.	.	()	()	.	()	.	.	.	.	.	+	()	.	.	()	()
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	()	.	.	+	.	()	.	()	()	()	()	.	.	()	.	()	.	.	()	.
	<i>Rubus fruticosus</i> L. coll.	1	1	1	1	1	1	22	1	+	1	1	1	.	1	1	3	1	1	1	1
B 721	<i>Thuidium tamariscinum</i> (Hedw.) B.E.	12	12	+	1	.	12	22	.	.	.	.	+	12	12	.	.	12	.	12	+
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	+	.	.	1	1	.	()	()	.	()	22	1	.	1	.	()	1	+	()
3754	<i>Solidago virgaurea</i> L.	.	1	.	1	1	1	1	1	+	1	1	.	+	.	1	.	+	1	.	1
B 817	<i>Pseudoscleropodium purum</i> (L.) Fleisch. .	.	12	1	12	12	22	22	12	22	.	+	.	12	12	22	12	12	.	12	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	1	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	()	.	+	.
B 840	<i>Hypnum cupressiforme</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	12	12	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.
B 856	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> Warnst.	.	.	.	+	+	.	22	.	22	22	12	.	12	.	12	12	22	.	33	12
1566	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	.
707	<i>Luzula pilosa</i> (L.) Willd.	.	.	.	+	+	+	.	1	1	1	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	()	.	.	1	.	()	.	.	.	.	.	.	()	.	.	()	.
	<i>Abies</i> sp. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
B 853	<i>Leskeobryum brevirostre</i> (Ehrh.) Fleisch. .	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.
681	<i>Juncus effusus</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.
92	<i>Juniperus communis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
	<i>Pinus</i> sp. (planté)	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

LOCALISATION DES RELEVES ET ESPECES PRESENTES UNE FOIS:

- 53 - Forêt domaniale de Bellary, canton du Bréau, au Nord de Vielmanay (Nièvre).
- 69 - Forêt communale de Raveau, près du hameau de Pêteloup (Nièvre).
- 70 - Les Accrues, Forêt domaniale de la Bertrange, près de Pêteloup (Nièvre)
- 98 - Bois au Sud-Ouest des Pontots, commune de St-Malo (Nièvre).
- 121 - Usages de St-Malo (Nièvre): *Eurhynchium stockesii* (Turn.) B.E., +.
- 141 - Les Chétifs-Bois, Sancoins (Cher).
- 142 - Bois de Bouchard, Mornay-sur-Allier (Cher).
- 143 - Bois de Pondy (Cher).
- 144 - Grands Bois de Meillant, au Nord de St-Amand-Montrond (Cher).
- 155 - L'Orme au Loup, entre Vinon et Sancerre (Cher): *Lophocholea bidentata* (L.) Dum., +; *-Cladonia glauca* Floerke, +.
- 258 - Le Bois-Clair, entre Neuvy-le-Barrois et Sancoins (Cher).
- 435 - Bois-Rabot, entre Cosne-sur-Loire et St-Martin-sur-Nohain (Nièvre): *Epilobium tetragonum* L. ssp. *tetragonum*, +.
- 436 - Bois-Rabot: *Senecio jacobea* L., +.
- 437 - Bois-Rabot.
- 559 - Bois entre Jussy - le - Chaudrier et Argenvières (Cher): *Oxyrrhynchium praelongum* (Hedw.) Warnst., +.
- 590 - Les Grands-Bois, entre la Chapelle-St-André et Entrains-sur-Nohain (Nièvre).
- 779 - Forêt d'Habert, au Nord de Morlac (Cher): *Viola reichenbachiana* Jord., 1.
- 780 - Forêt d'Habert.
- 807 - Forêt de Bornacq, au Sud-Est de Loye-sur-Arnon (Cher): *Sphagnum inundatum* Russ., 2-2.
- 810 - Forêt de Bornacq.
- 1003 - Bois de Mâron, à l'Est de Diors (Indre): *Pulmonaria* sp., 1.
- 1006 - Bois de Mâron, à l'Est de Vouillon.

SUR SOLS HYDROMORPHES : PEUCEDANO - QUERCENION.

PEUCEDANO QUERCETUM EUPHORBIETOSUM																					faciès thermo- phile	Type morphologique Forme biologique	Ecologie					Sociologie	Groupe phytogéographique		
435 810	144	1279	1391	1260	437	807	1036	1003	1840	1830	2017	780	779	1851	436	143	2007	2006	1859	1945	1944	1862	1860	lumière	chaleur	humidité	mor moder mull	calcaique			
() .	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	. . () () . . +	Ch	1	3	-	-	-	QF	4
. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	. . .	Ch	L	2 X 4	-	-	-	FR	3
+ +	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	1 1 1 + . 1 () + 1 2 () 1 + . . 1 12 + 12 12 . . + 2 1	Ch	L	3	-	-	-	FR-PR	4
+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	+ +	B		3-5	-	-	-	FR-AL	2
. . +	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	() () 1 . 1 () () 1 () . . . () () () () 1	Ch	L	3	-	-	-	FR	5
+ 1	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	1 . 1 . 1 . + 1 . 1 + . 1 + . 1 1 1 . 1 +	Hm	1	2-4	-	-	-	FR-EP	2	
. 12	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	. . + 22 12 22 12 12 . 12 . + 1 . 1 . 22 22	B		2-4	-	-	-	FR	2
. .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	() () . . . + . . . + . . .	Ch		4	-	-	-	FR	4
. .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	 + . . . + . . .	B		2-4	-	-	-	FR-CU	1
22 .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. . . 22 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	B		2-4	-	-	-	QF	2
. .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	. 1 1 . . . + 12 . . 2 . 2 . . .	G	lv	2-4	-	-	-	QF	3
() ()	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . () () . . .	. . . () . () . (																			

- 1018 - Garchizy, au sommet de la Butte (Nièvre).
 1036 - Forêt de Bommiers, Gros Buisson (Indre).
 1260 - Chez Raquet, entre Luthenay-Uxeloup et Dornes (Nièvre).
 1268 - Bois entre Avril-sur-Loire et Neuville-les-Decize (Nièvre).
 1271 - Bois de Munet, Trévol (Allier), près de la maison de garde.
 1272 - Bois de Munet, au Nord-Est de Trévol.
 1273 - Bois de Munet, Bonnefond.
 1279 - Forêt de Maulne, au Nord de Meillant (Cher).
 1391 - Forêt de Maulne.
 1392 - Bois au Nord de St-Verain (Nièvre).
 1830 - Forêt de Choeurs, Petit Quartier de Choeurs, près du carrefour du Chêne à la Danse, au Nord-Ouest de Chezal-Benoît (Cher).
 1840 - Forêt de Choeurs, la Réserve.
 1851 - Bois de Châtain, coupe au Chevreuil, à l'Ouest de Dampierre-en-Lignières (Cher): *Eupatorium cannabinum* L., +.
 1859 - Forêt de Bommiers, canton de Fontissant (Indre).
 1860 - Forêt de Bommiers, Buisson des Lacs: *Blechnum spicant* (L.) Roth, +.
 1862 - Forêt de Bommiers
 1944 - Bois du Palais, Villeneuve-sur-Cher (Cher).
 1945 - Bois du Palais.
 2006 - Forêt de Bommiers, le Riottin (Indre).
 2007 - Forêt de Bommiers, les Grandes Vallées.
 2017 - Bois-Rabot, au Sud de Cosne-sur-Loire (Nièvre).
 2020 - Bois-Rabot.
 2021 - L'Etang des Granges, au Sud de Cosne-sur-Loire (Nièvre): *Phyteuma spicatum* L. ssp. *ochroleucum* Döll, l.

TABLEAU 119

SPECTRE SOCIOLOGIQUE BRUT DU *PEUCEDANO-QUERCETUM*

	sous -association <i>typicum</i>	sous-association <i>Euphorbietosum</i> faciès thermophile
Espèces du <i>Quercion robori-petraeae</i>	4,7	3,8 0,8
Espèces du <i>Peucedano-Quercenion</i>	12,8	20,6 21,2
Espèces des <i>Quercetalia robori-petraeae</i>	7,4	6,1 3,4
Espèces des <i>Calluno-Ulicetea</i>	13,3	16,1 21,2
Espèces des <i>Querco-Fagetea</i>	24,5	21,3 18,6
Espèces des <i>Fagetalia</i>	10,8	8,3 5,9
Espèces du <i>Quercion pubescenti-petraeae</i>		7,6
autres compagnes	26,5	27,3 21,3




Fig. 315 - Spectre sociologique brut du *PEUCEDANO-QUERCETUM*.

A - sous-association *typicum*. B - sous-association *Euphorbietosum*.
C - faciès thermophile de la sous-association *Euphorbietosum*.

TABLEAU 120

SPECTRE ECOLOGIQUE DES FORETS DU *PEUCEDANO-QUERCETUM*
CLASSEMENT DES ESPECES PAR REFERENCE AU TYPE D'HUMUS

	sous-association <i>typicum</i> var à <i>Luzula</i> <i>multiflora</i>		sous-association <i>Euphorbietosum</i> faciès thermophile	
FUTAIE:				
espèces tolérantes	100,0	100,0	100,0	33,3
espèces du mull calcique				66,6
TAILLIS:				
espèces tolérantes	94,5	97,1	92,1	90,2
espèces du mull calcique-mull			0,1	
espèces du mull	1,3		0,2	
espèces du mull-moder	1,4	2,9	7,4	
espèces du moder	2,8		0,2	
ARBUSTES:				
espèces tolérantes	38,2	57,3	36,3	13,2
espèces du mull calcique				0,5
espèces du mull calcique-mull	0,2	0,1	1,6	2,4
espèces du mull	2,8	5,8	15,5	24,6
espèces du mull-moder	7,7	8,6	17,2	12,4
espèces du moder	17,9	6,9	3,5	15,0
espèces du moder-mor	25,9	19,5	23,8	5,0
espèces du mor	7,4	1,7	2,1	26,9
STRATE INFERIEURE:				
espèces tolérantes	23,9	25,6	14,1	16,3
espèces du mull calcique				2,0
espèces du mull calcique-mull			0,2	0,9
espèces du mull	0,5	4,1	13,0	7,6
espèces du mull-moder	7,4	14,9	13,2	26,2
espèces du moder	14,0	13,8	17,4	10,9
espèces du moder-mor	43,6	35,1	33,2	28,2
espèces du mor	10,7	6,6	9,0	7,9
espèces adaptées à un régime hydrique alternant	33,8	27,6	47,5	67,5

TABLEAU 121

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE DES FORETS DU *PEUCEDANO-QUERCETUM*

	sous-association <i>typicum</i>		sous-association <i>Euphorbietosum</i>	
	var. à <i>Luzula</i> <i>multiflora</i>			faciès thermophile
FUTAIE:				
3	4,6	0,1		
4			1,8	
5	95,4	99,9	96,4	33,3
Total 3 à 5	100,0	100,0	98,2	33,3
44 - 54				66,6
45 - 55			1,8	
TAILLIS:				
3	2,9	1,6	0,9	
4	6,9	12,5	13,3	
5	82,2	65,7	83,1	90,2
Total 3 à 5	92,0	79,8	97,3	90,2
42 - 52			0,1	
43 - 53	1,3		0,1	
44 - 54				9,8
45 - 55	6,8	20,2	2,5	
ARBUSTES:				
2	5,1	5,2	5,7	2,4
3	14,9	11,3	0,3	2,4
4	39,3	35,5	57,3	44,6
5	13,6	35,9	19,3	7,8
Total 2 à 5	72,9	87,9	82,6	57,2
STRATE INFÉRIEURE:				
1	14,3	9,3	12,6	10,6
2	42,6	33,6	34,6	24,6
3	15,7	19,7	17,3	14,4
4	9,5	18,7	14,2	32,6
5	4,0	3,8	4,4	1,3
Total 1 à 5	86,1	85,1	83,1	82,5
41 - 51	12,9	13,9	12,2	11,8
42 - 52		0,3	2,7	2,7
43 - 53				0,9
44 - 54			1,9	2,0
45 - 55	0,9	0,8	0,1	

TABEAU 122

STRATE INFÉRIEURE DES FORÊTS DU *PEUCEDANO QUERCETUM*
TYPE MORPHOLOGIQUE ET FORME BIOLOGIQUE DES ESPÈCES

	sous-association <i>typicum</i>		sous-association <i>Euphorbietosum</i>	
	var. à <i>Luzula</i> <i>multiflora</i>			faciès thermophile
BRYOPHYTES	25,5	20,3	15,0	17,5
SPERMATOPHYTES ET) PTERIDOPHYTES)	74,5	79,7	85,1	89,3
Chamaephytes	10,1	19,1	12,3	17,5
Hémicryptophytes	42,2	37,5	52,0	65,5
Hémicryptophytes) Hélrophytes)			1,6	
Géophytes	14,7	12,1	6,1	3,6
Thérophytes	7,5	11,0	6,1	2,7

TABEAU 123

STRATE INFÉRIEURE DES CHARMAIES NEUTROCLINES ET ACIDOCLINES
TYPE MORPHOLOGIQUE ET FORME BIOLOGIQUE DES ESPÈCES

	<i>Asperulo- Carpinetum</i>	<i>Oxalido- Carpinetum</i>	<i>Hyperico- Carpinetum</i>
BRYOPHYTES	34,6	28,2	22,7
SPERMATOPHYTES ET) PTERIDOPHYTES)	65,3	71,8	77,3
Chamaephytes	31,6	17,5	26,7
Hémicryptophytes	23,0	39,8	41,2
Géophytes	10,6	14,3	8,1
Thérophytes	0,1	0,2	1,3

TABLEAU 124

SPECTRE ECOLOGIQUE DES CHARMAIES NEUTROCLINES ET ACIDOCLINES

CLASSEMENT DES ESPECES PAR REFERENCE AU TYPE D'HUMUS

	<i>Asperulo- Carpinetum</i>	<i>Oxalido- Carpinetum</i>	<i>Hyperico- Carpinetum</i>
FUTAIE:			
espèces tolérantes	96,5	95,0	99,9
espèces du mull calcique-mull	2,1	2,6	0,1
espèces du mull	0,7		
espèces du mull-moder	0,7	0,2	
espèces du moder		2,3	
TAILLIS:			
espèces tolérantes	87,3	96,6	96,8
espèces du mull calcique-mull	10,4	1,7	
espèces du mull	1,0	1,2	0,5
espèces du mull-moder	0,9	0,4	1,7
espèces du moder	0,5		1,0
ARBUSTES:			
espèces tolérantes:	30,1	48,5	51,2
espèces du mull calcique	6,8	19,3	0,1
espèces du mull calcique-mull	5,5	4,3	1,6
espèces du mull	36,0	19,4	23,7
espèces du mull-moder	21,1	6,5	13,3
espèces du moder	0,3	1,9	4,2
espèces du moder-mor	0,1	0,1	5,9
STRATE INFERIEURE:			
espèces tolérantes	21,1	22,3	27,9
espèces du mull calcique	0,7		0,1
espèces du mull calcique-mull	1,2	0,1	0,2
espèces du mull	29,3	31,6	9,2
espèces du mull-moder	43,3	40,3	32,4
espèces du moder	1,9	2,5	11,0
espèces du moder-mor	2,5	3,2	16,9
espèces du mor			2,4

TABLEAU 125

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE

DES CHARMAIES NEUTROCLINES ET ACIDOCLINES

	<i>Asperulo- Carpinetum</i>	<i>Oxalido- Carpinetum</i>	<i>Hyperico- Carpinetum</i>
FUTAIE:			
3	0,7	0,3	
4	2,8	7,6	
5	91,5	82,4	93,9
3 à 5	95,0	90,3	93,9
42 - 52	1,4		
44 - 54			0,1
45 - 55	3,5	9,7	6,0
TAILLIS:			
3		1,5	0,5
4	13,2	7,0	4,5
5	6,6	4,7	15,2
3 à 5	19,8	13,2	20,2
43 - 53			1,0
44 - 54	80,2	0,3	
45 - 55		86,4	78,8
ARBUSTES:			
3	14,6	6,9	11,6
4	59,4	39,1	9,4
5	9,3	5,4	47,6
3 à 5	83,3	51,4	68,6
41 - 51			1,3
42 - 52	0,9	1,8	3,9
43 - 53		16,8	
44 - 54	0,1	0,9	0,1
45 - 55	15,6	29,0	26,1
STRATE INFÉRIEURE:			
1	0,9	0,8	2,2
2	25,6	33,0	30,5
3	29,7	24,2	17,7
4	34,2	25,0	24,1
5	3,1	7,2	7,0
1 à 5	93,5	90,2	81,5
41 - 51	0,5	1,6	6,2
42 - 52	0,3	0,2	4,5
43 - 53			0,2
44 - 54	2,3	2,8	0,9
45 - 55	3,3	5,3	6,7

TABEAU 126

SPECTRE SOCIOLOGIQUE BRUT
DES CHARMAIES NEUTROCLINES ET ACIDOCLINES

	<i>Asperulo- Carpinetum</i>	<i>Oxalido- Carpinetum</i>	<i>Hyperico Carpinetum</i>
Espèces du <i>Carpinion</i>	12,9	11,1	9,6
Espèces des <i>Fagetalia</i>	31,1	41,9	17,3
Espèces des <i>Quercu-Fagetea</i>	1,8	0,9	1,5
Espèces des <i>Prunetalia</i>	18,4	5,5	7,1
Compagnes dont espèces	35,7	40,7	64,5
des <i>Quercetalia robori-petraeae</i>	1,5	2,6	9,2
des <i>Calluno-Ulicetea</i>	0,4	1,2	7,3




Fig. 316 - Spectre sociologique brut des charmaies neutroclines et acidoclines.

- A - *Asperulo-Carpinetum*
B - *Oxalido-Carpinetum*
C - *Hyperico-Carpinetum*



Fig. 317 - Charmaies neutroclines et acidoclines, -chênaies - hêtraies acidoclines et acidophiles; - graphe relevés, axes 1 et 2 de l'analyse.

1 et 2 - Charmaies neutroclines:

1 - *Asperulo-Carpinetum*

2 - Oxalido-Carpinetum

3 - Charmaies acidoclines:

Hyperico-Carpinetum

4 et 5 - Chênaies-hêtraies acidoclines:

4 - Melico-Fagetum

5 - *Luzulo sylvaticae*-Fagetum

6 et 7 - Forêts acidophiles:

6 - sous-association à *Rhytidiadelphus loreus*

7 - sous-association à *Vaccinium myrtillus*



Fig. 318 - Charmaies neutroclines et acidoclines, -chênaies -hêtraies acidoclines et acidophiles;- graphe relevés, axes 1 et 3 de l'analyse. même légende que pour la figure 319.




Fig. 319 - Charmaies neutroclines et acidoclines, -chênaies - hêtraies acidoclines et acidophiles; - graphe relevés, axes 1 et 4 de l'analyse.

- 1 et 2 - Charmaies neutroclines: 1 - *Asperulo-Carpinetum*
2 - *Oxalido-Carpinetum*
- 3 - Charmaies acidoclines: *Hyperico-Carpinetum*
- 4 et 5 - Chênaies-hêtraies acidoclines: 4 - *Melico-Fagetum*
5 - *Luzulo sylvaticae-Fagetum*
- 6 et 7 - Forêts acidophiles:
6 - sous-association à *Rhytidiadelphus loreus*
7 - sous association à *Vaccinium myrtillus*

TABLEAU

CHARMAIES NEUTROCLINES

		A S P E R U L O - C A R P I																O x a l i d o													
		A s p e r u l o - C a r p i n e t u m																													
		2066	1253	1993	1067	1290	1	997	1711	989	1069	1221	49	1210	1053	146	442	1451	43	96	81	842	71	755	105	2039	555	1810	35	45	64
Pente en degrés																															
Exposition																															
FUTAIE																															
Recouvrement %:		15	10	.	15	5	10	10	5	10	.	.	20	25	10	10	10	10	5	10	10	10	20	10	10	15	5	15	15	20	10
moyenne:		10																													
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1012	<i>Quercus robur</i> L.	1	+	.	1	+	.	1	+	1	.	.	1	.	.	+	+	1	.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	+	1
1062	<i>Ulmus minor</i> Miller	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	+	.	.	1	1	.	.	.	.	2	.	.
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	+	+	+	.	.	.	.	1	.	.	.	.	+	1	.	+	1	
2229	<i>Prunus avium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.
2729	<i>Acer campestre</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.
1014	<i>Quercus x pubescens</i> Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
TAILLIS																															
Recouvrement %:		60	80	80	70	85	35	80	80	70	90	80	85	80	80	80	"	40	80	80	80	80	70	70	60	80	85	99	60	60	50
moyenne:		70																													
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	22	33	32	12	44	22	32	44	22	33	44	44	33	32	3	*	22	3	33	22	33	33	33	2	33	33	55	22	32	22
1012	<i>Quercus robur</i> L.	1	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	2	.	.	*	1	1	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.
2729	<i>Acer campestre</i> L.	.	+	1	.	32	+	12	12	12	12	12	.	1	12	1	*	.	.	1	.	12	1	+	1	.	12	.	.	.	.
3756	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1062	<i>Ulmus minor</i> Miller	.	+	.	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1011	<i>Castanea sativa</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2229	<i>Prunus avium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	1	.	+	.	.	.	.	+	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	.
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	+	12	.	12	.	.	.	.	.	.	*	.	.	12	.	.	+	+	.	.	.	.	2	.	.
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	+	12	.	.	+	.	1	+	.	.	.	.	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1643	<i>Clematis vitalba</i> L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2213	<i>Malus sylvestris</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	1	.	1	.	1	1	+	1	+	1
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2205	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.
2626	<i>Tilia cordata</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1039	<i>Salix caprea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.
2755	<i>Hedera helix</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+
NIVEAU ARBUSTIF																															
Recouvrement %:		30	40	10	20	20	35	10	5	25	30	40	20	35	30	10	80	25	40	40	10	10	15	10	10	10	15	5	10	5	60
moyenne:		30																													
Essences des strates arborescentes:																															
1007	<i>Carpinus betulus</i> L.	+	12	.	+	1	.	.	.	+	1	22	22	.	1	.	22	.	1	1	1	1	22	1	1	.	12	1	1	.	33
1012	<i>Quercus robur</i> L.	.	12	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2729	<i>Acer campestre</i> L.	+	1	.	1	+	.	.	.	.	1	.	+	1	.	.	.	.	.	+	.	1	.	+	1	.	.	.	.	.	+
3756	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2214	<i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.
1062	<i>Ulmus minor</i> Miller	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+
1011	<i>Castanea sativa</i> Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2229	<i>Prunus avium</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1013	<i>Quercus petraea</i> Liebl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1052	<i>Populus tremula</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1001	<i>Betula pendula</i> Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.

ET CHARMAIES ACIDOCLINES

[illegible]

Tableau 127 - CHARMAIES NEUTROCLINES

			A S P E R U L O - C A R P I																			O s a l i d o											
			A s p e r u l o - C a r p i n e t u m																														
			2066	1253	1993	1067	1290	1	997	1711	989	1069	1221	49	1210	1053	146	442	1451	43	96	81	842	71	755	105	2039	555	1810	35	45	64	
Arbustes et arbrisseaux:																																	
3618	Viburnum	lantana	L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
	Rosa	sp.	.	+	1	.	.	+	1	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	
3621	Lonicera	xylosteum	L.	.	+	1	.	.	+	1	1	.	+	.	.	.	.	.	.	.	2	.	1	1	1	.	.	.	.	.	.	.	
2204	Crataegus	monogyna	Jacq.	.	1	1	+	1	.	2	1	.	+	+	1	+	.	+	1	2	.	1	+	3	.	.	1	1	.	1	.	.	
2754	Cornus	sanguinea	L.	.	1	.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	1	+
2738	Euonymus	europaeus	L.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3564	Ligustrum	vulgare	L.	.	.	1	1	1	.	.	.	.	+	1	+	1	.	1	.	.	+	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	
2230	Prunus	spinosa	L.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	.	
2205	Crataegus	laevigata	(Poir.) D.C.	.	1	+	+	1	1	2	.	+	+	1	1	.	2	2	.	1	.	2	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	
1009	Corylus	avellana	L.	.	1	+	.	12	+	22	.	.	.	.	1	.	1	+	12	1	.	.	1	.	.	.	+	1	.	12	.	2	
3617	Viburnum	opulus	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2213	Malus	sylvestris	Miller	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2114	Rosa	arvensis	Huds.	.	.	+	.	1	1	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1643	Clematis	vitalba	L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	
	Rubus	fruticosus	L. coll.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	+	+	
3627	Lonicera	periclymenum	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2737	Ilex	aquifolium	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2755	Hedera	helix	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2773	Cytisus	scoparius	(L.) Link	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2208	Mespilus	germanica	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1039	Salix	capraea	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2744	Frangula	alnus	Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NIVEAU INFÉRIEUR DE VÉGÉTATION																																	
Recouvrement %			20 40 40 65 50 50 65 95 65 90 99 55 75 50 50 40 45 80 45																														
moyenne			60																														
ESPECES DU CARPINION:																																	
1007	Carpinus	betulus	L.	()	1	()	+	()	()	()	()	1	()	2	1	()	()	()	()	1	1	()	()	1	()	()	()	()	()	()	2		
371	Festuca	heterophylla	Lmk.	.	12	.	.	.	.	1	.	.	12	12	12	.	12	.	22	12	.	12	12	.	.	.	.	12	.	12	.	.	
2154	Potentilla	sterilis	(L.) Garcke	.	.	+	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2114	Rosa	arvensis	Huds.	1	+	1	1	()	1	1	1	1	.	1	1	1	1	1	1	1	()	.	1	1	+	()	1	1	.	1	.	.	
2299	Prunus	avium	L.	.	.	()	.	.	.	.	.	()	()	.	.	()	()	()	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
CARACTERISTIQUES ET DIFFÉRENTIELLES:																																	
1012	Quercus	robur	L.	()	1	()	+	()	()	()	+	.	()	.	()	()	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2958	Primula	elatior	(L.) Hill	.	.	.	12	.	22	1	2	+	+	+	.	+	2	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2192	Geum	urbanum	L.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1622	Ranunculus	nemorosus	D.C.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3608	Asperula	odorata	L.	.	.	.	.	2	12	.	2	.	12	.	22	.	.	22	.	+	1	.	12	1	.	.	22	.	12	1	32	.	
3422	Lamium	galeobdolon	(L.) Nath.	.	.	.	.	.	.	22	1	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
844	Paris	quadrifolia	L.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3228	Veronica	montana	L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3705	Campanula	trachelium	L.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3615	Adoxa	moschatellina	L.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
322	Poa	chaixii	Vill.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2646	Oralis	acetosella	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
803	Allium	ursinum	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2883	Angelica	sylvestris	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2626	Tilia	cordata	Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3301	Lathraea	squamaria	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1988	Hypericum	pulchrum	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
819	Endymion	non-scriptus	(L.) Garcke	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
856	Ruscus	aculeatus	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1220	Euphorbia	hyberna	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
737	Asphodelus	albus	Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
FAGETALIA:																																	
Espèces du mull:																																	
3121	Pulmonaria	officinalis	L.	+	.	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
387	Bromus	ramosus	Huds.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1615	Ranunculus	auricomus	L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
828	Ornithogalum	pyrenaicum	L.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 699	Thamnium	alopecurum	(L.) B.E.	.	.	.	.	.	.	32	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 802	Cirriphyllum	piliferum	(Schr.) Gr.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
670	Arum	maculatum	L.	.	.	.	+	1	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
537	Carex	sylvatica	Huds.	+	+	.	12	1	.	1	12	.	1	1	12	1	1	1	1	12	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
B 314	Fissidens	tarifolius	(L.) Hedw.	.	.	.	12	.	22	12	+	.	1	.	.	.	.	12	.	12	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
935	Epipactis	helleborine	(L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1957	Viola	reichenbachiana	Jord. ex. Boreau	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
848	Polygonatum	multiflorum	(L.) All.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

[illegible]

Tableau 127 - CHARMAIES NEUTROCLINES

		A S P E R U L O - C A R P I																				O r a l i d o									
		A s p e r u l o - C a r p i n e t u m																				O r a l i d o									
		2066	1253	1993	1067	1290	1	997	1711	989	1069	1221	49	1210	1053	146	442	1451	43	96	81	842	71	755	105	2039	555	1810	35	45	64
1292	<i>Euphorbia amygdaloides</i> L.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	1	+	+	+	.	.	.	.	.	1	.	.	1	.	.	+	1	
1223	<i>Euphorbia dulcis</i> L. ssp. <i>dulcis</i>	.	1	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	
2759	<i>Sanicula europaea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	
1353	<i>Moehringia trinervia</i> (L.) Clairv.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	
937	<i>Neottia nidus avis</i> (L.) Rich.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	
Autres espèces:																															
B 806	<i>Eurhynchium striatum</i> (Schr.) Schp.	12	12	.	22	12	12	32	33	22	33	12	.	22	33	+	22	22	33	12	12	12	22	12	+	1	12	+	.	12	
2525	<i>Vicia sepium</i> L.	.	1	+	1	.	1	+	.	.	1	1	1	1	.	+	.	1	.	.	1	1	+	1	.	1	.	1	+	+	
232	<i>Milium effusum</i> L.	.	.	.	1	.	1	.	1	.	1	2	1	.	2	.	.	.	.	.	.	.	1	1	12	1	1	1	1	22	
334	<i>Melica uniflora</i> Retz.	.	.	.	.	1	12	+	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	1	12	1	.	1	.	.	
1010	<i>Fagus sylvatica</i> L.	.	.	.	.	()	()	.	()	.	.	.	.	.	.	()	.	()	.	()	.	()	()	.	.	.	.	()	()	.	
B 278	<i>Catharinea undulata</i> (L.) W.M.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	22	.	.	12	12	12	+	12	12	12	12	22	
77	<i>Dryopteris filix-mas</i> (L.) Schott	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	+	.	1	.	1	1	.	1	1	.	
3196	<i>Scrophularia nodosa</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
3733	<i>Phyteuma spicatum</i> L. ssp. <i>ochroleucum</i> Döll	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	2	1	.	.	.	.	2	.	
70	<i>Athyrium filix-femina</i> (L.) Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
487	<i>Carex remota</i> Jusl. ex L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	+	
B 177	<i>Plagiochila asplenoides</i> (L.) Dum.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	
PRUNETALIA:																															
	<i>Rosa</i> sp.	()	1	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
920	<i>Tamus communis</i> L.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3618	<i>Viburnum lantana</i> L.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1643	<i>Clematis vitalba</i> L.	.	.	()	.	+	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	+	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	
2738	<i>Euonymus europaeus</i> L.	+	.	()	()	.	.	+	.	.	()	.	.	1	.	.	()	()	()	()	.	()	()	.	+	.	.	.	.	.	
3564	<i>Ligustrum vulgare</i> L.	.	1	1	1	()	1	.	+	()	1	+	1	.	()	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	
2230	<i>Prunus spinosa</i> L.	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	1	()	.	()	.	()	.	.	.	.	()	.	()	.	.	.	.	.	.	
2754	<i>Cornus sanguinea</i> L.	+	.	1	+	+	()	1	()	()	()	1	+	+	()	()	1	()	.	.	.	+	.	.	.	()	()	()	.	.	
2204	<i>Crataegus monogyna</i> Jacq.	()	()	.	.	()	+	.	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	.	.	+	()	()	()	()	()	()	.	.		
3617	<i>Viburnum opulus</i> L.	1	1	.	1	()	.	.	()	.	+	.	.	.	.	.	()	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	.	
2213	<i>Malus sylvestris</i> (L.) Miller	.	()	.	()	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	
2208	<i>Mespilus germanica</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	
QUERCO-FAGETEA:																															
Espèces du mull calcique et du mull:																															
2959	<i>Primula veris</i> L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1062	<i>Ulmus minor</i> Miller	.	()	.	1	()	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3621	<i>Lonicera xylosteum</i> L.	()	()	.	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	()	()	()	.	.	.	.	.	.	
3556	<i>Fraxinus excelsior</i> L.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	
1581	<i>Ranunculus ficaria</i> L.	.	.	.	32	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	1	1	.	.	.	
437	<i>Brachypodium sylvaticum</i> (Huds.) Beauv.	+	12	.	12	1	1	+	.	.	1	.	1	1	.	+	12	22	.	.	1	1	.	1	22	.	.	1	+		
2729	<i>Acer campestre</i> L.	+	()	.	1	()	()	()	()	()	.	+	+	1	+	()	.	()	.	()	()	.	()	()	()	()	.	.	.	()	
Espèces du mull-moder:																															
B 805	<i>Eurhynchium stockesii</i> (Turn.) B.E.	.	.	.	22	.	.	.	.	+	12	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	12	.	.	.	
2755	<i>Hedera helix</i> L.	12	22	22	32	22	22	1	44	22	33	22	43	33	22	22	2	1	22	3	.	1	33	12	2	22	22	1	12	3	12
2205	<i>Crataegus laevigata</i> (Poir.) D.C.	()	()	()	()	()	.	()	()	()	.	()	()	.	()	.	()	.	1	()	2	+	.	()	()	.	.	.	.	.	
311	<i>Poa nemoralis</i> L.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	+	12	1	.	12	.	.	.	1	1	.	.	1	1	1	.	.	
846	<i>Convallaria majalis</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1377	<i>Stellaria holostea</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	1	1	1	
3547	<i>Vinca minor</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	+	.	.	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	1	2	
B 812	<i>Oxyrrhynchium praelongum</i> (Hedw.) Warnst.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	
Espèces tolérantes:																															
1009	<i>Corylus avellana</i> L.	+	()	.	()	()	+	.	()	()	.	.	()	.	()	()	()	+	.	.	()	.	.	.	()	()	.	()	.	.	
B 856	<i>Rhytidiadelphus triquetrus</i> (L.) Warnst.	.	12	.	22	.	+	.	12	.	.	44	33	12	+	12	+	.	22	32	.	12	12	.	32	.	.	12	.	12	
1566	<i>Anemone nemorosa</i> L.	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	2	.	+	.	.	.	.	22	()	.	32	12	.	.	.	.	1	1	.	
COMPAGNES:																															
Espèces du mull:																															
2219	<i>Sorbus domestica</i> L.	()	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3586	<i>Galium mollugo</i> L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
552	<i>Carex flacca</i> Schreb.	.	12	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 636	<i>Mnium undulatum</i> (L.) Weis.	.	.	22	.	1	.	12	.	12	.	.	.	+	12	.	12	.	1	22	.	.	.	12	1	1	.	+	12	22	
3395	<i>Glechoma hederacea</i> L.	.	.	.	2	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	.	.	22	
3227	<i>Veronica chamaedrys</i> L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	1	1	
2652	<i>Geranium robertianum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2587	<i>Epilobium montanum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3466	<i>Calamintha officinalis</i> Moench	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1994	<i>Hypericum hirsutum</i> L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TABLEAU 128

CHARMAIES NEUTROCLINES ET ACIDOCLINES

LOCALISATION DES RELEVES ET ESPECES PRESENTES UNE FOIS.

- 1 - Usages d'Arbourse (Nièvre), versant Ouest; - *Plantanthera bifolia* (L.) Rich., +.
- 35 - Bois entre Dompierre et Arbourse (Nièvre).
- 43 - Croix du Cerf, entre Oudan et la Chapelle-St-André (Nièvre); - *Hieracium* sp., +.
- 45 - Forêt de Ronceaux, au Sud de Varzy (Nièvre).
- 49 - Forêt domaniale de la Bertrange, les Montifauts, au Nord de Raveau (Nièvre); - *Agrostis stolonifera* L., +.
- 56 - Apremont (Cher), les Carrières; - *Luzula campestris* (L.) D.C., 1; - *Lotus uliginosus* Schkuhr, +; - *Galium aparine* L., 1.
- 64 - Les Fontaines de Vaux, dans les Usages de Chaulgnes (Nièvre); - *Sambucus racemosa* L., 1 (arbustif).
- 71 - Forêt de Ronceaux, au Sud de Varzy (Nièvre).
- 81 - Les Rouesses, entre Châteauneuf-val-de-Bargis et St-Bonnot (Nièvre).
- 89 - Menetou - Couture (Cher); - *Dactylorhiza maculata* (L.) Vermeul., +.
- 90 - La Boucharderie, près de Jouet-sur-Aubois (Cher); - *Ranunculus acris* L., +; - *Succisa pratensis* Moench, 1.
- 93 - Forêt d'Aubigny, entre Jouet-sur-Aubois et Précy (Cher).
- 96 - Bois au Sud de Charentonnay (Cher).
- 105 - Forêt de Bellary, au Nord de Nannay (Nièvre); - *Hypericum humifusum* L., +; - *Mnium affine* Bland., +.
- 120 - Usages des Rouesses, en face du domaine du Pont, Châteauneuf-val-de-Bargis (Nièvre).
- 137 - Forêt domaniale de Prémary (Nièvre), fond du vallon de Tirache; - *Picea abies* (L.) Karst., 1 (planté); - *Abies alba* Mill., 1 (planté); - *Pimpinella major* (L.) Huds., +; - *Lysimachia nemorum* L., 1; - *Epilobium tetragonum* L. ssp. *tetragonum*, +.
- 139 - Bois Carnot, près de Gron (Cher).
- 146 - La Vigne, entre Beaumont-la-Ferrière et St-Aubin les-Forges (Nièvre); - *Epipactis microphylla* (Ehrh.) Sw., +.
- 151 - L'Orme au Loup, entre Vinon et Sancerre (Cher); - *Melittis melissophyllum* L., +; - *Pulmonaria angustifolia* L., +; - *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp., +.
- 294 - Cours-les-Barres (Cher); - *Lysimachia nummularia* L., +.
- 304 - Forêt d'Apremont (Cher), route de la Planche Chevrier.
- 311 - Grossouvre (Cher), les Bordes; - *Juncus inflexus* L., 1; - *Molinia caerulea* (L.) Moench, 1; - *Frangula alnus* (Miller), + (arbustif).
- 442 - Mont - Vigne, près de Pouques-Lormes (Nièvre), sur le plateau.
- 443 - Mont - Vigne, versant Sud; - *Buxus sempervirens* L., 3/3 (arbustif).
- 555 - Massif forestier de Bellary (Nièvre), la Fontaine du Charme.
- 556 - Bois entre Jussy-le-Chaudrier et Argenvières (Cher); - *Euphorbia villosa* Waldst. et Kit. ex. Willd., 1.
- 732 - Ariot, au Nord de Balleray (Nièvre); - *Cardamine pratensis* L., 1.
- 742 - St-Bonnot (Nièvre).
- 755 - Bois entre St-Révérien et Champallement (Nièvre).
- 814 - Forêt domaniale de Bommiers (Indre), canton de Pruniers; - *Epilobium* sp., +.
- 868 - Forêt domaniale de Tronçais (Allier), Corne de Rollais.
- 989 - Bois de la Roche, à l'Est d'Arzemouy (Nièvre); - *Listera ovata* (L.) R. Br., +.
- 997 - Arthel (Nièvre).
- 1001 - Bois de Mâron, Mâron (Indre).
- 1053 - Sommet du Grand-Montois, près de Varzy (Nièvre); - *Daphne laureola* L., 1 (arbustif).
- 1067 - Bois entre Flez et St-Pierre-du-Mont (Nièvre); - *Rumex sanguineus* L., +.
- 1069 - Villaine, bois à 2km au Sud de Breugnon (Nièvre).
- 1126 - Les Vaulurins, au Sud-Est de St-Colombe (Nièvre).
- 1207 - Dornecy (Nièvre), sommet du Mont-Martin; - *Tilia platyphyllos* Scop., 1-2 (arborescent), 1 (arbustif).
- 1210 - Dornecy, Mont-Martin, en haut du versant Sud; - *Cornus mas* L., +.
- 1221 - Dornecy, Mont-Martin, en bas du versant Sud.
- 1253 - Bois des Epinières, au Sud-Est de Ste-Parize-le-Châtel (Nièvre).
- 1254 - Bois des Epinières.
- 1263 - Rosemont, près de Luthenay - Uxeloup (Nièvre); - *Circea lutetiana* L., 1.
- 1266 - Les Tardys, au Sud-Est de Fleury-sur-Loire (Nièvre).
- 1280 - Massif de St-Saulge (Nièvre), versant Ouest; - *Alnus glutinosa* (L.) Gaertn., + (arborescent, futaie et taillis).
- 1285 - Bois de Rouhaut, au Nord de Châtillon-en-Bazois (Nièvre); - *Ctenidium molluscum* (Hedw.) Mitt., 1/2.
- 1290 - Bois de Faye, près de Brignon, 8km au Sud de Nevers (Nièvre).
- 1368 - Forêt de Bommiers (Indre), canton du Petit Terrier Rouge, vallon de la Thonaise; - *Sedum telephium* L. ssp. *telephium*, +.
- 1369 - Forêt de Bommiers, au Nord de la ferme de la Carade (Nord-Est de Bommiers); - *Peucedanum gallicum* Latourr., +.
- 1451 - La Loge-Gadon, entre Château-sur-Allier et Neure (Allier); - *Robinia pseudacacia* L., + (arbustif).
- 1610 - Forêt de Tronçais (Allier), les Chamignoux; - *Calypogeia arguta* Nees et Mitt., +.
- 1710 - Bois près de Mougues, au Sud-Ouest de Guérigny (Nièvre).
- 1711 - Forêt domaniale de la Bertrange, canton de Bois l'Abbesse (Sud-Ouest de Guérigny).
- 1712 - Forge-Bas (Nord-Ouest de Guérigny).
- 1730 - Côte Pimont, entre Parigny-les-Vaux et Chaulgnes (Nièvre).
- 1810 - La Vallée, entre Chaulgnes et Guérigny (Nièvre).
- 1811 - Bois de Biez, au Nord de Guérigny.
- 1833 - Forêt de Choeurs (Indre), canton de Borne Rouge.
- 1872 - Forêt de Bommiers (Indre), canton du Riottin; - *Rhamnus catharticus* L., +.
- 1921 - Villeneuve-sur-Cher (Cher); - *Oxyrrhynchium praelongum* (Hedw.) Warnst., +.
- 1925 - Le Petit-Entrevin, au Nord-Est de Charost (Cher) *Festuca filiformis* Pourret, 1/2.
- 1993 - Jars (Cher), route de Sury-ès-Bois.
- 1999 - Montigny-aux-Amognes, Forêt des Amognes (Nièvre); - *Plagiothecium sylvaticum* (Huds.) B.E., 1/2; - *Isopterygium elegans* (Hook.) Lindb., 1/2; - *Cephalozia bicuspadata* (L.) Dum., +.
- 2039 - St-Hubert, au Nord-Est de Châteauneuf (Nièvre).
- 2066 - Bois de Parnay, entre Dun-sur-Auron et Meillant (Cher), avant la maison forestière.

TABLEAU 129

CHENAIES - HETRAIES ACIDOCINES ET ACIDOPHILES

LOCALISATION DES RELEVES ET ESPECES PRESENTES UNE FOIS

- 3 - Usages d'Arbourse (Nièvre).
4 - Usages d'Arbourse ; - *Calypogeia trichomanis* (L.) Cda.,+.
5 - Usages d'Arbourse.
8 - Usages d'Arbourse.
44 - La Croix du Cerf, entre Oudan et la Chapelle - St-André (Nièvre).
47 - Forêt domaniale de la Bertrange, canton des Montifauts, au Nord de Raveau (Nièvre); - *Acer pseudoplatanus* L.,+ (arbustif).
52 - Les Vaulurins, au Sud de Cessy-les-Bois (Nièvre).
62 - Forêt domaniale de la Bertrange, la Tête de Chat au Sud des Bertins, commune de Narcy (Nièvre).
63 - Usages de Chaulgnes (Nièvre).
77 - L'Usage défendu, près de Bois-de-Raveau, entre Raveau et St-Aubin-les-Forges (Nièvre).
79 - Forêt domaniale de Prémery (Nièvre) canton de Tirache.
82 - La Vache, près de Raveau (Nièvre); - *Cladonia rangiformis* Hoffm. var. *pungens* Vain.,+.
85 - La Croix du Cerf, entre Oudan et la Chapelle-St-André (Nièvre); - *Rubus idaeus* L.,+ (arbustif).
87 - Bois de Berlières, au Sud des Bertins, commune de Narcy (Nièvre).
88 - Champvoux. (Nièvre).
92 - Forêt de Ronceaux au Sud de Varzy (Nièvre); - *Cephalanthera longifolia* (L.) Fritsch,+.
94 - Bois au Nord de Charentonnay (Cher).
95 - Bois au Sud de Charentonnay.
100 - Bois des Souailles, près de Dompierre-sur-Nièvre (Nièvre).
101 - Gagy, commune de la Celle-sur-Nièvre Nièvre)
102 - Sommet du Massif de St-Saulge.
104 - Les Garennes, au Nord de Nannay (Nièvre).
132 - Forêt communale de Prémery (Nièvre).
138 - Forêt communale de Prémery; - *Brachythecium salebrosum* (Hoffm.) B.E.,+.
140 - Beaumont-Sardolles (Nièvre), les Sarrazins.
147 - St-Aubin-les-Forges (Nièvre).
153 - L'Orme au Loup, entre Vinon et Sancerre (Cher); - *Abies alba* Mill. planté, 1.
154 - L'Orme au Loup.
159 - La Bertherie, au Nord - Ouest de Raveau (Nièvre); - *Brachypodium pinnatum* (L.) Beauv., 1/2.
162 - St-Révérien (Nièvre), Forêt de Tronçay, sommet.
234 - St-Bonnot (Nièvre), Taillis de Dompierre.
335 - Forêt communale de Prémery.
383 - La Vache, près de Raveau (Nièvre).
532 - Forêt des Minimes, au Nord de St-Léger des Vignes (Nièvre).
642 - St-Benin-des-Bois (Nièvre), Borne des Cinq Seigneurs.
815 - Bois communal de Condé (Indre)
844 - Forêt communale de Prémery.
864 - Forêt de Tronçais (Allier), la Corne de Rollais.
870 - Forêt de Tronçais, la Corne de Rollais; - *Ceratodon purpureus* (L.) Brid.,+; - *Pogonatum urnigerum* (L.) P. Beauv.,+; - *Pinus* sp.,+.
871 - Forêt de Tronçais (Allier), la Corne de Valigny.
905 - Trucy-l'Orgueilleux (Nièvre), Forêt de Trucy.
907 - Forêt de Trucy.
908 - Forêt de Trucy.
986 - Oudan (Nièvre), Forêt d'Arcy.
996 - Forêt de Trucy; - *Lathyrus sylvestris* L.,+.
1026 - Mont-Givre, à l'Est de Pougues-les-Eaux (Nièvre)
1202 - Usages de Chaulgnes (Nièvre).
1208 - Dornecy (Nièvre), sommet du Mont - Martin.
1219 - Mont - Martin.
1248 - Mont-Martin.
1264 - Avril-sur-Loire (Nièvre).
1274 - Forêt de Bagnolet, au Sud-Ouest de Bagneux (Allier).
1275 - Forêt de Bagnolet.
1281 - Massif de Saint - Saulge entre St-Saulge et St-Franchy (Nièvre), versant Ouest.
1601 - Bois de Sens - Beaujeu (Cher); - *Campanula rotundifolia* L.,+; - *Veronica montana* L.,+.
1602 - La Croix des Rames, bois des Beurtes, entre Villegenon et la Chapelotte (Cher); - *Digitalis purpureus* L.,+.
1607 - Forêt de la Bertrange, la Réserve, au Nord de Bois de-Raveau (Nièvre).
1611 - Forêt de Tronçais (Allier), la Marmande; - *Lysimachia nummularia* L.,+.
1613 - Forêt de Tronçais, les Chamignoux; - *Mentha arvensis* L., 1; - *Scutellaria minor* L.,+; - *Juncus tenuis* Willd.,+; - *Galium uliginosum* L.,+.
1625 - Forêt de Tronçais, Bougimont; - *Mycelis muralis* (L.) Reich.,+.
1627 - Forêt de Tronçais, Beaumont, versant.
1628 - Forêt de Tronçais, Beaumont, sommet; - *Pinus sylvestris* L. planté, 1 (arbustif); - *Campilopus flexuosus*
1702 - Forêt de la Bertrange, canton de la Cave, au Nord-Ouest d'Urzy (Nièvre).
1703 - Canton de la Chaume, au Nord-Ouest d'Urzy.
1705 - Forêt communale d'Urzy.
1706 - Forêt communale d'Urzy.
1721 - Forêt de la Bertrange, la Côte St-Maurice, au Nord de Parigny-les-Vaux; - *Epilobium* sp.,+.
1731 - La Côte-Pimont, entre Parigny-les-Vaux et Chaulgnes.
1880 - Rigny, 5 km au Sud-Ouest de Prémery (Nièvre); - *Polypodium vulgare* L.,+.
1992 - Jars (Cher).
2000 - Montigny-aux-Amognes (Nièvre), Forêt des Amognes.
2035 - St-Bonnot (Nièvre), Taillis de Dompierre.
2038 - Champlemy (Nièvre), Forêt de Charnouveau.
2042 - St-Malo (Nièvre), Forêt de Bouhy; - *Peucedanum gallicum* Latourr.,+.
2052 - Giry (Nièvre), les Grands-Bois, 2 km au Nord-Est de la Grange-Mouton.
2054 - Les Grands-Bois.
2058 - Les Cafards, entre St-Bonnot et Prémery.
2061 - Forêt domaniale de Prémery, canton du Chasnay.
2062 - Bois de Giry (Nièvre).






Fig. 320 - Comparaison des charmaies neutroclines ou acidoclines, des chênaies-hêtraies acidoclines ou acidophiles du Bassin Parisien méridional et de groupements décrits dans d'autres régions.

- 1 - Bournérias M., 1949 - Chênaie sessiliflore silicicole (*Quercetum occidentale* Br.-Bl.); - forêt de Beine.
- 2 - Dethioux M., 1969 - *Melico-Fagetum*; - district mosan et ardennais.
- 3- 5 - Durin L., Gehu J.M., Noirfalise A., Sougneux N., 1967 - hêtraies atlantiques; - Nord-Ouest et Ouest de la France.
 - 3 - *Endymio-Fagetum*.
 - 4 - *Rusco-Fagetum*.
 - 5 - *Ilici-Fagetum*.
- 6 - Duvigneaud J., 1959 - *Querceto-Carpinetum Stachyetosum*; - forêt alluviale du Mont-Dieu.
- 7-10 - Gehu J.M., 1961 - bassin de la Sambre française:
 - 7 - *Querceto-Carpinetum Stellarietosum*.
 - 8 - *Carpinetum - Fagetum* (*Querceto-Carpinetum Asperuletosum*).
 - 9 - *Querceto-Carpinetum*, var. acidophile.
 - 10 - *Quercetum sessiliflorae*.
- 11 - Lapraz G., 1965 - *Poa chaixii-Carpinetum*; - Basses Vosges orientales.
- 12 - Lapraz G., 1963 - *Periclymeno-Quercetum Carpinetosum*; - Entre-Deux-Mers.
- 13-16 - Lemée G., 1937 - Perche:
 - 13 - *Querceto-Carpinetum occidentale*.
 - 14 - *Querceto-Fagetum*.
 - 15 - *Quercetum sessiliflorae occidentale*.
 - 16 - *Quercetum sessiliflorae occidentale-Ilicetosum*.
- 17 - Noirfalise A., 1969 - *Endymion-Carpinetum*; - Belgique.
- 18-19 - Rameau J.M., 1974 - Bourgogne et Lorraine:
 - 18 - *Fago-Quercetum petraeae*.
 - 19 - *Scillo-Carpinetum Luzuletosum*.
- 20 - Roisin P., 1961 - *Melico-Fagetum atlanticum*; - Bassin Parisien.
- 21 - Roisin P., 1962 - *Luzulo-Fagetum*; - Massif ardennais.
- 22 - Roisin P. et Thill A., 1953 - *Quercetum atlanticum*; - district picardo-brabançon.
- 23-30 - relevés effectués dans le Bassin Parisien méridional.
 - 23 - *Asperulo-Carpinetum*.
 - 24 - *Oxalido-Carpinetum*.
 - 25 - *Hyperico-Carpinetum*.
 - 26 - *Hyperico-Carpinetum*, variante occidentale.
 - 27 - *Melico-Fagetum*.
 - 28 - *Luzulo sylvaticae-Fagetum*.
 - 29 - *Fago-Quercetum*, -sous. ass. à *Rhytidiadelphus loreus*.
 - 30 - *Fago-Quercetum*, -sous. ass. à *Vaccinium myrtillus*.



Fig. 321 et 322 - Représentations limitées à 3 groupements de l'analyse de la Fig. 320 (charmaies neutroclines ou acidoclines, chênaies-hêtraies acidoclines ou acidophiles)

Fig. 321 - plan des axes 1 et 2

1 - *Oxalido-Carpinetum*.

Fig. 322 - plan des axes 1 et 3

2 - *Luzulo sylvaticae-Fagetum*.

3 - *Poa chaixii-Carpinetum* d'Alsace.




Fig. 323 - Représentation limitée à trois groupements de l'analyse de la figure 320 (charmaies neutroclines ou acidoclines, chênaies-hêtraies acidoclines ou acidophiles); -axes 1 et 6.-Même légende que pour les figures 321 et 322.




Fig. 324 - Spectre sociologique brut des chênaies-hêtraies:

A - *Melico-Fagetum*.

B - *Luzulo sylvaticae-Fagetum*: B1 - forme type.

B2 - forme appauvrie.

C - *Fago-Quercetum*: C1 - sous-association à *Rhytidiadelphus loreus*.

C2 - sous-association à *Vaccinium myrtillus*.



Fig. 325



Fig. 326

Fig. 325 et 326 - Représentations partielles de l'analyse de la Fig. 320:

- 1 - *Querceto-Carpinetum Stellarietosum*.
- 2 - *Querceto-Carpinetum*, var. acidophile.
- 3 - *Periclymeno-Quercetum occidentale*.
- 4 - *Endymion-Carpinetum*.
- 5 - *Quercetum atlanticum*.
- 6 - *Hyperico-Carpinetum*.
- 7 - *Hyperico-Carpinetum*, variante occidentale.

TABLEAU 130 : SPECTRE SOCIOLOGIQUE DES CHENAIES - HETRAIES

	<i>Melico</i> <i>Fagetum</i>	<i>Luzulo sylvaticae</i> <i>Fagetum</i>		<i>F a g o - Q u e r c e t u m</i> sous-association à <i>Rhytidiadelphus</i> <i>lozeus</i>		sous-association à <i>Vaccinium</i> <i>myrtillus</i>
		forme type	forme dégradée			
Espèces du <i>Carpinion</i>	11,3	11,0	5,8	4,8		1,8
Espèces du <i>Fagion</i>	7,7	6,1	7,2	4,8		4,8
Espèces des <i>Fagetalia</i>	16,9	12,1	8,2	4,6		1,8
Espèces des <i>Querco-Fagetea</i>	17,9	12,6	9,9	8,0		2,5
Espèces des <i>Querco-Fagetea</i> et des <i>Quercetea robori-petraeae</i>	29,2	38,7	41,6	46,1		53,1
Espèces des <i>Quercetalia</i> <i>robori-petraeae</i>	4,6	6,3	7,5	8,9		6,7
Espèces des <i>Calluno-Ulicetea</i>	1,0	4,0	8,5	12,6		17,0
Espèces des <i>Prunetalia</i>	5,6	4,4	1,4	2,9		1,8
autres espèces	5,6	4,9	9,9	7,2		10,3

TABLEAU 131 : STRATE INFÉRIEURE DES CHENAIES - HETRAIES
TYPE MORPHOLOGIQUE ET FORME BIOLOGIQUE DES ESPÈCES

	<i>Melico</i> <i>Fagetum</i>	<i>Luzulo sylvaticae</i> <i>Fagetum</i>		<i>F a g o - Q u e r c e t u m</i> sous-association à <i>Rhytidiadelphus</i> <i>lozeus</i>		sous-association à <i>Vaccinium</i> <i>myrtillus</i>	ensemble des chênaies- hêtraies acidophiles
		forme type	forme dégradée				
LICHENS			0,2	0,7		0,8	0,5
BRYOPHYTES	19,8	20,6	40,6	29,5		38,6	31,5
PTERIDOPHYTES)	80,2	79,5	59,2	69,8		60,7	68,1
SPERMATOPHYTES)							
Chamaephytes	27,5	30,2	17,9	23,8		18,1	22,6
Hémicryptophytes	39,2	41,5	38,2	33,0		28,2	34,4
Géophytes	13,5	6,5	2,3	11,9		11,5	9,6
Thérophytes		1,3	0,8	1,1		2,9	1,5

TABLEAU 132

SPECTRE ECOLOGIQUE DES CHENAIES - HETRAIES:
CLASSEMENT DES ESPECES PAR REFERENCE AU TYPE D'HUMUS

	<i>Melico</i> <i>Fagetum</i>	<i>Luzulo sylvaticae</i> <i>Fagetum</i> forme type	forme dégradée	<i>F a g o - Q u e r c e t u m</i> sous-association à <i>Rhytidiadelphus</i> <i>loreus</i>	sous-association à <i>Vaccinium</i> <i>myrtilus</i>	ensemble des chênaies- hêtraies acidophiles
FUTAIE:						
espèces tolérantes	100,0	100,0	99,9	100,0	100,0	100,0
espèces du moder			0,1			
TAILLIS:						
espèces tolérantes	94,8	92,6	91,7	90,3	93,2	92,2
espèces du mull	5,0	3,4		0,9		2,1
espèces du mull- moder		1,1	0,1	0,9	0,1	0,7
espèces du moder	0,2	2,8	8,2	7,8	6,5	5,0
espèces du moder mor					0,1	
ARBUSTES:						
espèces tolérantes	51,1	64,9	68,1	69,6	62,1	65,8
espèces du mull calcique-mull	0,4	0,1				
espèces du mull	28,8	9,8	0,1	0,8		3,0
espèces du mull- moder	7,2	9,2	4,8	5,8	4,6	5,9
espèces du moder	6,8	4,9	20,8	16,6	19,8	16,0
espèces du moder mor	5,8	11,1	6,2	7,1	12,7	9,1
espèces du mor					0,8	0,2
STRATE INFÉRIEURE:						
espèces tolérantes	26,9	30,9	37,1	31,9	25,5	30,1
espèces du mull	20,5	8,4	1,1	1,5	0,7	4,1
espèces du mull- moder	32,5	28,5	15,0	7,0	2,2	12,7
espèces du moder	11,2	11,5	9,0	6,5	8,9	8,9
espèces du moder mor	8,0	12,8	23,3	29,8	31,6	24,5
espèces du mor	0,8	7,9	14,6	23,3	31,0	19,7

TABLEAU 133

SPECTRE PHYTOGEOGRAPHIQUE DES CHENAIES - HETRAIES

	<i>Melico</i> <i>Fagetum</i>	<i>Luzulo sylvaticae</i> <i>Fagetum</i>		<i>F a g o - Q u e r c e t u m</i> sous-association		ensemble des chênaies- hêtraies acidophiles
		forme type	forme dégradée	à <i>Rhytidiadelphus</i> <i>loreus</i>	à <i>Vaccinium</i> <i>myrtillus</i>	
FUTAIE:						
4				0,1		
5	97,6	99,9	99,9	99,9	100,0	99,7
Total 4 et 5	97,6	99,9	99,9	100,0	100,0	99,7
45 - 55	2,4	0,1	0,1			0,2
TAILLIS:						
3		1,2		3,6	23,5	4,0
4	7,5	6,3	0,1	1,8	0,1	3,7
5	22,4	33,5	53,2	83,3	67,4	52,0
Total 3 à 5	29,9	41,0	53,3	88,7	91,0	59,7
43 - 53	0,2	2,8	8,2	7,8	6,5	5,0
45 - 55	69,9	56,1	38,5	3,4	2,4	35,3
ARBUSTES:						
2		0,1	1,5			0,2
3	0,4	1,8	1,7	3,3	2,6	2,5
4	41,4	37,4	9,8	13,4	14,5	17,9
5	12,2	19,4	37,6	56,1	58,6	46,6
Total 2 à 5	54,à	58,7	50,6	56,1	75,7	67,2
41 - 51			1,8	0,2	0,9	0,6
42 - 52	6,8	3,2	17,8	11,0	17,3	12,5
43 - 53		1,7	3,0	5,6	2,5	3,5
44 - 54	0,4	0,3	1,6	2,7	1,9	1,8
45 - 55	38,8	36,1	25,3	7,8	1,7	14,3
STRATE INFÉRIEURE:						
1	1,3	2,8	4,0	14,4	17,0	10,6
2	26,1	28,2	57,9	45,6	50,5	44,5
3	21,3	9,8	4,4	11,1	13,7	11,1
4	24,3	20,4	13,3	10,5	6,0	12,4
5	11,2	12,2	9,8	11,9	6,8	10,0
Total 1 à 5	84,2	73,4	89,4	93,5	94,0	88,6
41 - 51	1,3	2,7	3,2	3,4	4,2	3,3
42 - 52	8,3	8,5	2,2	1,2	1,1	3,1
43 - 53				0,1	0,1	0,1
44 - 54	0,4	0,2				0,1
45 - 55	5,8	15,2	5,1	1,8	0,6	4,6

TABLEAU

CHENAIES

HETRAIES

	MELICO-FAGETUM								LUZULO-SYLVATICAE FAGETUM																Forme appauvrie												
Pente en degrés Exposition	1992	905	383	42	1248	1274	82	996	2042	1219	44	1705	532	908	3	1607	87	1208	47	104	2035	407	234	1202	1703	4	996	132	2000	864	1611	1880	88	2062	101	1721	
	W	S	SW	SE	SE	N		W	S	N	N	S	W	W		N		N			NW	NE			N	W		S		N		N	E	S	N		
FUTAIE																																					
Recouvrement %:	25	20	50	60	25	60	60	10	10	10	30	45	55	10	25	"	60	60	"	40	25	15	15	15	60	30	40	20	25	70	80	20	40	30	25	45	
moyenne	50															30															40						
1013 Quercus petraea Liebl.	2	2	2	22	1	3	2	1	1	1	1	32	1	2	.	3	32	.	2	1	1	1	1	1	33	1	22	2	1	32	22	1	2	1	1	2	
1010 Fagus sylvatica L.	.	.	2	22	.	1	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	2	1	1	1	1	+	+	+	.	1	32	22	.	.	.	.		
1007 Carpinus betulus L.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	32	.	.	.	.	
1011 Castanea sativa Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1012 Quercus robur L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2214 Sorbus torminalis (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	
1001 Betula pendula Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
TAILLIS																																					
Recouvrement %:	75	80	5	10	80	20	30	"	80	80	60	70	30	75	"	80	40	50	80	45	70	75	80	75	"	40	"	25	70	5	"	"	"	65	75	30	
moyenne	50															65															40						
3556 Fraxinus excelsior L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2729 Acer campestre L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1009 Corylus avellana L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1013 Quercus petraea Liebl.	.	1	.	.	.	.	.	*	1	1	1	.	1	*	33	.	1	1	.	.	1	+	.	.	*	1	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1010 Fagus sylvatica L.	2	12	.	1	.	1	.	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1007 Carpinus betulus L.	.	22	.	.	43			.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3556 Fraxinus excelsior L.	.	.	.	.	.	.	.	*	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1052 Populus tremula L.	.	1	.	.	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1011 Castanea sativa Miller	.	.	+	.	.	.	.	.	.	22	.	.	.	*	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1012 Quercus robur L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2214 Sorbus torminalis (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	*	.	1	.	.	.	.	.	.	1	.	33	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1001 Betula pendula Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
NIVEAU ARBUSTIF																																					
Recouvrement %:	5	15	10	40	20	10	10	70	25	20	20	10	10	10	20	10	15	0	15	15	10	15	10	35	20	15	15	5	20	30	40	50	60	15	30	30	
moyenne	20																															25					
Essèces des strates supérieures:																																					
3556 Fraxinus excelsior L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2729 Acer campestre L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1013 Quercus petraea Liebl.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1010 Fagus sylvatica L.	.	.	1	+	.	+	1	12	1	+	+	+	1	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	1	12	1	1	.	1	.	1	.	1	22	.	+	22
1007 Carpinus betulus L.	.	1	+	.	+	1	.	22	1	1	1	+	+	1	1	.	1	.	22	2	1	.	1	1	12	1	+	1	2	.	22	12	.	+	22		
2229 Prunus avium L.	.	1	+	22	1	+	.	22	1	1	1	+	+	1	1	.	1	.	22	2	1	.	1	1	12	1	22	.	1	.	.	.	22	+	2	.	
1052 Populus tremula L.	.	1	.	12	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1011 Castanea sativa Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1012 Quercus robur L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2214 Sorbus torminalis (L.) Crantz	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1001 Betula pendula Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	+	
Arbustes et arbrisseaux																																					
2230 Prunus spinosa L.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
3617 Viburnum opulus L.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
2205 Crataegus laevigata (Poiret) D.C.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
1009 Corylus avellana L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	+	.	+	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2204 Crataegus monogyna Jacq.	.	+	1	+	.	+	.	.	1	.	1	.	.	.	12	1	.	.	.	1	.	1	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	+	12	.	
3627 Lonicera periclymenum L.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
256 Puccinellia tenuiflora L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2212 Malus sylvestris (L.) Miller	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.					

Le signe * indique la présence potentielle dans la strate de taillis (présence en strate arbustive), momentanément oblitérée par le traitement auquel la forêt est soumise.
Le signe () rappelle la présence dans une strate autre que la strate inférieure.

[illegible]

		MELICO-FAGETUM														LUZULO-SYLVATICAE FAGETUM																						
																Forme appauvrie																						
		1992	905	383	42	1248	1274	82	996	2042	1219	44	1705	532	908	3	1607	87	1208	47	104	2035	907	234	1202	1703	4	996	132	2000	864	1611	1880	88	2062	101	1771	
NIVEAU INFÉRIEUR																																						
Recouvrement %:		25	55	60	60	60	45	25	60	50	60	75	60	35	60	80	45	75	65	50	40	40	35	20	45	60	50	70	50	30	50	15	75	80	25	40	55	
moyenne:		55							55							50																						
CARACTERISTIQUES ET DIFFÉRENTIELLES:																																						
3608	Asperula odorata L.	.	22	32	.	.	.	.	.	.	.	2	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.
956	Ruscus aculeatus L.	+	.	1	12	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
334	Melica uniflora Retz.	.	12	2	1	.	12	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
277	Holcus mollis L.	.	+	.	.	.	.	22	1	2	+	2	.	.	.	.	1	.	.	.	+	1	1	.	.	12	1	.	2	22	.	.	.	1	1	.	.	
717	Luzula sylvatica (Huds.) Gaud.	.	.	.	23	22	.	22	.	.	.	.	12	12	.	33	22	12	33	.	12	.	+	22	.	.	22	.	23	12	.	.	.	.	12	.	.	
322	Poa chaixii Vill.	.	.	.	.	.	.	.	12	12	12	.	.	22	32	.	.	.	.	.	22	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 855	Rhytidadelphus loreus (Dill.) Warnst.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	22	.	12	.	.
55	Curiana dryopteris (L.) Wherry	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 388	Leucobryum glaucum (L.) Schimp.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2942	Vaccinium myrtillus L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
373p	Festuca filiformis Pourret	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
QUERCETALIA ROBORI-PETRAEAE:																																						
2557	Lathyrus montanus Bernh.	+	1	.	+	.	.	.	1	.	+	.	.	+	.	+	1	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	1	+	.	.	.	
4215	Hieracium umbellatum L.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3359	Teucrium scorodonia L.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	2	.	.	.	.	.	1	1	.	.	.	.	1	.	.	1	1	.	1	.	.	.	1	.	.	.	12	
1988	Hypericum pulchrum L.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	2	1	.	1	.	+	1	1	.	.	.	1	
4216	Hieracium sabaudum L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	
1011	Castanea sativa Miller	.	.	()	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	
CALLUNO-ULICETEA:																																						
Espèces du mor:																																						
2945	Calluna vulgaris (L.) Hull	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	
2948	Erica cinerea L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Moder-mor, moder et espèces tolérantes:																																						
52	Pteridium aquilinum (L.) Kuhn	.	.	+	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	+	.	2	1	+	.	.	.	+	.	.	.	+	2	.	1	1	.	.	.	+	+	22	
718p	Luzula multiflora (Retz.) Lej.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	1	+	.	.	
510	Carex pilulifera L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	12	1	.	.	12	.	1	12	1	1	12	.	
B 820	Pleurozium schreberi (Willd.) Mitt.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
4214	Hieracium laevigatum Willd.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
279	Sieglingia decumbens (L.) Bernh.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2166	Potentilla erecta (L.) Rausch.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2273	Cytisus scoparius (L.) Link	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	()	.	.	.	
FAGETALIA:																																						
Espèces tolérantes:																																						
1010	Fagus sylvatica L.	()	1	1	()	()	1	()	()	.	()	()	()	()	1	()	()	.	()	.	()	.	()	()	()	()	1	1	()	()	1	()	()	()	()	()		
1007	Carpinus betulus L.	()	()	()	()	()	1	()	()	()	1	1	()	+	()	1	()	1	()	2	()	.	()	1	()	.	()	()	()	.	.	.	()	()	1	.		
Espèces du mull:																																						
670	Arum maculatum L.	+	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3422	Lamium galeobdolon (L.) Nath.	.	.	1	+	.	.	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
B 314	Fissidens tariffolius (L.) Hedw.	.	.	.	+	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1353	Moehringia trinervia (L.) Clairv.	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1223	Euphorbia dulcis L. esp. dulcis	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2229	Prunus avium L.	.	()	.	()	.	.	.	()	.	.	+	+	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
1292	Euphorbia amygdaloides L.	.	.	1	1	2	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
534	Carex sylvatica Huds.	1	1	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
2114	Rosa arvensis Huds.	1	1	1	.	.	+	.	1	+	.	1	1	1	1	2	.	+	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12			
514	Carex umbrosa Hoppe	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	12	.	.	.	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.		
848	Polygonatum multiflorum (L.) All.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
Espèces du mull-moder:																																						
1525	Vicia sepium L.	.	1	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
1522	Ranunculus nemorosus D.C.	.	.	.	+	.	.	.	.	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
232	Milium effusum L.	.	.	2	.	+	2	.	.	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2154	Potentilla sterilis (L.) Garcke	+	1	.	1	.	.	.	1	1	.	1	+	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	1	.	.	.		
371	Festuca heterophylla Lmk.	.	22	22	12	12	+	12	22	22	1	.	12	12	22	+	22	.	.	12	12	12	.	.	.	22	.	12	.	.	.	12	22	12	12	12		
B 806	Eurhynchium stratum (Schr.) Schp.	.	.	.	22	12	.	.	12	.	.	12	12	12	22	1	.	1	+	12	.	12	.	12	.	12	12	.	12	.	.	.	.	.	.	.		
B 278	Catharinea undulata (L.) W. et M.	.	.	.	12	.	12	.	12	.	.	12	.	.	+	.	12	.	.	.	.	12	12	.	12	12	22	22	.	.	.	12	12	.	.	12		
77	Dryopteris filix-mas (L.) Schott	.	.	.	+	.	1	.	.	.	.	.	.	.	.	1	22	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.		
70	Athyrium filix-femina (L.) Roth	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3196	Scrophularia nodosa L.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
PRUNETALIA:																																						
2230	Prunus spinosa L.	.	()	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
3617	Viburnum opulus L.	.	.	.	12	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2204	Crataegus monogyna Jacq.	()	()	.	()	.	.	.	()	+	.	()	.	.	.	()	.	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2208	Mespilus germanica L.	.	.	.	()	.	.	.	.	+	.	.	()	.	.	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	
2213	Malus sylvestris Miller	.	.	.	.	.	.	.	()	()	.	()	.	()	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	.	

ACIDOCLINES - ACIDOPHILES (suite)

[illegible]


TABLEAU 134 : CHENAIES - HETRAIES

[illegible]

ACIDOCLINES - ACIDOPHILES (fin)

	ASPERULO-CARPINETUM	OxALIDO - CARPINETUM	HYPERICO-CARPINETUM
3615 Adora moschatellina L.	2		
1615 Ranunculus auricomus L.			
828 Ornithogalum pyrenaicum L.	1		
920 Tanus communis L.			
1643 Clematis vitalba L.			
1061 Ulmus minor Miller			
3621 Lonicera xylosteum L.	2		
803 Allium ursinum L.			
844 Paris quadrifolia L.	1		
3705 Campanula trachelium L.			
3228 Veronica montana L.	1	1	2
1581 Ranunculus ficaria L.	3	1	1
2738 Eonymus europaeus L.			
2754 Cornus sanguinea L.			
1957 Viola reichenbachiana Jord.			
670 Arum maculatum L.			
2330 Prunus spinosa L.			
3422 Lamium galeobdolon (L.) Nath.			
2958 Primula elatior (L.) Hill.			
2192 Geum urbanum L.			
1622 Ranunculus nemorosus D.C.			
3564 Ligustrum vulgare L.			
1012 Quercus robur L.			
2525 Vicia sepium L.			
2204 Crataegus monogyna Jacq.			
3617 Viburnum opulus L.			
3608 Asperula odorata L.			
334 Melica uniflora R.			
232 Milium effusum L.			
2154 Potentilla sterilis (L.) Garcke			
437 Brachypodium sylvaticum (H.) Bv.			
534 Carex sylvatica Huds.			
948 Polygonatum multiflorum (L.) All.			
1292 Euphorbia amygdaloides L.			
1224 Euphorbia dulcis ssp. dulcis Ry.			
311 Poa nemoralis L.			
1377 Stellaria holostea L.			
2899 Prunus avium L.			
2205 Crataegus laevigata (Poir.) D.C.			
2114 Rosa arvensis Huds.			
846 Convolvularia majalis L.			
1009 Corylus avellana L.			
371 Festuca heterophylla Lmk.			
B906 Euryanchemium striatum Schp.			
1007 Carpinus betulus L.			
2755 Hedera helix L.			
1010 Fagus sylvatica L.			
B278 Catharina undulata (L.) W.M.			
2557 Lathyrus montanus Bernh.			
2883 Angelica sylvestris L.			
2626 Tilia cordata Miller			
3301 Lathraea squamaria L.			
322 Poa chaizii Vill.			
2646 Oxalis acetosella L.			
1353 Moehringia trinervia (L.) Clv.			
3733 Phyteuma spicatum ssp. ochhrol.			
77 Dryopteris filix-mas Schott			
3196 Scrophularia nodosa L.			
70 Athyrium filix-femina (L.) Roth			
277 Holcus mollis L.			
856 Ruscus aculeatus L.			
819 Endymion non-scriptus Garcke			
1220 Euphorbia hiberna L. ssp. hiberna			
737 Asphodelus albus Miller			
2166 Potentilla erecta Rausch.			
B300 Fissidens bryoides (L.) Hedw.			
538 Carex pallescens L.			
1988 Hypericum pulchrum L.			
3359 Teucrium scorodonia L.			
52 Pteridium aquilinum (L.) Kuhn			
1011 Castanea sativa Miller			
4216 Hieracium sabaudum L.			
716 Luzula multiflora (Retz.) Lej.			
3230 Veronica officinalis L.			
510 Carex pilulifera L.			
2744 Frangula alnus Miller			
329 Molinia caerulea (L.) Moench.			
245 Deschampsia flexuosa (L.) Trin.			
B379 Dicranum scoparium (L.) Hedw.			
717 Luzula sylvatica Gaud.			
55 Curiana dryopteris Wherry			
4215 Hieracium umbellatum L.			
B346 Dicranella heteromalla Schp.			
2945 Calluna vulgaris (L.) Hull.			
855 Rhytidadelphus loreus Warnst.			
388 Leucobryum glaucum (L.) Schmp.			
4214 Hieracium laevigatum Willd.			
2942 Vaccinium myrtillus L.			

Le signe x indique la présence en strates arborescentes ou arbustive mais non en strate herbacée



Fig; 327 - Esquisse de la distribution régionale des groupements sylvatiques dans le Sud du Bassin Parisien.

1-massifs anciens. -2-plateaux gréseux. -3-dépressions liasiqes. -4-plateaux à couverture d'argile à chailles. -5-plateaux calcaires (rendzines et sols bruns calcimorphes). -6-plateaux à couverture d'argile à silex. -7-sols hydromorphes de la formation de Brenne. -8-petits causses berrichons. -9-sols hydromorphes des sables d'épandage. -10-Val de Loire. -11-limite orientale du *Peucedano-Quercetum*. -12-limite orientale de sa sous-association *Euphorbietosum*. -13-aire de l'*Hyperico-Carpinetum*. -14-aire principale de l'*Oxalido-Carpinetum*. -15-groupements basophiles et baso-thermophiles de type bourguignon. -16-aire d'interférence des types bourguignon et berrichon des forêts basophiles et baso-thermophiles.




Fig. 328 - Schéma de la Classe des QUERCO-FAGETEA lato sensu pour le Sud du Bassin Parisien.

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

I - FIGURES

	PAGES
Fig. 1 Croquis de localisation du champ de l'étude	9
Fig. 2 Valeur moyenne de la radiation globale au sol	15
Fig. 3 à 19 Exemples de répartition des précipitations	
3 Précipitations des 18 et 19 novembre 1962	16
4 Précipitations de la période du 1er au 5 novembre 1962	17
5 Précipitations de la période du 8 au 10 décembre 1962	17
6 Précipitations des 12 et 13 décembre 1962	18
7 Précipitations de la période du 22 au 24 novembre 1962	19
8 Précipitations des 20 et 21 décembre 1962	19
9 Précipitations des 20 et 21 novembre 1962	20
10 Précipitations du 11 décembre 1962	20
11 Précipitations de la période du 28 au 31 décembre 1962	21
12 Précipitations du 30 octobre 1962	22
13 Précipitations de la période du 15 au 17 novembre 1962	22
14 Précipitations de la période du 14 au 19 décembre 1962	23
15 Précipitations du 15 décembre 1962	23
16 Précipitations du 20 octobre 1962	24
17 Précipitations de la période du 6 au 8 novembre 1962	24
18 Précipitations de la période du 9 au 11 novembre 1962	25
19 Précipitations de la période du 9 au 14 novembre 1962	25
Fig. 20 Températures moyennes à Châteauroux, Bourges, Nevers, Château-Chinon	26
Fig. 21 Moyenne des <i>maxima</i> et moyenne des <i>minima</i> à Châteauroux, Bourges, Nevers, Château-Chinon	26
Fig. 22 Nombre de jours de gel, en Berry et en Nivernais, au cours de l'hiver 1962-1963 (octobre à mai)	27
Fig. 23 Nombre de jours sans dégel, en Berry et en Nivernais, au cours de l'hiver 1962-1963	27
Fig. 24 Date de la première gelée de l'automne 1963, en Berry et en Nivernais	28
Fig. 25 Intensité de la première gelée généralisée de l'automne 1963 (29-30 octobre), en Berry et en Nivernais	28
Fig. 26 Date de la dernière gelée printanière, en Berry et en Nivernais, en 1963	29
Fig. 27 Inversions matinales de température pendant les trois premières semaines de mai 1964	30
Fig. 28 "Relief thermique" de la situation en mai 1964 (zéro = <i>minimum</i> de Château-Chinon)	32
Fig. 29 "Relief thermique" de la situation en mai 1964 (zéro = <i>minimum</i> de Châteauroux)	33
Fig. 30 Insolation, température, tension de vapeur, humidité relative, à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 23 au 28 août 1964	36
Fig. 31 Déficit matinal de température de Châteauroux, Bourges et Nevers sur Château-Chinon; période du 23 au 28 août 1964	37

TABLE DES FIGURES

	PAGES
Fig. 32 Durées pendant lesquelles les seuils d'humidité relative 80 %, 85 %, 88 %, sont atteints à Nevers, Châteauroux et Bourges (période du 23 au 28 août 1964)	38
Fig. 33 Amplitudes thermiques comparées de Châteauroux et Bourges	37
Fig. 34 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative, à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 2 au 13 janvier 1964	39
Fig. 35 Fluctuation du pouvoir évaporant de l'air à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 6 au 9 janvier 1964	42
Fig. 36 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 16 au 26 janvier 1963	43
Fig. 37 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 12 au 21 février 1964	48
Fig. 38 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 9 au 20 février 1963	49
Fig. 39 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative, pouvoir évaporant de l'air à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 3 au 7 mars 1963	54
Fig. 40 Insolation, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 30 juin au 8 juillet 1964	55
Fig. 41 Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche; -période du 30 juin au 8 juillet 1964	42
Fig. 42 Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche; -période du 7 au 22 août 1964	42
Fig. 43 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 7 au 22 août 1964	60
Fig. 44 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 8 au 29 octobre 1963	61
Fig. 45 Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche; -période du 8 au 29 octobre 1963	66
Fig. 46 Evaporation quotidienne mesurée à Bourges au tube de Piche; -période du 3 au 17 mai 1963	66
Fig. 47 Insolation, précipitations, température, tension de vapeur, humidité relative à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 3 au 17 mai 1963	67
Fig. 48 Les <i>maxima</i> de Bourges et Châteauroux, par rapport à ceux de Nevers (moyennes des années 1921-1950)	70
Fig. 49 Evolution comparée de la température à Châteauroux, Bourges et Nevers: supériorité thermique moyenne (de 9 h à 18 h, et de 6 h à 18 h) et avantage instantané de Bourges et Châteauroux au cours de la période du 23 au 28 août 1964	70
Fig. 50 Interception comparée des précipitations par le couvert forestier à Prémary et Amance (moyennes mensuelles)	84
Fig. 51 Classement des séquences pluvieuses et taux d'interception par le couvert forestier	85
Fig. 52 Stockage par le houpier en fonction de l'abondance des précipitations	86
Fig. 53 Localisation des points d'observation figurant au tableau 26	87

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Fig. 54 Energie disponible dans les écosystèmes forestiers et dans les écosystèmes agricoles	88
Fig. 55 La radiation solaire à Nevers, en 1966 et 1967, calculée en fonction de la durée d'insolation	89
Fig. 56 Evolution comparée des températures <i>maxima</i> et <i>minima</i> à Nevers et Prémery-le Chasnay, au cours des années 1966 et 1967 (moyennes décadaires)	90
Fig. 57 Evolution comparée des températures sous forêt et hors forêt (moyennes mensuelles)	90
Fig. 58 Evolution comparée des températures sous forêt et hors forêt (moyennes décadaires)	91
Fig. 59 Evolution comparée des amplitudes thermiques sous forêt et hors forêt (moyennes décadaires)	93
Fig. 60 Températures sous forêt et températures hors forêt: -éléments de comparaison	94
Fig. 61 Températures <i>maxima</i> , températures <i>minima</i> , insolation et précipitations: moyennes de Nevers (période 1952 - 1973), et années 1966 et 1967	95
Fig. 62-63 Fréquence des écarts : température en forêt - température au-dessus de la prairie	
62 Analyse saisonnière	96
63 Analyse mensuelle	96
Fig. 64 Nombre de jours de gel dans l'abri météorologique pour 6 stations (Nivernais, Bazois, Pays de Fours); années 1963 à 1967	97
Fig. 65 Moyenne du nombre de jours de gel à Nevers, dans l'abri météorologique (période 1952-1973)	98
Fig. 66 Nombre de jours de gel dans l'abri météorologique, à Prémery-le Chasnay, en 1966 et 1967, au-dessus de la prairie et sous-bois	98
Fig. 67 Classement des jours de gel, sous forêt et au-dessus de la prairie, en fonction des températures enregistrées dans l'abri; -station de Prémery-le Chasnay, années 1966 et 1967	99
Fig. 68 Ecart de température entre la forêt et la prairie : -valeurs moyennes calculées dans le cadre des séquences de temps; station de Prémery-le Chasnay, année 1966	100
Fig. 69 à 72 Température de l'air et température du sol	101
Fig. 73-74-75 Conditions de reconstitution de la réserve d'eau des sols	
73 Châteauroux	102
74 Bourges	103
75 Nevers	103
Fig. 76 Hauteur moyenne des précipitations hivernales (novembre à mai)	104
Fig. 77 Evolution décadaire de la température dans le sol à 60 cm de profondeur, au cours des années 1961 à 1964 ; - Maison forestière des Brays, Forêt de Tronçais	105
Fig. 78 Evolution décadaire de la température dans le sol à 30 cm de profondeur, au cours des années 1961 à 1964 ; - Maison forestière des Brays, Forêt de Tronçais	105
Fig. 79 Températures dans le sol à 30 cm et à 60 cm de profondeur, à la Maison forestière, d'octobre 1962 à octobre 1963, et d'octobre 1963 à octobre 1964	106
Fig. 80 Evolution décadaire des écarts de température dans le sol, entre les niveaux de 30 cm et de 60 cm de profondeur; -Maison forestière des Brays	107
Fig. 81 Evolution de la température dans le sol, à différentes profondeurs, entre le 21 février et le 2 mai 1963, en relation avec l'évolution des conditions aérologiques	108

TABLE DES FIGURES

	PAGES
Fig. 82 Températures vraies dans le sol à 60 cm de profondeur pendant la période de repos de la végétation;-station des Brays	109
Fig. 83-84 Indices de développement cumulés à partir du 1er janvier:	
83 pour $Q_{10} = 2$	111
84 pour $Q_{10} = 3$	111
Fig. 85 Températures cumulées au-dessus du seuil de 6°, à Châteauroux, Bourges et Nevers	112
Fig. 86 Températures cumulées au-dessus du seuil de 10°, à Châteauroux, Bourges et Nevers	113
Fig. 87 Indices de développement cumulés, à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 1er février au 31 mai, et du 1er août au 31 octobre	116
Fig. 88 Indices de développement cumulés, à Châteauroux, Bourges et Nevers, du 15 avril au 31 octobre	117
Fig. 89 Fréquence des températures au sol atteignant ou dépassant 40°; Station des Brays	118
Fig. 90 L'année 1963 à Bourges	119
Fig. 91 L'année 1964 à Bourges	119
Fig. 92 à 98 Précipitations pendant la période de végétation (avril à octobre), à Châteauroux, Bourges et Nevers	
92 1962	120
93 1963	120
94 1964	120
95 1965	120
96 1966	121
97 1967	121
98 1968	121
Fig. 99-100 Insolation et rayonnement global, à Bourges et à Nevers, en 1963 et 1964	
99 1963	122
100 1964	122
Fig. 101 Répartition décadaire des précipitations à Nevers, Prémary, Raveau, au cours de la saison de végétation;-années 1963 à 1967	124
Fig. 102 Excédent ou déficit des précipitations à Prémary et à Raveau par rapport à Nevers, pendant la saison de végétation	125
Fig. 103-104 Courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle à Châteauroux, Bourges et Nevers, pour albedo = 25%, et courbes de cumulation de l'évapotranspiration réelle pour un modèle de sol de RU = 100 mm et de RFU = 40 mm	
103 1963	140
104 1964	140
Fig. 105 à 110 Bilan de l'eau des formations herbacées en Berry et en Nivernais;-analyse par séquences de temps	
105 Nevers, 1963	141
106 Nevers, 1964	141
107 Châteauroux, 1963	142
108 Châteauroux, 1964	142
109 Bourges, 1963	143
110 Bourges, 1964	143
Fig. 111-112 Courbes de cumulation de l'évapotranspiration potentielle pour albedo = 15, courbes de cumulation de l'évapotranspiration réelle pour un modèle de sol de RU = 250 mm et de RFU = 140 mm, évolution de la réserve du sol, à Châteauroux, Bourges et Nevers	
111 1963	180
112 1964	181

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Fig. 113 Evapotranspiration potentielle, calculée à Nevers par séquences de temps en 1964, pour albedo = 15, et pour albedo modulé selon le stade phénologique de la végétation et selon les conditions météorologiques	182
Fig. 114-115 Evapotranspiration potentielle, calculée à Bourges par séquences de temps, selon la formule de Penman et selon la formule aménagée	
114 Bourges 1963	182
115 Bourges 1964	182
Fig. 116-117 Comparaison de bilans hydriques forestiers établis pour albedo = 15 % et pour albedo modulé selon la phénophase et les conditions météorologiques	
116 1963	184
117 1964	184
Fig. 118-119 Courbes de cumulation de l'ETP à Bourges, pour albedo = 15 %, établies d'après la formule de Penman et d'après la formule aménagée, et courbes de cumulation des ETR correspondantes pour trois modèles de sols	
118 1963	185
119 1964	185
Fig. 120-121 L'évapotranspiration potentielle comparée à Nevers, Prémery et Raveau; -courbes de cumulation pour albedo = 15 %	
120 1963	224
121 1964	224
Fig. 122-123 L'évapotranspiration potentielle comparée à Nevers, Prémery et Raveau; -valeurs moyennes par séquences de temps	
122 1963	225
123 1964	225
Fig. 124 à 131 Bilan de l'eau des forêts en Berry et en Nivernais; -analyse par séquences de temps en 1963 pour albedo = 15 %, RU = 250 mm RFU = 140 ou 110 mm	
124 Nevers, 1963, RFU = 140 mm	226
125 Nevers, 1963, RFU = 110 mm	226
126 Châteauroux, 1963, RFU = 140 mm	227
127 Châteauroux, 1963, RFU = 110 mm	227
128 Bourges, 1963, RFU = 140 mm	228
129 Bourges, 1963, RFU = 110 mm	228
130 Le Chasnay (Prémery), 1963	229
131 L'Usage défendu (Raveau), 1963	229
Fig. 132 à 141 Bilan de l'eau des forêts en Berry et en Nivernais; -analyse par séquences de temps en 1964 pour albedo = 15 %, RU = 250 mm RFU = 140 ou 110 mm	
132 Nevers, 1964, RFU = 140 mm	230
133 Nevers, 1964, RFU = 110 mm	230
134 Châteauroux, 1964, RFU = 140 mm	231
135 Châteauroux, 1964, RFU = 110 mm	231
136 Bourges, 1964, RFU = 140 mm	232
137 Bourges, 1964, RFU = 110 mm	232
138 Le Chasnay (Prémery), 1964, RFU = 140 mm	233
139 Le Chasnay (Prémery), 1964, RFU = 110 mm	233
140 L'Usage défendu (Raveau), 1964, RFU = 140 mm	234
141 L'Usage défendu (Raveau), 1964, RFU = 110 mm	234

TABLE DES FIGURES

	PAGES
Fig. 142 à 151 Bilan de l' eau des forêts xérophi les en Berry et en Ni- verna is;- analyse par séquences de temps en 1963 et 1964, pour albedo = 15 %,RU = 110 mm,RFU = 50 mm	
142 Châteauroux,1963	235
143 Bourges,1963	235
144 Nevers,1963	236
145 Le Chasnay (Prémery),1963	236
146 L'Usage défendu (Raveau),1963	236
147 Châteauroux,1964	237
148 Bourges,1964	237
149 Nevers,1964	238
150 L'Usage défendu (Raveau),1964	238
151 Le Chasnay (Prémery),1964	238
Fig. 152 à 156 Bilan de l' eau des forêts xérophi les en Berry et en Ni- verna is;- analyse par séquences de temps en 1963 et 1964, pour albedo modulé selon le stade phénologique et les conditions mé- téorologiques,RU = 100 mm,RFU = 50 mm	
152 Châteauroux,1963	239
153 Bourges,1963	239
154 Nevers,1963	239
155 Bourges,1964	240
156 Nevers,1964	240
Fig. 157 à 166 Bilan de l' eau des forêts en Berry et en Nivernais;- ana- lyse par séquences de temps en 1963 et 1964, pour albedo modu- lé selon la stade phénologique et les conditions météorologi- ques,RU = 250 mm,RFU = 140 et 110 mm	
157 Nevers,1963,RFU = 140 mm	241
158 Nevers,1963,RFU = 110 mm	241
159 Bourges,1963,RFU = 140 mm	242
160 Bourges,1963,RFU = 110 mm	242
161 Châteauroux,1963,RFU = 140 mm	243
162 Châteauroux,1963,RFU = 110 mm	243
163 Bourges,1964,RFU = 140 mm	244
164 Bourges,1964,RFU = 110 mm	244
165 Nevers,1964,RFU = 140 mm	245
166 Nevers,1964,RFU = 110 mm	245
Fig. 167-168-169 Bilan de l' eau des forêts;-exemple,pour Châteauroux en 1963,tenant compte:1° de la modulation de l' albedo en fonction du stade phénologique et des conditions météorologiques,- 2° de la fraction du rayonnement transmis au sol en dehors de la pé- riode de pleine feuillaison:	
167 RU = 250 mm,RFU = 140 mm	246
168 RU = 250 mm,RFU = 110 mm	246
169 RU = 100 mm,RFU = 50 mm	247
Fig. 170 Pluviométrie des années 1963 à 1967 à Nevers,Prémery et Raveau	247
Fig. 171 à 175 Insolation et rayonnement global dans le Sud du Bassin Parisien	
171 1962	248
172 1965	248
173 1966	249
174 1967	249
175 1968	249
Fig. 176 Classement des années de la période 1962 - 1968,en fonction des précipitations et du rayonnement global de la période de végé- tation	250

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Fig. 177 Exemple d'analyse décadaire du bilan de l'eau des forêts, pour Châteauroux, en 1963	250
Fig. 178 Valeurs décadaires de l'ETP à Bourges, d'après la formule de Penman et d'après la formule aménagée	251
Fig. 179 à 184 Bilan de l'eau des formations herbacées; -comparaison des résultats obtenus en effectuant les calculs par séquences de temps et par décades, pour albedo = 15 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm.	
179 Bourges, 1963	254
180 Châteauroux, 1963	254
181 Bourges, 1964	255
182 Châteauroux, 1964	255
183 Nevers, 1963	256
184 Nevers, 1964	256
Fig. 185 à 190 Bilan de l'eau des forêts; comparaison des résultats obtenus en effectuant les calculs par séquences de temps et par décades, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm.	
185 Nevers, 1963	257
186 Nevers, 1964	257
187 Châteauroux, 1963	258
188 Châteauroux, 1964	258
189 Bourges, 1963	259
190 Bourges, 1964	259
Fig. 191 à 196 Bilans hydriques de trois années sèches, pour les formations herbacées et pour les forêts:	
191 1962, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	260
192 1962, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	261
193 1964, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	262
194 1964, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	263
195 1967, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	264
196 1967, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	265
Fig. 197 à 204 Bilans hydriques décadaires de quatre années humides:	
197 1963, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	266
198 1963, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	267
199 1965, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	268
200 1965, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	269
201 1966, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	270
202 1966, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	271
203 1968, pour albedo = 25 %, RU = 100 mm, RFU = 40 mm	272
204 1968, pour albedo = 15 %, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	273
Fig. 205 L'ouragan du 21 juin 1965 en forêt de Vincence	274
Fig. 206 Localisation des forêts qui font l'objet d'une monographie	277
Fig. 207 Codification des éléments phytogéographiques	278
Fig. 208 Amplitude ionique de <i>Asarum europaeum</i> L.	279
Fig. 209 Amplitude ionique de <i>Peucedanum gallicum</i> Latourrette	279
Fig. 210 Amplitude ionique de <i>Luzula sylvatica</i> (Huds.) Gaud.	279
Fig. 211 Spectre phytogéographique du Mont-Martin	281
Fig. 212 Transect du Mont-Martin, N 70° W - N 110° E	282-3
Fig. 213 Transect du Mont-Martin, N 135° W - N 45° E	282-3
Fig. 214 Esquisse de la flore et de la végétation du Mont-Martin	284
Fig. 215 Transect de Limon	285
Fig. 216 Le plateau d'Arbourse: localisation des bois et des friches; propriété; localisation des transects	286
Fig. 217 Transects à travers le plateau d'Arbourse	287

TABLE DES FIGURES

	PAGES
Fig. 218-219 La forêt de la Bertrange, vue par les forestiers et les usagers:	
218 vers 1960	288-9
219 vingt ans plus tard	290-1
Fig. 220 Formation historique de la Forêt de la Bertrange	292-3
Fig. 221 Traitements appliqués dans les différentes parties de la Bertrange depuis le XVII ^{ème} siècle	294-5
Fig. 222 Premier transect à travers la Forêt de la Bertrange	296-7
Fig. 223 Deuxième transect à travers la Forêt de la Bertrange	298-9
Fig. 224 Analyse de Czekanowski, sur un échantillon de 31 relevés dans lesquels entre la sarrette des teinturiers (<i>Serratula tinctoria</i> L.)	304
Fig. 225-226 Approche écologique de la serratule - Analyse des correspondances:	
225 axes 1 et 2	306
226 axes 1 et 3	307
Fig. 227 Répartition des espèces du cortège de la serratule par types d'humus	307
Fig. 228 Topographie, faciès végétaux et sols d'une partie de la Forêt de Prémery	308
Fig. 229 Trois exemples de mardelles sur le plateau de Prémery	309
Fig. 230 Différents types de zonation autour des mardelles	310
Fig. 231 Relations topographiques entre l'aulnaie et la chênaie-boulaie	311
Fig. 232 L'ensemble forestier au sud d'Issoudun	311
Fig. 233-234 Transects à travers le massif forestier de Bommiers-Choeurs-Chatain:	
233 n° 1	312-3
234 n° 2	312-3
Fig. 235 Conversion en futaie de la Forêt de Bommiers	314
Fig. 236 Bois, fruticées et pelouses au sud-ouest de Bourges	315
Fig. 237 Relations de position entre les divers types de pelouses et groupements de rocher	315
Fig. 238 Transect à travers les pelouses de la Chapelle-Saint-Ursin, le Bois de la Corne, le Bois du Palais, le Bois de Castelnau	316
Fig. 239 Localisation des sites ayant donné lieu à analyse pollinique	317
Fig. 240 Essai de synthèse de quelques données palynologiques régionales	319
Fig. 241 Esquisse de la répartition régionale de quelques espèces atlantiques: <i>Euphorbia hyberna</i> L. ssp. <i>hyberna</i> , <i>Asphodelus albus</i> Mill. var. <i>sphaerocarpus</i> G. G., <i>Peucedanum gallicum</i> Latourr., <i>Erica cinerea</i> L., <i>Ulex minor</i> Roth, <i>Ulex europaeus</i> L.	320
Fig. 242 Répartition régionale d'arbustes et arbrisseaux d'affinités méridionales	321
Fig. 243 Amplitude ionique de <i>Carpinus betulus</i> L. et <i>Fagus sylvatica</i> L.	322
Fig. 244 Analyse selon Czekanowski des groupements à buis du sud du Bassin Parisien	322
Fig. 245 à 248 Analyse des correspondances des groupements à buis du sud du Bassin Parisien:	
245 axes 1 et 2	323
246 axes 1 et 3	323
247 axes 2 et 3	324
248 axes 1 et 4	324

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Fig. 249 Part des espèces d'affinités méridionales dans le cortège floristique du buis, dans le sud du Bassin Parisien	328
Fig. 250 Part des espèces d'affinités méridionales dans les cinq ensembles de relevés à buis du sud du Bassin Parisien	328
Fig. 251 Localisation des groupements à <i>Buxus sempervirens</i> L., faisant l'objet de la comparaison avec ceux du Bassin Parisien méridional	329
Fig. 252 à 255 Groupements végétaux à buis dans les régions au nord du Massif Central.-Analyse des correspondances sur 51 relevés:	
252 axes 1 et 2	330
253 axes 1 et 3	331
254 axes 2 et 3	332
255 axes 1 et 4	333
Fig. 256-257 Groupements à buis, dans les régions au nord du Massif Central.-Analyse portant sur 41 relevés	
256 axes 1 et 2	334
257 axes 1 et 3	334
Fig. 258 Répartition régionale de trois espèces "méridionales" et d'une "montagnarde": <i>Rubia peregrina</i> L., - <i>Chamaecytisus supinus</i> (L.) Link., - <i>Helianthemum apenninum</i> (L.) Mill., - <i>Poa chaixii</i> Vill.	336
Fig. 259 Homogénéité floristique des groupements forestiers dans lesquels se rencontre <i>Rhytidiadelphus loreus</i> (Dill.) Wstf.	337
Fig. 260-261 Ecologie de <i>Daphne laureola</i> L.:	
260 axes 1 et 2 de l'analyse des correspondances	338
261 axes 1 et 3	339
Fig. 262 Ecologie <i>Poa chaixii</i> Vill.-axes 1 et 2 de l'analyse	340-1
Fig. 263 à 266 Groupements forestiers à <i>Leucobryum glaucum</i> (L.) Schp.-graphes-relevés de l'analyse des correspondances:	
263 axes 1 et 2	342-3
264 axes 1 et 3	344-5
265 axes 2 et 3, analyse partielle: ensemble A	346
266-axes 2 et 3, analyse partielle: ensemble B	346
Fig. 267 Essai de définition du groupe socio-écologique de <i>Leucobryum glaucum</i> (L.) Schp.-Représentation partielle des espèces entrant dans les inventaires de végétation où <i>Leucobryum glaucum</i> est présent;-axes 1 et 2 de l'analyse	347
Fig. 268 Forêts hygrophiles;-analyse selon Czekanowski	375
Fig. 269 à 273 Typologie des forêts hygrophiles;-analyse des correspondances:	
269 axes 1 et 2 de l'analyse	375
270 axes 1 et 3	376
271 axes 2 et 3	376
272 axes 1 et 4	377
273 axes 2 et 4	377
Fig. 274 à 277 Systématique des forêts hygrophiles.-Comparaison des forêts du Bassin Parisien méridional et de forêts décrites dans d'autres régions:	
274 axes 1 et 2 de l'analyse des correspondances	387
275 axes 1 et 3	388-9
276 axes 1 et 4	390-1
277 axes 2 et 6:représentation partielle	392
Fig. 278 Statut du groupement de Prémery	393

TABLE DES FIGURES

	PAGES
Fig. 279 Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles, graphe / espèces axes 1 et 2	410-1
Fig. 280 Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles, comparaison des forêts du Bassin Parisien méridional et de forêts d'autres régions; -graphe / espèces, axes 1 et 2	412-3
Fig. 281 à 283 Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles du Bassin Parisien méridional: cartes des individus d'association:	
281 plan des axes 1 et de l'analyse des correspondances	414
282 axes 1 et 3	415
283 axes 1 et 4	416
Fig. 284 Spectre sociologique brut du <i>Mercurialo-Carpinenion</i>	417
Fig. 285 à 288 Types morphologiques et formes biologiques des forêts du <i>Mercurialo-Carpinenion</i> :	
285 <i>Narcisso-Carpinetum</i>	418
286 <i>Lithospermo-Carpinetum</i>	418
287 <i>Scillo-Carpinetum</i>	419
288 <i>Asaro-Tilietum</i>	419
Fig. 289 à 292 Spectre écologique des forêts du <i>Mercurialo-Carpinenion</i> :	
289 <i>Narcisso-Carpinetum</i>	420
290 <i>Lithospermo-Carpinetum</i>	420
291 <i>Scillo-Carpinetum</i>	421
292 <i>Asaro-Tilietum</i>	421
Fig. 293 à 296 Spectre phytogéographique des forêts du <i>Mercurialo-Carpinenion</i> :	
293 <i>Narcisso-Carpinetum</i>	422
294 <i>Lithospermo-Carpinetum</i>	422
295 <i>Scillo-Carpinetum</i>	423
296 <i>Asaro-Tilietum</i>	423
Fig. 297 Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles du Bassin Parisien méridional. Comparaison avec des associations décrites dans d'autres régions	424-5
Fig. 298 Spectre sociologique brut du <i>Rubio-Quercetum</i>	429
Fig. 299 à 302 Types morphologiques et formes biologiques des forêts du <i>Rubio-Quercetum</i> :	
299 groupement de transition	432
300 <i>Rubio-Quercetum Fagetosum</i>	432
301 <i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i>	433
302 <i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i> , faciès péri-forestier	433
Fig. 303 à 306 Spectre écologique des forêts du <i>Rubio-Quercetum</i> :	
303 groupement de transition	434
304 <i>Rubio-Quercetum Fagetosum</i>	434
305 <i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i>	435
306 <i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i> , faciès péri-forestier	435
Fig. 307 à 310 Spectre phytogéographique des forêts du <i>Rubio-Quercetum</i> :	
307 groupement de transition	436
308 <i>Rubio-Quercetum Fagetosum</i>	436
309 <i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i>	437
310 <i>Rubio-Quercetum Ornithogaletosum</i> , faciès péri-forestier	437
Fig. 311 Forêts neutroclines, acidoclines, acidophiles. - graphe / relevés de l'analyse, axes 1 et 2	463
Fig. 312 Graphe / espèces simplifié du <i>Peucedano-Quercetum</i> ; axes 1 et 2 de l'analyse	464

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Fig. 313 Les sous-unités du <i>Peucedano-Quercetum</i> .-Graphe mixte relevés / espèces; axes 1 et 2 de l'analyse	465
Fig. 314 Essai de définition de la sous-alliance du <i>Peucedano-Quercetum</i> : comparaison des relevés effectués dans le Bassin Parisien méridional avec des individus d'associations définies dans d'autres régions	466-7
Fig. 315 Spectre sociologique brut du <i>Peucedano-Quercetum</i>	478
Fig. 316 Spectre sociologique brut des charmaies neutroclines et acidoclines	484
Fig. 317 à 319 Charmaies neutroclines et acidoclines, chênaies-hêtraies acidoclines et acidophiles.-graphe / relevés:	
317 axes 1 et 2 de l'analyse	485
318 axes 1 et 3	486
319 axes 1 et 4	487
Fig. 320 Comparaison des charmaies neutroclines ou acidoclines, des chênaies-hêtraies acidoclines ou acidophiles du Bassin Parisien méridional, et de groupements décrits dans d'autres régions	498-9
Fig. 321 à 323 Représentation limitée à trois groupements de l'analyse de la figure 320	
321 axes 1 et 2	500
322 axes 1 et 3	500
323 axes 1 et 6	501
Fig. 324 Spectre sociologique brut des chênaies-hêtraies	501
Fig. 325-326 Représentation partielle de l'analyse de la figure 320	
325 axes 2 et 6	502
326 axes 2 et 7	502
Fig. 327 Esquisse de la distribution régionale des groupements sylvatiques dans le sud du Bassin Parisien	514
Fig. 328 Schéma de la classe des <i>Querco-Fagetea lato sensu</i> pour le sud du Bassin Parisien	515

II - TABLEAUX

	PAGES
Tab. 1 Caractéristiques physiques et chimiques des argiles à chailles	10
Tab. 2 Identification des minéraux argileux des argiles à chailles	11
Tab. 3 Moyennes annuelles de température (période 1921-1950)	26
Tab. 4 Inversions matinales au cours de l'année 1963	31
Tab. 5 Données météorologiques régionales; -période du 23 au 28 août 1964	34-35
Tab. 6 Données météorologiques régionales; - période du 2 au 13 janvier 1964	40-41
Tab. 7 Données météorologiques régionales; -période du 16 au 25 janvier 1963	44-45
Tab. 8 Données météorologiques régionales; - période du 12 au 21 février 1964	46-47
Tab. 9 Données météorologiques régionales; - période du 9 au 20 février 1963	50-51
Tab. 10 Données météorologiques régionales; - période du 3 au 7 mars 1963	52-53
Tab. 11 Données météorologiques régionales; - période du 30 juin au 8 juillet 1964	56-57
Tab. 12 Données météorologiques régionales; -période du 7 au 22 août 1964	58-59
Tab. 13 Données météorologiques régionales; -période du 8 au 30 octobre 1963	62-65
Tab. 14 Données météorologiques régionales; - période du 3 au 17 mai 1963	68-69
Tab. 15 <i>Maxima</i> moyens en situation anticyclonique, au cours de l'hiver 1963-1964	71
Tab. 16 <i>Maxima</i> moyens en situation anticyclonique, durant la période de végétation de 1964	71
Tab. 17 Supériorité thermique de Châteauroux et Bourges sur Nevers; séquence de temps du 23 au 28 août 1964	72
Tab. 18 Evapotranspiration réelle calculée; -période du 23 au 27 août 1964	72
Tab. 19 Interception des précipitations par le couvert forestier; éléments de comparaison	73
Tab. 20 Précipitations hors forêt et précipitations sous forêt; le Chasnay (Prémery), années 1966 et 1967	74
Tab. 21 Interception des précipitations par le couvert forestier; comparaison Amance-Prémery, juillet 1966 à juin 1967	75
Tab. 22 Etablissement des corrélations entre précipitations et interception; -année 1966	76-77
Tab. 23 Etablissement des corrélations entre précipitations et interception; -année 1967	78-79
Tab. 24 Précipitations hors forêt et précipitations sous forêt; le Chasnay (Prémery); -récapitulation des données	80-81
Tab. 25 Caractères statistiques de l'interception des précipitations par le couvert forestier (interception apparente); -le Chasnay, années 1966 et 1967	82-83
Tab. 26 Tension de vapeur et humidité relative dans la forêt	87

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Tab. 27 Températures sous forêt et températures hors forêt;-le Chas-nay (Prémery);- moyennes décennaires et mensuelles des <i>minima</i> et des <i>maxima</i> , -années 1966 et 1967	92
Tab. 28 Les années 1966 et 1967 à Nevers	95
Tab. 29 Nombre de jours de gel sous abri en 1966 et 1967 à Prémery, Nevers, Bourges	98
Tab. 30 Précipitations annuelles et précipitations hivernales	104
Tab. 31 Indices de développement cumulés à partir du 1er janvier, pour $Q_{10} = 2$	110
Tab. 32 Indices de développement cumulés à partir du 1er janvier, Pour $Q_{10} = 3$	110
Tab. 33 Températures cumulées au-dessus du seuil de 6°	114
Tab. 34 Températures cumulées au-dessus du seuil de 10°	114
Tab. 35 Ecart moyen quotidien entre Bourges et Nevers sur les températures cumulées	115
Tab. 36 Indices de développement cumulés à partir du 1er février, pour $Q_{10} = 3$	115
Tab. 37 Indices de développement cumulés à partir du 1er août, pour $Q_{10} = 3$	116
Tab. 38 Indices de développement cumulés à partir du 15 avril, pour $Q_{10} = 3$	118
Tab. 39 Précipitations en période d'activité de la végétation	123
Tab. 40 Comparaison des précipitations à Nevers, Prémery et Raveau, pendant la saison de végétation	123
Tab. 41 Insolation et rayonnement global pendant la saison de végétation	126
Tab. 42 Abréviations utilisées dans les tableaux exprimant les différentes options du bilan de l'eau	127
Tab. 43 à 48 Approche du bilan hydrique du Berry et du Nivernais: évapotranspiration potentielle, évolution de la réserve du sol, évapotranspiration réelle, dans l'hypothèse: albedo=25%, RU=100 mm, RFU=40 mm; -analyse par séquences de temps; - calculs selon la formule de Penman	
43 Châteauroux, 1963	128-129
44 Bourges, 1963	130-131
45 Nevers, 1963	132-133
46 Châteauroux, 1964	134-135
47 Bourges, 1964	136-137
48 Nevers, 1964	138-139
Tab. 49 à 66 Approche du bilan hydrique des forêts en Berry et en Nivernais: évapotranspiration potentielle, évolution de la réserve du sol, évapotranspiration réelle, dans l'hypothèse d'un albedo constant de 15 % et pour trois modèles de sol; analyse par séquences de temps, calculs selon la formule de Penman	
49 Châteauroux, 1963, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	144-145
50 Bourges, 1963, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	146-147
51 Nevers, 1963, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	148-149
52 Châteauroux, 1964, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	150-151
53 Bourges, 1964, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	152-153
54 Nevers, 1964, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	154-155
55 Châteauroux, 1963, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	156-157
56 Bourges, 1963, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	158-159
57 Nevers, 1963, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	160-161

TABLEAUX

	PAGES
58 Châteauroux, 1964, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	162-163
59 Bourges, 1964, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	164-165
60 Nevers, 1964, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	166-167
61 Châteauroux, 1963, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	168-169
62 Bourges, 1963, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	170-171
63 Nevers, 1963, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	172-173
64 Châteauroux, 1964, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	174-175
65 Bourges, 1964, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	176-177
66 Nevers, 1964, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	178-179
Tab. 67 Bilan de l'eau des formations herbacées; -tableau récapitulatif, années 1963 et 1964	183
Tab. 68 Bilan de l'eau des formations forestières; -tableau récapitulatif, années 1963 et 1964	186-187
Tab. 69 à 74 Approche du bilan hydrique des forêts du Berry: test de la formule aménagée, par séquences de temps, pour la station M.N. de Bourges (pour albedo = 15%)	
69 1963, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	188-189
70 1963, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	190-191
71 1963, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	192-193
72 1964, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	194-195
73 1964, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	196-197
74 1964, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	198-199
Tab. 75 à 86 Approche du bilan hydrique des forêts du Nivernais, à partir des observations des stations du plateau: évapotranspiration potentielle, calculée selon la formule aménagée (albedo = 15%), évolution de la réserve du sol et évapotranspiration réelle pour trois modèles de sol; -analyse par séquences de temps	
75 Le Chasnay, 1963, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	200-201
76 L'Usage défendu, 1963, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	202-203
77 Le Chasnay, 1963, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	204-205
78 L'Usage défendu, 1963, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	206-207
79 Le Chasnay, 1963, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	208-209
80 L'Usage défendu, 1963, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	210-211
81 Le Chasnay, 1964, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	212-213
82 L'Usage défendu, 1964, RU = 100 mm, RFU = 50 mm	214-215
83 Le Chasnay, 1964, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	216-217
84 L'Usage défendu, 1964, RU = 250 mm, RFU = 110 mm	218-219
85 Le Chasnay, 1964, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	220-221
86 L'Usage défendu, 1964, RU = 250 mm, RFU = 140 mm	222-223
Tab. 87 Evapotranspiration potentielle et évapotranspiration réelle, pour divers modèles de végétation et de sol: analyse décadaire, années 1962 à 1968; -tableau récapitulatif	252-253
Tab. 88 Analyse chorologique du Mont-Martin	280
Tab. 89 Cortège floristique de la sarrette des teinturiers (<i>Serratula tinctoria</i> L.)	300-303
Tab. 90 Structure écologique du cortège floristique de la serratule (spectre pondéré)	305
Tab. 91 Localisation géographique des relevés constituant l'échantillon étudié pour définir l'écologie de la sarrette des teinturiers (<i>Serratula tinctoria</i> L.)	306

TABLE DES FIGURES ET DES TABLEAUX

	PAGES
Tab. 92 Chronologie adoptée pour le Néowürm et le Postglaciaire	318
Tab. 93 Composition floristique des groupements à <i>Buxus sempervirens</i> dans le sud du Bassin Parisien	325-327
Tab. 94 Spectre phytogéographique des groupements à <i>Buxus sempervirens</i> dans le sud du Bassin Parisien	329
Tab. 95 Groupements à <i>Buxus sempervirens</i> : localisation des relevés	335
Tab. 96 Localisation des relevés à <i>Rhytidiadelphus loreus</i> Wstf.	337
Tab. 97 Localisation des relevés à <i>Daphne laureola</i> utilisés pour définir l'écologie de l'espèce	339
Tab. 98 Localisation des relevés à <i>Poa chaixii</i> utilisés pour définir l'écologie de l'espèce	341
Tab. 99 Essai de définition du groupe socio-écologique de <i>Leucobryum glaucum</i> (L.) Schp.	348-349
Tab. 100 Localisation des relevés utilisés pour définir le groupe socio-écologique de <i>Leucobryum glaucum</i>	350
Tab. 101 Catalogue régional, écologique, chorologique et sociologique des espèces des forêts et des lisières forestières	351-374
Tab. 102 Forêts hygrophiles	378-385
Tab. 103 Localisation des relevés figurant au tableau 102	386
Tab. 104 Spectres phytogéographique, biologique, écologique, de la strate inférieure de végétation de l'aulnaie de Prémery	386
Tab. 105 Forêts basophiles: <i>Mercurialo-Carpinenion</i>	394-409
Tab. 106 Spectre sociologique du <i>Mercurialo-Carpinenion</i>	417
Tab. 107 Spectre écologique des forêts basophiles	426
Tab. 108 Spectre phytogéographique des forêts basophiles	427
Tab. 109 Strate inférieure des forêts basophiles: type morphologique et forme biologique des espèces	428
Tab. 110 Localisation des relevés de forêts basophiles	428
Tab. 111 Spectre sociologique du <i>Rubio-Quercetum</i>	429
Tab. 112 Spectre phytogéographique des forêts thermophiles	430
Tab. 113 Spectre écologique des forêts thermophiles	431
Tab. 114 Strate inférieure des forêts thermophiles: type morphologique et forme biologique des espèces	431
Tab. 115 Forêts baso-thermophiles	438-459
Tab. 116 Forêts basophiles et forêts baso-thermophiles. Présentation synthétique simplifiée	460-461
Tab. 117 Localisation des relevés de forêts baso-thermophiles et liste des espèces présentes une fois	462
Tab. 118 Chênaies acidoclines-acidophiles sur sols hydromorphes - <i>Peucedano-Quercenion</i>	468-477
Tab. 119 Spectre sociologique du <i>Peucedano-Quercetum</i>	478
Tab. 120 Spectre écologique des forêts du <i>Peucedano-Quercetum</i>	479
Tab. 121 Spectre phytogéographique des forêts du <i>Peucedano-Quercetum</i>	480
Tab. 122 Strate inférieure des forêts du <i>Peucedano-Quercetum</i> : type morphologique et forme biologique des espèces	481
Tab. 123 Strate inférieure des charmaies neutroclines et acidoclines: type morphologique et forme biologique des espèces	481
Tab. 124 Spectre écologique des charmaies neutroclines et acidoclines	482
Tab. 125 Spectre phytogéographique des charmaies neutroclines et acidoclines	483
Tab. 126 Spectre sociologique des charmaies neutroclines et acidoclines	484
Tab. 127 Charmaies neutroclines et charmaies acidoclines: structure sociologique	488-495

TABLEAUX

	PAGES
Tab. 128 Charmaies neutroclines et charmaies acidoclines: localisation des relevés et espèces présentes une fois	496
Tab. 129 Chênaies-hêtraies acidoclines et acidophiles: localisation des relevés et espèces présentes une fois	497
Tab. 130 Spectre sociologique des chênaies-hêtraies	503
Tab. 131 Strate inférieure des chênaies-hêtraies: type morphologique et forme biologique des espèces	503
Tab. 132 Spectre écologique des chênaies-hêtraies	504
Tab. 133 Spectre phytogéographique des chênaies-hêtraies	505
Tab. 134 Chênaies-hêtraies acidoclines et acidophiles: structure sociologique	506-511
Tab. 135 Forêts neutroclines, acidoclines, acidophiles: présentation synthétique simplifiée	512-513

PLANCHES



Ph. 1 et 2 - Coupe à la base d'un versant, près de Saint-Benin-d'Azy (Nièvre): congiles à chailles, paquets de calcaire emballés dans l'éluvium, poches de dissolu-



Ph. 3 - L'aven en cloche des Vaulurins (près de Cessy-les-Bois, -Nièvre), peu de temps après l'effondrement de sa clef de voûte: étroitesse de l'orifice par rapport au volume de la coupole; - phénomènes de gleyfication dans l'éluvium.




tact entre l'éluvium et le calcaire marneux bathonien, -épaisseur inégale des ar-
tion.



Ph. 4 - Une doline en forêt communale de Prémery (Nièvre):
la cuvette présente des pentes très douces, dont la convergence est soulignée par l'inclinaison des grumes et
des piles de bois.



Ph. 5 - Structure de l'éluvium en l'absence de chailles. - Photo prise en été, dans l'aven des Vaulurins (Cessy - les - Bois, - Nièvre), à environ 5 m de profondeur. - Les surfaces de séparation des prismes, sièges d'une circulation rapide de l'eau de la réserve utile, sont soulignées par leur coloration plus foncée; - la tête du marteau est à section carrée de 27 mm de côté.



Ph. 6 - Structure de l'éluvium: vue prise dans un ancien puits de mine de Limon (Nièvre), à environ 5 m de profondeur: répartition et taille très inégale des chailles; - phénomène de sidérolithisation *in situ*.




Ph. 7 - Les dégâts de l'ouragan du 21 juin 1965 en Forêt de Vincence (Nièvre) - cf. Fig. 205, p. 274.



Ph. 8 - Le Mont-Martin, non loin de Clamecy (Nièvre).



Ph. 9 - Le versant Ouest du plateau d'Arbourse.



Ph. 10 - Opération d'enrésinement dans la Bertrange (Nièvre).



Ph. 11 - Le buis sur le coteau d'Oisy (Nièvre)



Ph. 13 - Coussins de *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.
traversés par *Polytrichum attenuatum* Menz.



Ph. 15 - *Berberis vulgaris* L.



Ph. 12 - *Asarum europaeum* L., avec *Scilla bifolia* L.,
Lamium galeobdolon (L.) Nath., *Anemone nemorosa* L.



Ph. 14 - *Cornus mas* L.



Ph. 16 - *Rubia peregrina* L.




Ph. 17 - *Prunus mahaleb* L.



Ph. 18 - *Melittis melissophyllum* L.




Ph. 19 - *Frangula alnus* Miller



Ph. 22 - *Serratula tinctoria* L.



Ph. 21 - *Peucedanum gallicum* Latourr.




Ph. 20 - *Limodorum abortivum* (L.) Sw.



Ph. 23 - *Daphne laureola* L.



Ph. 24 - *Spirea hypericifolia* L.
ssp. *obovata* (W. et K.) Dósti.



Ph. 25 - *Chamaecytisus supinus* (L.) Link.



Ph. 26 - *Vincetoxicum hirundinaria* Medic.



Ph. 27 - *Erica scoparia* L.



Ph. 28 - *Euphorbia dulcis* L.
ssp. *angulata* (Jacq.) Rouy



Ph. 29 - *Tanacetum corymbosum* Schultz-Bip.



Ph. 30 - *Geranium sanguineum* L.



Ph. 31 - *Helianthemum apenninum*
(L.) Miller



Ph. 32 - *Buglossoides purpureocaerulea*
(L.) I.M. Johnston



Ph. 33 - *Melampyrum cristatum* L.



Ph. 34 - *Centaurea triumfetti* All.
ssp. *lugdunensis* Dost.




Ph. 36 - *Allium ursinum* L., *Paris quadrifolia* L.



Ph. 38 - *Oxalis acetosella* L.



Ph. 35 - *Euphorbia hyberna* L.



Ph. 37 - *Asphodelus albus* Miller



Ph. 39 - *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaudin



Ph. 40 - *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.



Ph. 41 - *Festuca heterophylla* Lmk.



Ph. 42 - *Poa chaixii* Vill.



Ph. 43

Ph. 43 et 44 - Deux mardelles
du plateau de Prémery.



Ph. 44



Ph. 45 - *Rhytidiadelphus loreus* (Dill.)
Warnst.-pour les feuilles,grossissement
environ cinquante fois.

P L A N C H E S D E P H O T O G R A P H I E S

- Pl. 1-2 - Ph. 1-2- Coupe à la base d'un versant ; contact entre l'éluvium et le calcaire bathonien.
- Ph. 3 - L'aven en cloche des Vaulurins (près de Cessy-les-Bois).
- Ph. 4 - Une doline en forêt communale de Prémery.
- Pl. 3 - Ph. 5 - Structure de l'éluvium, en l'absence de chailles.
- Ph. 6 - Phénomène de sidérolithisation dans l'éluvium.
- Ph. 7 - Dégâts de l'ouragan du 21 juin 1965 en Forêt de Vincence (Nièvre).
- Pl. 4 - Ph. 8 - Le Mont-Martin.
- Ph. 9 - Le versant ouest du plateau d'Arbourse.
- Ph. 10 - Opération d'enrésinement dans la Bertrange (Nièvre).
- Ph. 11 - Le buis sur le coteau d'Oisy (Nièvre).
- Pl. 5 - Ph. 12 - *Asarum europaeum* L., avec *Scilla bifolia* L., *Lamium galeobdolon* (L.) Nath., *Anemone nemorosa* L.
- Ph. 13 - Coussins de *Leucobryum glaucum* (L.) Schimp.
- Ph. 14 - *Cornus mas* L.
- Ph. 15 - *Berberis vulgaris* L.
- Pl. 6 - Ph. 16 - *Rubia peregrina* L.
- Ph. 17 - *Prunus mahaleb* L.
- Ph. 18 - *Melittis melissophyllum* L.
- Ph. 19 - *Frangula alnus* Miller.
- Pl. 7 - Ph. 20 - *Limodorum abortivum* (L.) Sw.
- Ph. 21 - *Peucedanum gallicum* Latourrette
- Ph. 22 - *Serratula tinctoria* L.
- Pl. 8 - Ph. 23 - *Daphne laureola* L.
- Ph. 24 - *Spiraea hypericifolia* L. ssp. *obovata* (W. et K.) Dóst.
- Ph. 25 - *Chamaecytisus supinus* (L.) Link.
- Ph. 26 - *Vincetoxicum hirundinaria* Medic.
- Pl. 9 - Ph. 27 - *Erica scoparia* L.
- Ph. 28 - *Euphorbia dulcis* L. ssp. *angulata* (Jacq.) Rouy.
- Ph. 29 - *Tanacetum corymbosum* Schultz-Bip.
- Ph. 30 - *Geranium sanguineum* L.
- Pl. 10 - Ph. 31 - *Helianthemum apenninum* (L.) Miller.
- Ph. 32 - *Buglossoides purpureocaerulea* (L.) I.M. Johnston.
- Ph. 33 - *Melampyrum cristatum* L.
- Ph. 34 - *Centaurea triumfetti* All. ssp. *lugdunensis* Dóst.
- Pl. 11 - Ph. 35 - *Euphorbia hyberna* L.
- Ph. 36 - *Allium ursinum* L., *Paris quadrifolia* L.
- Ph. 37 - *Asphodelus albus* Miller.
- Ph. 38 - *Oxalis acetosella* L.
- Pl. 12 - Ph. 39 - *Luzula sylvatica* (Huds.) Gaud.
- Ph. 40 - *Deschampsia flexuosa* (L.) Trin.
- Ph. 41 - *Festuca heterophylla* Lmk.
- Ph. 42 - *Poa chaixii* Vill.
- Pl. 13 - Ph. 43-44 - Deux mardelles du plateau de Prémery.
- Ph. 45 - *Rhytidiadelphus loreus* (Dill.) Warnst.
- Pl. 14 - - La partie nord du massif forestier de la Bertrange au XVIIIème siècle, selon la Carte générale de la France.

